

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"א - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

סטלהרָםTM 45 מ"ג וואל, תמייסה להזרקה

סטלהרָםTM מזרק מוכן לשימוש, 45 מ"ג, תמייסה להזרקה

סטלהרָםTM מזרק מוכן לשימוש, 90 מ"ג, תמייסה להזרקה

חומר פעיל וממותו:

כל בקבוקון מכיל:

אוסטיקינומאב 45 מ"ג/0.5 ml (ustekinumab 45 mg/0.5 ml)

כל מזרק מוכן לשימוש 0.5 ml מכיל:

אוסטיקינומאב 45 מ"ג (ustekinumab 45 mg)

כל מזרק מוכן לשימוש 1 ml מכיל:

אוסטיקינומאב 90 מ"ג (ustekinumab 90 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פסוריאזיס רובי

סטלהרָם מיועדת לטיפול בפסוריאזיס רובי בדרגת חומרה בינונית עד חמורה במטופלים מבוגרים (בני 18 שנים ומעלה) שהטיפול בהם נכשל, שיש להם התווויות נגד או שאינם יכולים לסייע טיפולים סיסטמיים אחרים כולל ציקלוספורין, מתוטרקרים או פסוראלן בשילוב UV (PUVA).

פסוריאזיס רובי בילדים

סטלהרָם מיועדת לטיפול בפסוריאזיס רובי בדרגת חומרה בינונית עד חמורה במטופלים ומתבגרים מגיל 6 שנים ומעלה שאינם מאוזנים בצורה מספקת, או שאינם יכולים לסייע טיפולים סיסטמיים אחרים או טיפולים באור.

דלקת מפרקים ספקטיבית (PsA)

סטלהרָם, בלבד או בשילוב עם מתוטרקרים, מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספקטיבית פעילה במטופלים מבוגרים, כאשר התגובה לטיפול קודם בתרופות שאין ביולוגיות הנוגדות פעילות ריאומטית (DMARDs), לא הייתה מספקת.

מחלת קרוון

סטלהרָם מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים החולים במחלת קרוון פעילה בדרגת חומרה בינונית עד חמורה, אשר הגיבו בצורה לא מספקת, שאיבדו תגובה או שאינם יכולים לסייע טיפול קונבנציונלי או טיפול בנוגדי TNF או שיש להם התווויות נגד רפואיים אלה.

קוליטיס כיבית

סטלהרָם מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים החולים במחלת קוליטיס כיבית פעילה בדרגת חומרה בינונית עד חמורה, אשר הגיבו בצורה לא מספקת, שאיבדו תגובה או שאינם יכולים לסייע טיפול קונבנציונלי או תרופה ביולוגית או שיש להם התווויות נגד רפואיים אלה.

קבוצה רפואיית: מעכבי אינטראקינים סטלהר מכילה את החומר הפעיל אוסטakinומאב שהוא נוגדן מונוקלוני. נוגדים מונוקלוניים הינם חלבונים אשר מזהים ונקשרים באופן ספציפי לחלבונים מסוימים בגוף. סטלהר שיצת לקבוצת תרופות הנקראת "מדכאי המערכת החיסונית". דרך הפעולה של תרופות אלה היא על-ידי החלשת חלק ממ מערכת החיסון.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה המפורטים בסעיף 6 "מידע נוספים".
- אתה סובל ממחלה זיהומית פעילה שהרופא שלך חושב שהיא חשובה. אם אין בטוח שהכתב מעלה רלוונטי לך, היועץ ברופא או ברוקח לפני תחילת השימוש בסטלהר.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

דבר עם הרופא טרם תחילת השימוש בסטלהר. הרופא יבדוק את מצבך לפני כל טיפול. ספר לרופא על כל מחלת שיש לך לפני כל טיפול. כמו כן,-Amor לרופא אם הייתה לאחרונה ליד אדם כלשהו עשוי להיות חוליה בשחפת. הרופא יבודק אותך ויבצע בדיקה לשחפת טרם תחילת הטיפול בסטלהר. אם הרופא יחשוב שהין בסיכון לשחפת, הוא עשוי לתת לך טיפול רפואי.

שים לב לתופעות לוואי חמורות

סטלהר עשויה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל תגובות אלרגיות וזיהומיים. עליך לשים לב לסימנים מסוימים של מחלות במהלך הטיפול עם סטלהר. ראה "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4 "תופעות לוואי" לרשימה מלאה של סימנים אלה.

לפני הטיפול בסטלהר ספר לרופא:

- אם סבלת אי פעם מתגובה אלרגית לסטלהר. אם אין בטוח, שאל את הרופא.
- אם סבלת אי פעם מסוג סרטן כלשהו - זאת מאחר שמדכאי מערכת חיסון כדוגמת סטלהר מחלשים חלק מערכת החיסון. הדבר עלול להגדיל את הסיכון הסרטן.
- אם טופלת בעבר בפסוריאזיס בתרופות ביולוגיות אחרות (תרופה המיוצרת ממוקור ביולוגי וניתנת בדרך כלל בהזרקה), הסיכון הסרטן עשוי להיות גבוה יותר.
- אם אתה סובל או סבלת לאחרונה מזיהום.
- אם יש לך שינויים נגעים או נגעים חדשים באזורי הפסוריאזיס או על אזור של עור רגיל. אם הייתה לך אי פעם תגובה אלרגית לטקס או לזריקת סטלהר: המזדק המוקן לשימוש מכיל גומי מסוג לטקס, אשר עלול לגרום לתגובה אלרגית חמורה באנשים הרגישים לטקס. ראה "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4 "תופעות לוואי" לסימנים של תגובה אלרגית.
- אם הין מקבל כל טיפול אחר לפסורייזיס /או לדלקת מפרקים ספקתית, כגון טיפול מדכאי חיסון אחר או טיפול באור (פוטותרפי, טיפול באור מסוג UV). טיפולים אלו עלולים גם להחlijש חלק מערכת החיסון. טיפולים אלו בשילוב עם סטלהר לא נבדקו. למרות זאת, טיפול שכזה עלול להגבר את הסיכון למחלות הקשורות במערכת חיסונית מוחלשת.
- אם אתה מקבל או שקיבלת אי פעם דיריקות לטיפול באלרגיה - לא ידוע אם סטלהר עלולה להשפיע עליך.
- אם גילך 65 שנים ומעלה - אתה עלול ללקות בזיהומים בסביבות גבואה יותר. אם אין בטוח אם אחד מהמצבים המתוארים מעלה חלים עלייך, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בסטלהר.

חלק מהמטופלים חוות תגובות דמיות זאבת, כולל זאבת בעור או תסמנת דמיות זאבת במהלך

הטיפול באוסטקינומאב. שוחח מייד עם הרופא שלך אם אתה חווה פריחה אדומה, מורמתת וקשהית, לפעמים עם גבול כהה יותר, באזוריים בעור החשופים לשמש או עם כאבי פרקים.

התקף לב ושבץ

התקף לב ושבץ נצפו במחקר בחולים עם פסורי-אזיס שטופלו בסטרלה. הרופא שלך יבדוק באופן קבוע את גורמי הסיכון שלך למחלות לב ושבץ על מנת להבטיח שהם מטופלים נכון. פנה מייד לטיפול רפואי אם אתה מפתח כאבים בחזה, חולשה או תחושה חריגה הצד אחד של גוף, צניחה פנים או הפרעות בדייבור או בראייה.

ילדים ומתבגרים

סטרלה אינה מיועדת לטיפול בפסורי-אזיס בילדים מתחת לגיל 6 שנים ובDELKT מפרקם ספחתית, במחלת קrhoן או בקולייטיס כיבית בילדים מתחת לגיל 18 שנים, כיוון שלא נבדקה בקבוצת גילים זו.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, **תוספי תזונה וחיסונים**, ספר על כך לרופא או לרופחת. במיוחד אם לאחרונה קיבלת חיסון או שאתה עומד לקבל חיסון. אין לקבל חיסונים מסוימים (המקילים תרכיב ח'י) במהלך הטיפול בסטרלה. אם קיבלת סטרלה במהלך ההריון, ספר לרופא של תינוקך על הטיפול בסטרלה לפני שהתינוק מקבל חיסון כלשהו, כולל חיסונים חיים, כגון חיסון ה- BCG (המשמש למניעת שחפת). חיסונים חיים אינם מומלצים לתינוק בשניים עשר החודשים הראשונים לאחר הלידה אם קיבלת סטרלה במהלך ההריון, אלא אם כן הרופא של תינוקך ממליץ אחרת.

הריון והנקה

- אם את בהריון, חושבת שאת עלולה להיות בהריון או מתכוננת להרות, היועצץ עם הרופא המטפל לפני נטילת התרופה.
- לא נצפה סיכון גבוה יותר למומים מולדים בתינוקות שנחשפו לסטרלה ברחם. עם זאת, חיים ניסיון מוגבל בסטרלה לבנים בהריון. לכן, עדיף להימנע משימוש בסטרלה בהריון.
- אם הינך אישת בഗיל הפורי, עליך להימנע מכינסה להריון באמצעות שימוש באמצע מניעת שחפת (אינם מומליצים לתינוק בעורה, ולפחות 15 שבועות לאחר הטיפול האחרון בסטרלה).
- סטרלה יכולה לעבור דרך השלה לעובר. אם קיבלת סטרלה במהלך ההריון, תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בזיהום.
- חשוב שתספר לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים אם קיבלת סטרלה במהלך ההריון לפני שהתינוק קיבל חיסון כלשהו. חיים ניסיון חיים כגון חיסון ה- BCG (המשמש למניעת שחפת) אינם מומליצים לתינוק בעורה שניים עשר החודשים הראשונים לאחר הלידה אם קיבלת סטרלה במהלך ההריון, אלא אם כן הרופא של תינוקך ממליץ אחרת.
- אוסטקינומאב, בכמותות קטנות מאוד, עלול לעבור לחלב אם. ספר לרופא אם הינך מניקה או מתכוננת להניק. את רופאך צריכים להחליט אם תניק או שתשתמש בסטרלה. אין לעשות את שניהם יחד.

נהיגה ושימוש במכונות

סטרלה אינה משפיעה או משפיעה במידה זניחה על יכולת הנהיגה והשימוש במכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

סטלהרָה מִיעוּדָת לְשִׁימֹושׁ לְפִי הַוּרָאוֹת וּפִיקּוֹחַ רֹופָא המנוסף בטיפול במצבים להם סטלהרָה מיועדת.

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.
יש לדבר עם הרופא לגבי מועד מתן הזריקות ומועד הביקורת.
המינון, תדריות, משך הטיפול ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

המינון המקורי בדרך כלל הוא:

מבוגרים מעל גיל 18:

במחלות פסורי-אדיס או בדלקת מפרקים ספקטיבית

- המנה ההתחלתית המומלצת היא 45 מ"ג סטלהרָה. חולים שמשקלם מעל 100 קילוגרם (ק"ג) עשויים לתחילה במננה של 90 מ"ג במקום 45 מ"ג.
- לאחר קבלת המנה ההתחלתית, תינתן המנה השנייה כעבור 4 שבועות ובמשך כל 12 שבועות. המנות העוקבות בדרך כלל זהות למנה ההתחלתית.

במחלות קרונה או בקוליטיס כיבית

- במהלך הטיפול, המנה הראשונה, כ- 6 מ"ג/ק"ג, תינתן לך על-ידי הרופא המטפל באמצעות עירוי בווריד בזרוע (עירוי טור-ורידי). לאחר קבלת המנה ההתחלתית, תקבל את המנה הבאה של 90 מ"ג סטלהרָה בזריקה תת עורית (מתחת לעור) אחרי 8 שבועות, וכל 12 שבועות לאחר מכן.
- לאחר קבלת הזריקה התת עורית הראשונה, יתכן שחלק מהמטופלים יקבלו סטלהרָה 90 מ"ג כל 8 שבועות. הרופא יחליט متى عليك לקבל את הזריקה הבאה.

ילדים ומתבגרים בני 6 ומעלה

במחלות פסורי-אדיס

- הרופא יחשב את המנה המתאימה לך כולל כמות (נפח) סטלהרָה שיש להזירק המכילה מנתה זו. המנה המתאימה תלוי במשקל גופך בעת המtan.
- ניתן להשתמש בסטלהרָה 45 מ"ג ואיל בילדים אשר צריכים לקבל פחות מהמנה המלאה של 45 מ"ג.
- אם משקלך פחות מ- 60 ק"ג, המנה המומלצת היא 0.75 מ"ג סטלהרָה לכל ק"ג משקל גופך.
- אם משקלך בין 60 ל-100 ק"ג, המנה המומלצת היא 45 מ"ג סטלהרָה.
- אם משקלך יותר מ- 100 ק"ג, המנה המומלצת היא 90 מ"ג סטלהרָה.
- לאחר קבלת המנה הראשונה, תינתן המנה השנייה אחרי 4 שבועות ובמשך כל 12 שבועות.

אין לעבר על המנה המומלצת.

כיצד סטלהרָה ניתנת:

- סטלהרָה ניתנת בהזרקה מתחת לעור (תת עורית). בתחילת הטיפול, אחות או איש צוות רפואי יכולים להזירק את התרופה.
- עם זאת, אם תחליט עם רופאך כי הינך יכול להזירק סטלהרָה באופן עצמי, יהיה לך לעבור הדרכנה כיצד להזירק את התרופה בעצמך.
- להוראות כיצד להזריק סטלהרָה יש לעיין ב"הוראות שימוש" בסוף העalon. היועץ ברופא אם יש לך שאלות בנוגע להזרקה עצמית של התרופה.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר:

צורך קשר מייד עם הרופא או הרוקח. הבא איתך את האריזה החיצונית של התרופה אפילו אם היא ריקה.

אם שכחת ליטול את התרופה:
יש ליזור קשר עם הרופא או הרוקח אם שכחת להזריק מנה של סטלהר. אסור להזריק שתי מנות כדי לפצות על מנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:
אין זה מסוכן להפסיק טיפול בסטלהר. עם זאת, אם תפסיק את הטיפול, סימני המחלת עלולים לחזור. יש להיוועץ ברופא אם אתה מעוניין להפסיק את הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע שהינך נוטל תרופה**. הרכב משקפיים אם הינך זזוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטלהר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.
תופעות לוואי חמורות - חלק מהחולמים עלולים לסבול מתופעות לוואי חמורות הדורשות טיפול דחוף.

תגובה אלרגית - יתכן **שיידרש טיפול דחוף**. יש לדוח מיד לרופא או **לפנות לחדר מיון** לקבלת טיפול רפואי דחוף אם הבנתה באחד מהסימנים הבאים:
תגובה אלרגית חמורה (אנפילקטיס) היא נדירה (rare) בחולים המטופלים בסטלהר (עלולה להופיע بعد משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים). הסימנים כוללים:

- קשיי נשימה או בולע
- לחץ דם נמוך שעלול לגרום לסתחרחות או תחושת סחרור
- התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה או הגרון

סימנים נפוצים (common) של תגובה אלרגית כוללים פריחה בעור וחרפת (היכולים להופיע לאחר שימוש אחד מתוך 100 משתמשים)
במקרים נדירים, תגובה אלרגית ריאטיבית ודלקת בריאות דוחחו בחולים המטופלים באוטו-immune. ספר לרופא מיד אם החלו להתקפת תסמינים כגון שיעול, קוצר נשימה וחום.

אם הינך חווה תגובה אלרגית חריפה, יתכן שהרופא יחליט כי אין יכול להשתמש יותר בסטלהר.

דיהומיים - יתכן **שיידרש טיפול דחוף**. דוח לרופא מיד אם הינך מבחין באחד מהסימנים הבאים:

- זיהומיים של האף או הגרון והצטננות הינם שכיחים (common) (יכולים להופיעبعد משתמש אחד מתוך 100 משתמשים)
 - זיהומיים בחזה, אינם שכיחים (uncommon) (יכולים להופיעبعد משתמש אחד מתוך 100 משתמשים)
 - דלקת ברקמה מתחת לעור (צלוליטיס), אינה שכיחה (uncommon) (יכולה להופיעبعد משתמש אחד מתוך 100 משתמשים)
 - שלבקת חוגרת (shingles) (סוג של פריחה כאבת עם שלפוחיות), אינה שכיחה (uncommon) (יכולה להופיעبعد משתמש אחד מתוך 100 משתמשים)
- סטלהר עלולה להחליש את יכולת הגוף להילחם בזיהומיים. זיהומיים מסוימים עלולים להחמיר, עשויים לכלול זיהומיים הנגרמים על-ידי וירוסים, פטריות, חיידקים (כולל שחפת), או טפילים, כולל זיהומיים המופיעים בעיקר אצל אנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת (זיהומיים אופורטוניסטיים). זיהומיים אופורטוניסטיים של המוח (דלקת מוח – אנצפליטיס, דלקת קרום המוח – מנינגיטיס), הריאות והעיניים דוחחו בחולים המטופלים באוטו-immune.

- עליך לעקב אחריו תסמינים של זיהום במהלך השימוש בסטלהה. התסמינים כוללים:
- חום, תסמים דמיי שפעת, הצעת לילה, ירידת משקל
- תחושת עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו עבר
- עור חם, אדום וכואב או פריחה כואבת עם שלפוחיות
- תחושת צריבה/שריפה בעת מתן שתן
- שלשול

הפרעות ראייה או אובדן ראייה

כאב ראש, נזיפות צוואריות, רגשות לאור, בחילה או בילבול יש לדוח לרופא מיד אם הinker מביח בתסמיני הזיהום הללו. אלו יכולים להיות תסמינים של זיהומים כמו זיהום בחזה, זיהום בעור, שלבכת חוגרת או זיהומים אופורטוניסטיים אשר עלולים להיות להם סיבוכים חמורים. יש לדוח לרופא אם יש לך זיהום שלא עבר או שמשיר לחזרה. הרופא יכול להחליט שאין יכול להשתמש בסטלהה עד אשר הזיהום יעבור. בנוסף, אמרו לרופא אם יש לך חתכים פתוחים או פצעים בעור, מאחר שהם עלולים להזדהם. התקלפות העור - עליה אדמומיות והתקלפות העור באזורי נרחבים בגוף, אלו עלולים להיות תסמינים לפסורייזיס אритרודרומה (erythrodermic psoriasis) או לדלקת עור המלווה בקילוף העור (exfoliative dermatitis), שם מצבים עוריים חמורים. יש לדוח לרופא מיד אם הבדיקה בסימנים אלו.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שכיחות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 10 משתמשים:

- שלשול
- בחילה
- הקאות
- עייפות
- סחרחות
- כאב ראש
- גרד
- כאבי גב, כאבי שרירים או כאבי מפרקים
- כאב גרון
- אדמומיות וכאב באזור מתן ההזרקה
- זיהום בסינוסים

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שכיחות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 100 משתמשים:

- זיהומי שינויים
- זיהום פטריתី בנתרתיק
- דיכאון
- אף סתום או גודש באף
- דימום, חבורה, קשיות העור, נפיחות וגידוד/עקבוץ באזור ההזרקה חולשה
- נפילה של העperf וחולשת שרירים מצד אחד של הפנים (שיתוק פנים, שיתוק על שם בל) - לרובה תופעה זו זמן קצר
- שינויים באזורי אדמומיות ושלפוחיות חדשות קטנות בצביע צהוב או לבן בעור, לעיתים מלולות בחום (pustular psoriasis)
- קילוף של העור (skin exfoliation)
- אכנה

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שיכלות להופיע بعد משתמש אחד מ��ור 1,000 משתמשים:

- אדומותיות וקילוף העור באזורי נרחבים בגוף, אשר עלולים להיות مجردים או כאבים (exfoliative dermatitis). תסמינים דומים מתפתחים לעיתים כימי טבוי בסוג תסמי הפסוריאזיס (erythrodermic psoriasis).
- דלקת של כל הדם הקטנים, אשר יכולה להוביל לפריחה בעור עם בליטות קטנות אדומות או סגולות, חום או כאב במפרקים (וסקליטיס).

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שיכלות להופיע بعد משתמש אחד מ��ור 10,000 משתמשים:

- שלפוחיות בעור שעולות להיות אדומות, מגרדות וכואבות (בולוס פמפיקואיד - bullous pemphigoid)
- זابت בעור או תסמנת דמוית זابت (פריחה אדומה, מורת וקשאית, באזורי בעור החשופים לשמש, יתכן עם כאבי פרקים).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- منع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה:
 - אחרי תאריך הת滂גה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂גה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - אם הנוזל שינה צבע, עכור או ניתן לראות חלקיקים זרים צפים בו (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
 - אם אתה יודע או חשב שייתכן שהתרופה נחשפה לטמפרטורות קיצונית (כמו הקפאה או חימום בטבעות).
 - אם התכשיר עבר נייר גמרץ.
 - אם מכסה הויאל (בקבוקן) שבור.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן בקירור (C-8°C-2), אין להקפיא. לשימוש חד פעמי.
- יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.
- אם יש צורך, ניתן גם לאחסן מזרק בודד של סטלהרה בטמפרטורת החדר עד C°30, לתקופה חד פעמית של 30 ימים לכל היוטר, באrizת הקרטון המקורי כדי להגן מאור. יש לרשום את התאריך שבו המזרק המוקן לשימוש הוצא לראשונה מהמזרק המקורי במקומות המזוהה לכך על גבי האריזה החיצונית. תאריך ההשלכה לפחות המזוהה יכול להיות מאוחר יותר מאשר מתאריך

התפוגה המוטבע על גבי הקרטון. אם המזרק אוחסן בטמפרטורת החדר (עד 30°C), אין להחזירו למקרר.
יש להשליך את המזרק לפחות המועד אם לא נעשה בו שימוש במשך 30 ימי אחסון בטמפרטורת החדר או לאחר תאריך התפוגה המקורי, המוקדם מבין השניים.
• אין לנער את סטלה. ניעור ממושך ונמרץ עלול לגרום נזק לתרופה.

סטלה מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד. כל תרופה שנשארת במזרק או בviol, יש לזרוק. אין להשליך תרופה למי השפכים או לפח האשפה הביתי. היועץ ברוקח כיצד להשליך תרופה שאין בהן צורך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, L-histidine, polysorbate 80, water for injection.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה:

נוול להזרקה צלול עד מבריק במקצת (ברק פנינה) וחסר צבע עד גוון צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלקיקים קטנים של חלבון, שkopfim למחצה או לבנים. כל קופסה מכילה מזרק אחד מוכן לשימוש/בקבוקן אחד.

גודלי אריזה:

- 1viol (בקבוקן) המכיל 45 mg/0.5 mL איסטקיינומאב
- 1 מזרק מוכן לשימוש המכיל 45 mg/0.5 mL איסטקיינומאב
- 1 מזרק מוכן לשימוש המכיל 90 mg/1 mL איסטקיינומאב

יצרן: סילג AG, הוושטראסה 201, CH-8200, שפהאוזן, שוויץ

בעל הרישום: ג'י-ס' הלט' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סטלה 45 mgviol: 142 36 32021

סטלה מזרק מוכן לשימוש: 146 81 33291

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.


נערך באוקטובר 2024.

הוראות שימוש במזרק מוכן לשימוש של סטלה (להלן "מזרק"):

בתחילת הטיפול, קיבל סיוע מהצוות הרפואי בזריקה הראשונה. עם זאת, אם תחליט עם רופאך כי ניתן להזריק סטלה באופן עצמאי, תעביר הדרכה כיצד להזריק את התרופה בעצמך. היועץ ברופא, אם יש לך שאלות בנוגע להזרקה עצמאית.

- אין לערבות את סטלה עם נוזלים אחרים להזרקה.
 - אין לנער את מזרק סטלה. ניעור חזק וממושך עלול לפגום בתרופה. אם התרופה עברה ניעור חזק, אל תשתמש בה.
- מזרק סטלה אינם מכיל משמרים ולכן אין לעשות שימוש בשאריות תמייה שנשארו במזרק לאחר ההזרקה. מזרק סטלה הינו תכשיר סטרילי לשימוש חד פעמי.

תמונה 1 מדונה איר נראת המזרק.



תמונה 1

1. בדוק את מספר המזרקים והכן את החומרים הנדרשים:

הכנת המזרק לשימוש

- הוציא את המזרק מהמקרר. הנה למזרק לעמוד מחוץ לקופסה למשך כחצי שעה, על מנת שהנווזל שבתוכו יגיע לטמפרטורה נוחה להזרקה (טמפרטורת החדר). אל תסיר את מכסה מחת המזרק בזמן שאתה מאשר מאפשר הגעה לטמפרטורת החדר.
- אחוז בגוף המזרק המוקן לשימוש כאשר המחת המכוסה פונה כלפי מעלה.
- אל תיגע בראש הבוכנה, בבוכנה, בכנפי מגן המחת או במכסה המחת.
- אל תמשוך את הבוכנה לאחר מכן אופן.
- אל תסיר את מכסה המחת מהמזרק עד שתתקבל הוראה לכך.
- אל תיגע בלשוניות הפעלה מגן המחת (מסומנות בכוכביות בתמונה 1) כדי למנוע CISIO המחת בטרם עת על-ידי מגן המחת.

בדוק את המזרק כדי לוודא:

- שמספר המזרקים וחזקם נכօן:
 - אם עלייר להזריק 45 מ"ג השתמש במזרק סטלהר אחד בן 45 מ"ג.
 - אם עלייר להזריק 90 מ"ג יתכן שתשתמש במזרק מוקן לשימוש אחד של סטלהר 90 מ"ג או שתשתמש בשני מזרקי סטלהר בני 45 מ"ג כל אחד. במקרה השני יהיה עלייר להזריק לעצמו 2 זריקות. בחר 2 מקומות שונים בגוף (לדוגמה זריקה אחת בירק ימין והשנייה בירק שמאל) והזרק את הזריקות אחת אחרי השנייה.
- שהתרופה נכונה.
- שתאריך התפוגה לא חלף.
- שהמזרק אינו פגום.
- שהתרופה שבחיליקן צולולה עד מבריקה במקצת (ברק פניה) וחסרת צבע עד גוון צהבהב בהיר ועלולה להכיל חלקיקים בודדים קטנים שקופים למראה או לבנים של חלבון, דבר שאינו יוצא דופן בתמייסות המכילות חלבון.
- שהתרופה שבחיליקן לא שינה צבעה או עכורה או מכילה חלקיקים זרים.
- שהתרופה שבחיליקן אינה קפואה.
- שהיכין מראש את כל הצד הדירוש ולהניח על משטח נקי. ציד זה כולל מגבן אנטיספטיק, כדור צמר גפן או פד גaza ומכל איסוף המיועד לחיצים חדים.

2. בחירה והכנת האזרור המיועד להזרקה:

בחר את האזרור המיועד להזרקה (תמונה 2):

- סטלהר ניתנת להזרקה תת עורית.
- אזרורים טובים להזרקה הם החלק העליון של הירך ומסביב לבטן, למרחק של לפחות חמישה סנטימטרים מהטבור.
- הימנע ככל האפשר מהזרקה בעור גגוע בפסוריאזיס.
- אם אתה מקבל את הזריקה מיד איש צוות רפואי או מטפל, הוא עשוי לבחור גם בחלק העליון של הזרע.



האזורים בצלע אפור מומלצים להזרקה


תמונה 2

הכן את האזור המועד להזרקה:

- שטווף ידיך בסודיות באמצעות סבון ומים חמים.
- נגב את האזור המועד להזרקה באמצעות מגבן אנטיספטן.
- אל תיגע באזור זה שוב לפני מתן הזרקה.**

3. הסר את מכסה המחת (תמונה 3):

- אין להסיר את מכסה המחת לפני שהינך מוכן להזריק את המנה.
- הרם את המזרק המוכן לשימוש, אחוז בגוף המזרק ביד אחת.
- משור את מכסה המחת החוצה והשלך את המכסה. אל תיגע בבוכנה כאשר אתה עושה זאת.




תמונה 3

- אתה עשוי לבדוק אויר בתוך המזרק או בטיפת נוזל בקצה המחת - שניהם מצביעים תקינים ואין צורך להסיר אותם.
- אל תיגע במחת ואל תאפשר מגע שלה בשום משטח.
- אל תשתמש במזרק אם הוא נפל ומכסה המחת לא היה במקומו. במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח.
- יש להזריק את התרפיה מייד לאחר הסרת מכסה המחת.


4. הזרק את המנה:

- אחוז את המזרק ביד אחת בין האמה לאצבע והנח את האגודל על ראש הבוכנה. השתמש ביד השנייה כדי לצבוט קלות את העור הנקי בין האגודל לאצבע המורה. אל תמחץ את העור בחזקה.
- אל תמשוך לאחר את הבוכנה בשום מצב.
- החדר את מחת המזרק ככל הניתן לתוך קפל העור שנוצר בתנועה אחת מהירה (תמונה 4).




תמונה 4

- הזרק את כל התרפואה באמצעות לחיצה על הבוכנה עד שראש הבוכנה נמצא לחלוtin בין כנפי מגן המחת (תמונה 5).




תמונה 5

- לאחר שהבוכנה נלחצה ככל שניתן, המשך ללחוץ על ראש הבוכנה, הוציא את המחת ושחרר את העור (תמונה 6).



תמונה 6

- הסר לאט את האגודל מרأس הבוכנה כדי שהמזרק הריק יעלה עד שלם המחת מכוסה במגן המחת (תמונה 7).



תמונה 7


5. לאחר ההזרקה:

- הנח מגבון אנטיספטיק על אזור ההזרקה ולחץ למשר מספר שניות.
- יתכן שתבחן בכמות מזערית של דם או נוזל באזור ההזרקה, מצב זה הינו נורמלי.
- אתה יכול להניח צמר גפן או פד גזה על אזור ההזרקה ולהחזיקו שם למשך עשר שניות.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה. אם יש צורך, הדבק אגד מדבק על האזור.

6. השמדה:

מזרקים ומחתמים משומשים יש להשילר לתוך מכל המועד לחפצים חדים. למען ביטחוןך ובראיותך וביתחונם של الآخرين, **אסור בתכלית האיסור** לבצע שימוש חוזר במחתמים ובמזרקים.

בקבוקונים ריקים, מגבונים אנטיספטיים וכיוד אחר ניתן להשילר לאשפה. השלים את המזרק הריק לתוך מכל המועד לחפצים חדים (תמונה 8).



תמונה 8

הוראות שימוש להזרקת סטלהר מבקבוקון:

בתחילת הטיפול, תקבל סיוע מהצוות הרפואי בזירה הראשונה. עם זאת, אם תחליט עם חופאר כי הינך יכול להזריק סטלהר באופן עצמי, תעבור הדרכה כיצד להזריק את התוropa בעצמך. היועץ רפואי, אם יש לך שאלות בנוגע להזרקה עצמית.

- אין לערבע את סטלהר עם נזלים אחרים להזרקה.
 - אין לנער את בקבוקון סטלהר. נייר חזק עשוי לפגום בתוropa. אם התוropa עברה נייר חזק, אל תשתמש בה.
- בקבוקון סטלהר אין מיל משמרים ולכן אין לעשות שימוש בשאריות תמייה שנשארו בקבוקון לאחר ההזרקה. בקבוקון סטלהר הינו תכשיר סטילי לשימוש חד פעמי.

1. בדוק את מספר הבקבוקונים והן את החומרה הנדרשים:

הוצא את הבקבוקון מהמקרר. הנח לבקבוקון לעמוד בטמפרטורת החדר למשך כחצי שעה, על מנת שהנוול שבתוכו יגיע לטמפרטורה נוחה להזרקה (טמפרטורת החדר).

בדוק את הבקבוקון/נים כדי לוודא:

• שמספר הבקבוקונים וחזקם נכון:

- אם עלייך להזריק 45 מ"ג או פחות השתמש בקבוקון סטלהר אחד בן 45 מ"ג.
- אם עלייך להזריק 90 מ"ג השתמש בשני בקבוקוני סטלהר בני 45 מ"ג כל אחד. יהיה עלייך להזריק לפחות 2 זריקות.בחר 2 מקומות שונים בגוף (לדוגמה זריקה אחת בירך ימין והשנייה בירך שמאל) והזרק את הזירות אחת אחרי השנייה. השתמש במחתם ומזרק חדשים לכל זריקה.


- שהתרופה נכונה.

- שתאריך התטוגה לא חלף.
 - שהבקבוקן אינו פגום והמכסה אינו שבור.
 - שהתמייסה שבבקבוקן צוללה עד מבריקה במקצת (ברק פניה) וחסרת צבע עד גוון צהבהב בהיר ועולה להכיל חלקיקים בודדים קטנים שkopים למיחזה או לבנים של חלבון, דבר שאינו יצא דופן בתמייסות המכילות חלבון.
 - שהתמייסה לא שינתה צבעה או עכורה או מכילה חלקיקים זרים.
 - שהתמייסה אינה קפואה.
- ילדים השוקלים פחות מ- 60 ק"ג צריכים מנה קטנה מ- 45 מ"ג. וזאת שאתה יודע את הכמות המתאימה (הנפח) שעלייך לשאוב מהבקבוקן וסוג המזרק הנדרש לך. אם אין לך יודע מה כמות המתאימה וסוג המזרק הנדרש, פנה לאחות, לרופא או לרוקח.
- יש להזכיר מראש את כל הצורך הדורש ולהניח על משטח נקי. ציוד זה כולל מזרק 1 מ"ל, מחט, מגבונים אנטיספטיים, כדור צמר גפן או פד גזזה ומכל איסוף המיועד לחפצים חדשים עבור המזרק (תמונה 1).



תמונה 1

- 2. בחירה והכנת האזרור המועד להזרקה:**
בחר את האזרור המועד להזרקה (תמונה 2):
- סטלהר ניתנת בהזרקה תת עורית.
 - אזרורים טובים להזרקה הם החלק העליון של הירך ומסביב לבטן, למרחק של לפחות חמישה סנטימטרים מהטבור.
 - הימנע ככל האפשר מהזרקה בעור נגוע בפסוריАЗיס.
 - אם אתה מקבל את הזרקה מיידי איש צוות רפואי או מטפל, הוא עשוי לבחור גם בחלק העליון של הזרוע.



האזורים המודגשיםocab פור מומלצים להזרקה
תמונה 2

הן את האזרור המועד להזרקה:

- שטוף ידיים בסודיות באמצעות סבון ומים חמים.
- נגב את האזרור המועד להזרקה באמצעות מגבן אנטיספטיק.
- אל תיגע באזרור זה שוב לפני מתן הזרקה.

3. הכנת המנה להזרקה:
הסר את מכסה הבקבוקן (תמונה 3).



תמונה 3

- אל תסיר את מעצור הגוף.
- נקה את מעצור הגוף באמצעות מגבן אנטיספטיק.
- הניח את הבקבוקן על משטח ישר.
- אחוז במזרק והסר את מכסה המחת של המזרק.
- אין לגעת במחת או לאפשר למחת לגעת בדבר.
- החדר את מחת המזרק אל תוך הבקבוקן דרך מעצור הגוף.
- הפוך את הבקבוקן והמזרק הנעוץ בו כך ראש הבקבוקן יפנה כלפי מטה.
- משוך את בוכנת המזרק ומלא את המזרק בכמות הנוזל שרשם לך הרופא.
- יש לוודא שהמחת מציה תמייד בתוך הנוזל שבבקבוקן על מנת למנוע יצירת בועות אויר בתוך המזרק (תמונה 4).



תמונה 4

- הוציא את המחת מהבקבוקן.
- אחוז במזרק כשהמחת פונה כלפי מעלה ובודק אם קיימות בועות אויר בתוך המזרק.

- אם יש בועות אויר, טפח קלות על גוף המזרק עד שכל בועות האויר ינועו כלפי מעלה (תמונה 5).



תמונה 5

- לחץ על בוכנת המזרק עד שכל האויר (אך לא הנוזל) יצא.
- אל תניח את המזרק ואל תאפשר למחת לגעת בדבר.

4. הזרקת התרופה:

- צבוט קלות את העור הנקי באמצעות האגולול והאצבע המורה. אל תמחץ את העור בחזקה.
- החדר את מחת המזרק לתוך קפל העור שנוצר.
- לחץ על בוכנת המזרק באמצעות האגולול לאט ובאופן אחיד, תוך כדי שמירה בעדינות על קפל העור, פנימה ככל האפשר, על מנת להזריק את כל תכולת המזרק.
- לאחר שלחצת על בוכנת המזרק עד הסוף הוציא את המחת ושחרר את קפל העור.

5. לאחר ההזרקה:

- הנה מגבון אנטיספטטי על האזור המזרק ולחץ למשר מספר שנויות.
- יתכן שתבחן בכמות מצערית של דם או נוזל באזור ההזרקה, מצב זה הינו נורמלי.
- אתה יכול להניח צמר גפן או פד גזה על האזור ההזרקה ולהחזיקו כר למשך עשר שנויות.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה. אם יש צורך, הדבק אגד מדבק על האזור.

6. השמדה:

- מזרקים ומחותים משומשים יש להשליך לתוך מכל המיועד לחפצים חדים. למען ביטחונך ובריאותך וביטחונם של الآخرين, **אסור בתכלית האיסור** לבצע שימוש חוזר במחותים ומזרקים.
- בקבוקונים ריקים, מגבונים אנטיספטיים וכיוד אחר ניתן להשליך לאשפה.