

تانتوم فيريدي غسول فم

التركيب:
المادة الفعالة:

كل 1 مللي ملليلوغرام يحتوي 0.0015 غرام بنزيدامين هيدروكلوريد (Benzydamine Hydrochloride)

لقائمة الماء غير الفعالة ومسبيبات الحساسية في الدواء أنتير في البند 2 - "معلومات مهمة عن جزء من مركيبات الدواء" وفي البند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك لديك أسلمة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلمة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

دواء مخصص للبالغين والمراهقين فوق جيل 12 سنة.

علىك التوجه للطبيب إذا اشتبه علامات المرض (عوارض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

1. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

- الدواء هو مسكن موضعي للألم ومضاد للالتهاب المخصوص لخفيف الألم في حالات التهاب الفم والحلق والتي تشمل:

- حالات التهابية - التهاب اللثة، فرحة فلاغنية وتقرّحات في الفم بعد علاجات بالإشعاعات.

- حالات صدمة - التهاب اللبم بعد استئصال اللوزتين أو كنتيجة لاستعمال أنبوب بربط بين الأنف والمعدة (nasogastric tube).

- طب الأسنان - لاستعمال بعد جراحات أسنان.

الفصيلة العلاجية:

تانتوم فيريدي يحتوي على بنزيدامين هيدروكلوريد الذي يتميّز لمجموعة مضادات الالتهاب الاستيرويدية (NSAID's).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجى) للمادة الفعالة بنزيدامين هيدروكلوريد (benzydamine hydrochloride) أو لأحد مركيبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (أنظر البند 6 "معلومات إضافية" وبدل 2 "معلومات مهمة عن بعض مركيبات الدواء").

- أنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل لأنك من المحتمل أن يضر برضيعك الذي لم يولد بعد أو يسبب مشكل في الولادة.

تحذيرات خاصة بخصوص استخدام الدواء:

- يجب تناول الدواء قاردي، أخير الطبيب إذا.

- يوجد لديك سوابق للربو.

- كنت أرجي لحمض أستيل ساليسيليك أو لأدوية أخرى من فصيلة مضادات الالتهاب الاستيرويدية (NSAIDs).

الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصص للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل.

تناولات/تفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، أخير الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل، الأعراض والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعرفي بذلك حامل أو تخططين الدخول في حمل، استشيري الطبيب قبل تناول الدواء.

لا يجوز استعمال تانتوم فيريدي إذا كنت في الأشهر 3 الأخيرة من الحمل لأنه قد يضر برضيعك الذي لم يولد بعد. قد يؤثر الاستعمال على قلبك وقلب طفلك للنزف ويسبب ولادة متاخرة أو أطوال

من المتوفع. لا يجوز استعمال تانتوم فيريدي خلال الأشهر ال 6 الأولى من الحمل، إلا إذا لزم الأمر وبناء على توصية من طبيبك. إذا كنت بحاجة إلى علاج خلال هذه الفترة أو عندما تواولين الدخول في حمل، يجب استعمال أصغر جرعة ولاقصر وقت ممكن. إذا قمت بالاستعمال بدءاً من الأسبوع ال 20 وصاعداً

لأكثر من عدة أيام، يمكن أن يسبب تانتوم فيريدي مشاكل في الكلى لدى الرضيع الذي لم يولد بعد، مما قد يؤدي إلى نقص السائل السلوبي (amniotic fluid) الذي يحيط بالرضيع (oligohydramnios) أو تضيق الأوعية الدموية (ductus arteriosus) في قلب الطفل، إذا كنت بحاجة إلى علاج لأكثر من بضعة أيام، فقد يوصي طبيبك بال المزيد من المتابعة.

معلومات مهمة عن بعض مركيبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليلول من الصوديوم (23 ملغ) بجرعة من 15 مل، أي أنه عملياً خالي من الصوديوم.

يحتوي هذا الدواء على ميليلول-پارا-هيدروكسى بينزوات الذي قد يسبب ردود فعل أرجية (قد تكون متاخرة).

يحتوي هذا الدواء على 1.2 غرام كحول (إيثانول) في كل جرعة من 15 مل.

كمية الكحول في 15 مل من هذا الدواء تساوي 30.3 مل من الجعة أو 12.12 مل من النبيذ.

يحتوي هذا الدواء على 2 ملغ بنزيل الكحول في كل جرعة من 15 مل المتساوية لـ 0.14 مل/مل. قد يتسبب بنزيل الكحول بردود فعل أرجية وتهيج موضعي بسيط

يحتوي هذا الدواء على مادة طعم نعناع (Mint flavour)

Benzyl alcohol, Cinnamyl alcohol, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, D-limonene, Linalool.

قد تسبب هذه المركيبات ردود فعل أرجية.

3. كيف ستستخدم الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الافتراضية بشكل عام هي:

البالغون والأطفال فوق جيل 12 سنة: 15 مل تانتوم فيريدي 3-2 مرات في اليوم

- لا يجوز استعمال الدواء لأكثر من 7 أيام متواصلة، إلا إذا أعطاك الطبيب أو طبيب الأسنان تعليمات أخرى.

- يمكن استعمال غسول الفم بدون تخفيفه، لكن إذا شعرت "بوخذ" يمكن تخفيفه مع ماء من أجل تقليل هذا الشعور.

- تانتوم فيريدي مخصوص لاستعمال كحسول في الفم أو للفرغرة في الحلق. يجب غسل الفم أو الغرغرة بحسب التعليمات التالية:

استعمال بدون تخفيف: يجب سكب 15 مل من تانتوم فيريدي إلى كأس القياس، وغمره في المدة 20-30 ثانية وبصفة.

استعمال بعد التخفيف: يجب سكب 15 مل من تانتوم فيريدي إلى كأس القياس وإضافة 15 مل آخر من الماء إلى كأس القياس حتى الخط الذي يشير إلى 30 مل. يجب الغرغرة لمدة 20-30 ثانية وبصفة.

بعد الاستعمال يجب غسل كأس القياس والاحتفاظ بها في مكان آمن لاستعمال آخر.

لا يجوز الطلع للاستعمال في حيز الفم فقط.

إذا تناولت حالتك أو لم تتحسن، يجب التوجه إلى الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا استعملت عن طريق الخطأ جرعة أعلى، بلعت من الدواء أو إذا قام طفل ببلع الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب وأحضر عليه الدواء معك.

إذا سببت استعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز استعمال جرعة مضاعفة. قم باستعمال الجرعة التالية في وقتها المعتاد واستشر الطبيب.

لا يجوز استعمال تانتوم فيريدي في العينين أو بمقربة من العينين. إذا أصاب غسول الفم العينين، يجب الغسل فوراً بماء بارد.

لا يجوز تناول الدواء في الظلام! تتحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال تانتوم فيريدي أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من المختلط أنها تأتي من أي واحد منها.

قد يكون بعض الأعراض الجانبية وخيمًا. إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية التالية، يجب تلقي علاج طبي فوري:

ردود فعل تحسسية وخيمية (صدمة تأثير)، التي يمكنها أن تتجلى بتصوره في التنفس، الآلام في الصدر أو ضغط في الصدر، وأو شعور بالإغماء/الدوران، حكة وخيمية في الجلد أو ظهور تكتلات على الجلد، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان وأو الحلق. قد تشكل كل هذه الأعراض خطراً على الحياة. في هذه الحالة يجب

فيما يلي أعراض جانبية إضافية، إذا أصبح أحدها وخيمًا يجب تبلغ الطبيب:

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

- خدر وأو شعور بالوخز في الفم وأو في الحلق.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (الأعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

- صعوبة في التنفس وصفير في التنفس.

- حكة.

- فطح جلدي.

أعراض شديدة غير معروفة (الأعراض التي لم يحدد شيوها بعد):

- احمرار في الجلد أو تورم.

- رد فعل تحسسي (فرط الحساسية).

إذا ظهر عارض جلبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو كنت تعاني من أعراض جانبية لم يتم ذكرها في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التنبيه عن الأعراض الجانبية:

يمكن تبلغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط "التنبيه عن أعراض جانبية" (www.health.gov.il)

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف تخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيد عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع ونطاق رؤيتهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة الخارجية.

تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- يجب تخزينه تحت 25 درجة مئوية.

- يجب تخزينه بالعبوة الأصلية من أجل الحماية من الضوء.

- بعد الفتح لأول مرة يمكن استعمال المحلول حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

- يمنع إبقاء الأدوية للمجاري أو القمامات. إسأل الصيدلي كيف بإمكانك التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:

Ethanol 96%, Glycerol, Methyl parahydroxybenzoate, Mint flavour, Saccharin, Sodium hydrogen carbonate, Polysorbate 20, Quinoline yellow 70% (E104), Patent blue V 85% (E131), Purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

تناولات تانتوم فيريدي غسول الفم هو محلول أخضر وصفاف المسوّق في قناني 120 مل أو 240 مل، مع كأس قابل.

قد لا تكون كل أحجام العبوات مسوقة.

صاحب التسجيل وعوانه:

راز روكتوت هض، شارع جيشر هايتس 31، المنطقة الصناعية عيمك حيف، إسرائيل.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

140-318100-00.

لتبسيط وتسهيل القراءة، صيغت هذه النشرة بلسان المذكرة. بالرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تقييم هذه النشرة في تموز 2024 حسب تعليمات وزارة الصحة.

RAZP3575-04