

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة**

**(مستحضرات) - 1986**

**يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط**

# **لاكساعدين**

## **أقراص مطلية**

**المادة الفعالة وكميته:**

يحتوي كل قرص مطلي على:

**(Bisacodyl 5 mg)**

المعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولادات الحساسية،  
أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"  
والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.**  
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا  
توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين.  
 فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية  
مشابهة لحالتك.

### **1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

الدواء مخصص للتخفيف من الإمساك لدى الكبار  
والأطفال فوق عمر 6 سنوات، لدى المرضى المتنقلين  
أو المرضى الملزمين للفراش، وكذلك يعطى في التحضير  
قبل فحوص معينة.

**الفصيلة العلاجية:**

مسهل الذي يحتوي على مادة مثيرة لتهيج الأمعاء الغليظة  
(contact laxative).

### **2) قبل إستعمال الدواء**

**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً (اليرجي) لـ بيساكوديل أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى (أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية")
- وجد لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريرات معينة أو أنك غير قادر على هضم سكريات معينة (أن القرص يحتوي على كمية قليلة من الكتوز)
- كنت تعاني من تجفاف شديد
- يوجد لديك مشكلة في الأمعاء تسمى علّوص "ileus" (إنسداد الأمعاء)
- يوجد لديك مشكلة شديدة في البطن مثل التهاب الزائدة الدودية (appendicitis)
- يوجد لديك ألم شديد في البطن يترافق بغثيان وقيء
- يوجد لديك إنسداد في الأمعاء أو قلة الأداء الوظيفي المزمن للأمعاء
- يوجد لديك إلتهاب في الأمعاء (الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة)

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

قد يسبب الإستعمال المتواصل التعلق بالمستحضرات المسهلة (مثل هذا) وإسهالات. لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة مطولة بدون إستشارة الطبيب.

هذا الدواء مخصص فقط للإمساك الذي يستمر لعدة أيام حيث أن إستعمال طويل الأمد بالدواء قد يسبب تعلق الأمعاء بالمسهلات لإحداث حركة أمعاء. قلة نشاط الأمعاء ليوم أو يومين لا تبرر إستعمال هذا الدواء.

لا يجوز إستعمال لاكساعدين لأهداف أخرى مثل "تنظيف الجسم" وما شابه.

### **هل الدواء ناجع في خفض الوزن؟**

إن المسهلات (مثل بيساكوديل) ليست ناجعة في خفض الوزن. هي لا تقلل من إمتصاص السعرات الحرارية أو الطعام. يمكنها أن تؤدي إلى براز مائي (إسهال)، آلام في البطن وتجفاف. قد يُظن بالخطأ أن التجفاف يُعتبر إنخفاضاً في الوزن.

إن فرط إستعمال المسهلات قد يضر بصحتك بالطرق التالية:

- التسبب بإضطرابات في توازن الشوارد الكهربائية والمعادن. الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيزيوم والفوسفور عبارة عن شوارد كهربائية ومعادن التي تلزم بتراكيز دقيقة جداً من أجل أداء وظيفي سليم للأعصاب والعضلات، بما في ذلك عضلات الأمعاء الغليظة والقلب. إن الإخلال بهذا التوازن الدقيق قد يؤدي إلى خلل في الأداء الوظيفي لهذه الأعضاء الحيوية.
- إن التجفاف الشديد قد يؤدي إلى إرتجاف، ضعف، تشوش في الرؤية، إغماء، ضرر كلوي، وفي حالات قصوى إلى الوفاة. يتطلب التجفاف في أحياناً متقاربة علاجاً طبياً.
- يجب الامتناع عن الإفراط في إستعمال المسهلات وذلك كي لا يتضرر الأداء الوظيفي المعيدي.

### **استعمال الدواء والطعام**

لا تستهلك الحليب في نطاق ساعة قبل أو بعد تناول أقراص لاكساعدين، لأن هذا الأمر يمنع العمل السليم لأقراص لاكساعدين.

**الحمل، الإرضاع والخصوبة**

يجب إستشارة الطبيب قبل تناول لاكساعدين إذا كنت في فترة الحمل، تخطيدين للحمل أو مرضعة.

### **السيادة وإستعمال الماكنات**

قد يشعر البعض من المتعالجين بدوار أو إغماء خلال تناول هذا الدواء. إذا كنت تشعر بهذه الأعراض فيجب الانتظار حتى تزول قبل السيادة أو قبل إستعمال الماكنات.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوي لاكساعدين على لكتوز مونوهيدرات. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأنه يوجد لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريرات معينة، استشر الطبيب المعالج قبل تناول الدواء. يحتوي كل قرص 40 ملг لاكتوز مونوهيدرات.

### **3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب، عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

### **المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:**

**المقدار الدوائي للكبار: 1-3 أقراص في المساء قبل النوم.**

إذا كانت هذه أول مرة تتناول فيها الدواء، إبدأ بقرص واحد وارفع المقدار الدوائي بحسب الحاجة.

لا تتناول أكثر من 3 أقراص للاليوم.

**المقدار الدوائي للأطفال فوق عمر 6 سنوات:**

قرص واحد في المساء قبل النوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

**يتبع ←**

## مدة العلاج

كما هو الأمر في مستحضرات مسهلة أخرى، لا يجوز تناول لاكساعدين لأكثر من 5 أيام متتالية. إذا كنت بحاجة لتناول مستحضرات مسهلة كل يوم، عليك التوجه للطبيب لإيجاد سبب الإمساك. فرط الاستعمال قد يسبب الضرر.

## طريقة إستعمال الدواء

- يجب بلع القرص بشكله الكامل مع ماء.
  - لا يجوز تناول الحليب، مضادات الحموضة، أو أدوية من فصيلة مثبطات مضخات البروتونات (أدوية لخفض الحموضة في المعدة) في نطاق ساعة قبل أو بعد تناول أقراص لاكساعدين. هذا لأنها تمنع العمل السليم لأقراص لاكساعدين.
  - يجب بلع الدواء في المساء قبل النوم.
  - لا يجوز المضغ أو السحق ولا يجوز شطر القرص لكي لا تضر في فعالية طلاء القرص.
  - يجب الحرص على شرب سوائل طيلة اليوم للمساعدة على تلذين البراز ومنع حدوث تجفاف.
- يشير المستحضر نشاط الأمعاء عادة خلال 6-12 ساعة، لكنه أحياناً يحتاج ذلك لوقت أطول (حتى 24 ساعة).

## إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت كمية كبيرة أكثر مما ينبغي من أقراص لاكساعدين أو تناولت أقراص لاكساعدين لفترة زمنية مطولة، قد يؤدي ذلك لضرر وقد تظهر الأعراض التالية:

- عدم توازن للسوائل والأملاح في الجسم الذي قد يؤثر على توتر العضلات (مثل عضلات الأمعاء) وعلى الأملاح في الدم.
- إنخفاض نسب البوتاسيوم في الدم (يسمى hypokalemia أو الدوار، ضعف في العضلات وعدم إنتظام نبضات القلب).
- تجفاف، قد يتجلّى بالشعور بالعطش، إغماء، صداع وقلة التبول.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

يجب المواخذة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لاكساعدين قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب حالاً إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية: رد فعل تحسسي شديد ونادر يشمل إنتفاخ الوجه، الحنجرة، وصعوبات في التنفس أو دوار.

**أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10):**

- تشنجات أو ألم بطن
- إسهال
- غثيان

**أعراض جانبية ليست شائعة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 100):**

- دم في البراز
- تقيؤ
- إنزعاج في البطن
- إنزعاج في فتحة الشرج وحولها
- دوار
- قد يسبب هذا الدواء تغيراً في لون البول. لا داعي للقلق من هذا التغيير.

## 6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على: Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, methacrylic acid copolymer dispersion, talc, esma spreng, starch, gelatin, povidone, magnesium stearate, triethyl citrate, polyethylene glycol 4000, simethicone, methyl cellulose 400, sorbic acid.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة قرص أبيض، مدور ومطلي، محدب من كلا الجانبين.

تحتوي العلبة على: 10، 20، 30، 50 أو 1,000 قرصاً من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

**اسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه**

تتبع إسرائيل م.ض، شارع دفورا هنفيه 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد هذه النشرة في كانون الأول 2020.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

018.16.24419

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

LAXA CTAB PL SH 0824