



נובמבר 2024

רופא/ה רוקח/ת נכד/ה,

חברת פאdagיס מבקשת לידע אתכם על עדכון העلون לרופא והעלון לצריכן של התכשיר:

## אריקסטרה 7.5 מ"ג / 0.6 מ"ל ARIXTRA 7.5 MG/0.6 ML

החומר הפעיל בתכשיר וחזקתו: fondaparinux sodium 12.5 mg / ml

התויה הרשומה לתכשיר בישראל :

Treatment of adults with acute Deep Vein Thrombosis (DVT) and treatment of acute Pulmonary Embolism (PE), except in haemodynamically unstable patients or patients who require thrombolysis or pulmonary embolectomy.

בהודעה זו מצוינים רק השינויים המהותיים על רקע זהוב. קיימים עדכוניים נוספים שאינם מהותיים  
ואינם נכללים בהודעה זו.

העלונים המעודכנים לצריך ולרופא נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:  
<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

בברכה,  
פאdagיס ישראל סוכנויות בע"מ

### עלון לרופא

#### 4.8 Undesirable effects

[...]

The safety of fondaparinux has been evaluated in:

- 3,595 patients undergoing major orthopaedic surgery of the lower limbs treated up to 9 days (Arixtra 2.5 mg/0.5 ml)
  - 327 patients undergoing hip fracture surgery treated for 3 weeks following an initial prophylaxis of 1 week (Arixtra 2.5 mg/0.5 ml)
  - 1,407 patients undergoing abdominal surgery treated up to 9 days (Arixtra 2.5 mg/0.5 ml)
  - 425 medical patients who are at risk for thromboembolic complications treated up to 14 days  
(Arixtra 2.5 mg/0.5 ml)
  - 10,057 patients undergoing treatment of UA or NSTEMI ACS (Arixtra 2.5 mg/0.5 ml)
  - 6,036 patients undergoing treatment of STEMI ACS (Arixtra 2.5 mg/0.5 ml)
- [...]
- These adverse reactions should be interpreted within the surgical or medical context of the indications.

The adverse event profile reported in the ACS program is consistent with the adverse drug reactions identified for VTE prophylaxis.

[...]

System organ class MedDRA	common (≥ 1/100, <1/10)	uncommon (≥ 1/1,000, <1/100)	rare (≥ 1/10,000, <1/1,000)
[...]			
<i>Blood and lymphatic system disorders</i>	anaemia, post-operative haemorrhage, uterovaginal haemorrhage*, haemoptysis, haematuria, haematoma, gingival bleeding, purpura, epistaxis, gastrointestinal bleeding, hemarthrosis*, ocular bleeding*, bruise*	thrombocytopenia, thrombocythaemia, platelet abnormal, coagulation disorder	retroperitoneal bleeding*, hepatic, intracranial/ intracerebral bleeding*
[...]			
<i>Metabolism and nutrition disorders</i>			hypokalaemia, non-protein-nitrogen (Npn) increased <sup>1*</sup>
<i>Nervous system disorders</i>		headache	anxiety, confusion, dizziness, somnolence, vertigo
<i>Vascular disorders</i>			hypotension
<i>Respiratory, thoracic and mediastinal disorders</i>		dyspnoea	coughing
<i>Gastrointestinal disorders</i>		nausea, vomiting	abdominal pain, dyspepsia, gastritis, constipation, diarrhoea

<i>Hepatobiliary disorders</i>		abnormal liver function tests, hepatic enzymes increased	bilirubinaemia
<i>Skin and subcutaneous tissue disorders</i>		rash erythematous, pruritus	
<i>General disorders and administration site conditions</i>		oedema, peripheral, pain, fever, chest pain, wound secretion	reaction at injection site, leg pain, fatigue, flushing, syncope, hot flushes, oedema genital

[...]

### עלון לצריכן

#### 4. תופעות לוואי

[...]

##### תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי שכיחות (מופייעות ב- 10-10 משתמשים מתוך 100)

- **דימום** (לדוגמה ממקום נייחות, מכיב קיבה קיימ, מהאף, מהחניכיים, דם בשתן, שיעול עם דם, דימום מהעיניים, דימום בחלי המפרקים, דימום פנימי ברחם)
- **הצטברות מקומית של דם** (בכל איבר/ רקמת גוף)
- **אנמיה** (ירידה במספר תאי הדם האדומים)
- **חברות/ שטפי דם**

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופייעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000)

[...]

- כאב בחזה
- קוצר נשימה
- פריחה או גרד בעור
- נזילה מותך פצע ניתוץ
- חום

[...]

- הפחתה או עליה במספר טסיות הדם (תאי דם הנחוצים לקרישת דם)

[...]

תופעות לוואי נדירות (מופייעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000)

[...]

- חרדה או בלבול
- עילפון או סחרחות, לחץ דם נמוך
- סחרחות או עייפות
- הסמקה
- שיעול

[...]

- כאב ברגל או כאב בטן

[...]

• הפחיתה ברמת האשlagen בدم

- כאב מסוביב לחלק העליון של הקיבה או צרבת.

[...]