

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب

وصفة طبيب فقط

تامسولوسين إينوquamد أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:

تامسولوسين هيدروكلوريد 0.4 ملغ

Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg

للقائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر انظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إنقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

- إحفظ بالنشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.
- وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج الإضطرابات في وظيفة الجهاز البولي السفلي المتعلقة بتضخم البروستات الحميد.

الفصيلة العلاجية: حاجب للمستقبلات الأدرينالية Alpha_{1A}

يحتوي تامسولوسين إينوquamد على المادة الفعالة تامسولوسين هيدروكلوريد. حيث يعمل عن طريق إرخاء العضلات في البروستات والإحليل (الأنبوب الذي يحمل البول نحو الخارج)، ويتيح مرور أسهل للبول عبر الإحليل ويساعد على التبول.

يوجد في غدة البروستات، في المثانة وفي الإحليل خلايا خاصة تحتوي على مستقبلات Alpha_{1A}، التي تؤدي إلى إنقباض العضلات في الإحليل. يعتبر تامسولوسين إينوquamد حاجب مستقبلات Alpha_{1A} الأمر الذي يقلل عمل هذه الخلايا الخاصة ويرخي العضلات، الأمر الذي يسهل عملية التبول.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليجي) للمادة الفعالة تامسولوسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. انظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".
- كنت تعاني من مشاكل شديدة في الكبد.
- كان يُغمى عليك أو تشعر بدوار عندما تجلس أو تقف بشكل مفاجئ. من الممكن أحياناً حصول دوار عند تناول تامسولوسين إينوquamد، خاصة إذا كنت تتناول أيضاً حاجبات ألفا₁ أخرى. إذا كنت تشعر بضعف أو بدوار، إحرص على الجلوس أو الإستلقاء مباشرة إلى أن تزول الأعراض.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ تامسولوسين إينوquamد أخبر الطبيب:

- إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى.
- إذا إجتزت أو كنت مقدماً على إجتياز عملية جراحية في العينين بسبب تعرق عدسة العين (كاتاراكت) أو تزايد الضغط داخل العين (چلوكوما).

يجب إبلاغ طبيب العيون حول إستعمالك للدواء، تخطيطك لإستعماله أو إستعمالك له في الماضي. حينئذ بإمكان طبيب العيون إتخاذ إحتياطات مناسبة بخصوص الأدوية والتقنيات الجراحية، التي يجب إستعمالها. يجب إستشارة الطبيب المعالج حول تأجيل أو التوقف المؤقت عن العلاج بالدواء قبل إجراء عملية جراحية من نوع كاتاراكت في العينين أو عملية جراحية لعلاج الضغط الزائد داخل العين.

الأطفال والمرأهقون:

الدواء غير مُخصص للأطفال والمرأهقين دون عمر 18 سنة، وذلك لأن الدواء غير ناجع لدى هذه الفئة السكانية.

الفحوص والمتابعة:

يجب إجراء فحوص طبية دورية الضرورية لمتابعة

حالتك الطبية.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية لخفض ضغط الدم، على سبيل المثال: فيراپاميل، ديلتیازام.

- أدوية لعلاج الـ HIV، على سبيل المثال: ريتونافير، إيندينافير.

- أدوية لعلاج تلوث فطري، على سبيل المثال: كيتوكونازول، إيتراكونازول.

- أدوية أخرى من فصيلة حاجبات ألفا، على سبيل المثال: دوكسازوسين، إيندورامين، الفوزوسين، پرازوسين.

- إيريتروميسين، مضاد حيوي لعلاج التلوثات.

يجب إبلاغ طبيبك بأنك تتعالج بـ تامسولوسين إينوquamد قبل كل عملية جراحية أو إجراء سني، لأن هناك إحتمال بأن يعرقل الدواء تأثيرات المادة المخدرة.

إستعمال الدواء والطعام:

بإمكان تناول تامسولوسين إينوquamد مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضااع والخصوبة:

تامسولوسين إينوquamد غير مخصص للإستعمال لدى النساء.

لدى الرجال، تم التبليغ عن حالات قذف شاذ للسائل المنوي (إضطرابات في القذف)، معنى ذلك أن السائل المنوي لا يخرج من الجسم عبر الإحليل، بل ينتقل إلى داخل المثانة البولية (قذف للخلف) أو أن حجم القذف ينخفض أو يختفي (عدم القذف). إن هذا العرض ليس ضاراً.

السياقة وإستعمال الماكنتات:

لا تتوفر معلومات على أن تامسولوسين إينوquamد يؤثر في القدرة على السياقة أو تشغيل الماكنتات أو المعدات.

مع ذلك، من المعروف بأن تامسولوسين إينوquamد قد يؤدي إلى نعاس، تشوش في الرؤية، دوار وإنغماء. إذا كنت تعاني من إحدى ما ذكر، فلا تقم بالسياقة و/أو تشغيل الماكنتات.

السحق/الشطر/المضغ:

لا يجوز مضغ أو سحق القرص! يجب بلع الدواء بأكمله

مع القليل من الماء.

قد تظهر بقايا من القرص في البراز. كون المادة الفعالة قد تحررت، فإن نجاعة الدواء لا تنخفض.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، فإن الأمر قد يؤدي لهبوط غير مرغوب به في ضغط الدم، إرتفاع في نظم القلب والشعور بالإغماء.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من نفس اليوم. إذا نسيت تناول الدواء وفوّت يوماً من العلاج، تناول المقدار الدوائي القادر في الوقت الإعتيادي.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً.

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكون واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو: قرص واحد في اليوم، يفضل في نفس الساعة كل يوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

السحق/الشطر/المضغ:

لا يجوز مضغ أو سحق القرص! يجب بلع الدواء بأكمله

مع القليل من الماء.

قد تظهر بقايا من القرص في البراز. كون المادة الفعالة

قد تحررت، فإن نجاعة الدواء لا تنخفض.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، فإن الأمر قد

يؤدي لهبوط غير مرغوب به في ضغط الدم، إرتفاع في نظم القلب والشعور بالإغماء.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ

من نفس اليوم. إذا نسيت تناول الدواء وفوّت يوماً من العلاج، تناول المقدار الدوائي القادر في الوقت الإعتيادي.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً.

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إذا توقفت عن تناول الدواء في وقت أبكر مما أوصى به الطبيب، فإن المشاكل الطبية قد تعود. إستشر الطبيب دائمًا إذا كنت تفكّر بالتوقف عن العلاج. لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تامسولوسين إينوڨامد قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فورًا إذا حصلت لديك إحدى الحالات التالية، من الجائز أن تحتاج إلى علاج طبي:

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- إنتفاخ الوجه، الحنجرة أو اللسان مع مشاكل في التنفس المتعلقة بالحساسية
 - أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:
 - إنتصاب متواصل ومؤلم غير مرتبط عادة بنشاط جنسي
 - طفح، إلتهاب وحويصلات في الجلد و/أو في الأغشية المخاطية للشفتين، العينين، الفم، الممرات الأنفية أو الأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس - جونسون)
 - عدم إنتظام نظم القلب بشكل شاذ (رجفان أذيني، إضطرابات في النظم، تسرع ضربات القلب)، صعوبات في التنفس (ضيق في التنفس)
- أعراض جانبية إضافية
- أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:
- دوار
 - قذف شاذ للسائل المنوي (إضطرابات في القذف) - معنى ذلك أن السائل المنوي لا يخرج من الجسم عبر الإحليل، بل ينتقل إلى داخل المثانة البولية (قذف للخلف) أو أن حجم القذف ينخفض أو يختفي (عدم القذف). إن هذا العرض ليس ضاراً

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- ضعف
- صداع
- سيلان أو إحتقان الأنف
- دوار عندما تجلس أو تقف
- ضربات قلب (نبض سريع أو غير منتظم)
- أعراض في الجهاز الهضمي مثل: غثيان وقيء، إسهال أو إمساك
- ردود فعل لف्रط الحساسية مثل: طفح، حكة، إحمرار، إنتفاخ موضعي وصعوبات في التنفس

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- إغماء

أعراض جانبية شيوعها غير معروفة (أعراض شيوعها لم يحدد بعد):

- تشوش في الرؤية
- خلل في الرؤية
- أنزفة من الأنف (رعاف - epistaxis)
- طفح جلدي شديد (erythema multiforme, exfoliative dermatitis)
- جفاف في الفم

بال مشاهدة لأدوية أخرى من هذا النوع، يمكن حدوث نعاس، تشوش في الرؤية أو إنتفاخ اليدين أو راحتي القدمين. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. إحفظ الدواء في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

عدد الأقراص في علبة الكرتون قد يكون 28 أو 30 قرصاً.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز والمستورد: إينوڨامد م.ض.، ص.ب.

المنتج: سينتون بي.في، نجميختن، هولندا.

تم إعدادها في آب 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 151-99-33641