

<div></div>	<div>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986</div>
התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד	
לנווימה 4 מ"ג כמוסות קשיחות	לנווימה 10 מ"ג כמוסות קשיחות
הרכב: <p>החומר הפעיל וכמותו: כל כמוסה קשיחה מכילה: לנוטיוניב (כס-סילאט) 4 מ"ג Lenvatinib (as mesilate) 4 mg</p>	הרכב: <p>החומר הפעיל וכמותו: כל כמוסה קשיחה מכילה: לנוטיוניב (כס-סילאט) 10 מ"ג Lenvatinib (as mesilate) 10 mg</p>

לקריאת החומרים הבולתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.
הרופא יבטיח את העלון עד סופו **בטרם השתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות, אך לעיבר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק גם אפילו אם נראה לך כי מחלתך זהה.

התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. השפעות התרופה על אנשים מתחת לגיל 18 אינן ידועות.

הטיפול בלנווימה יינתן על ידי רופא המנוסה בטיפולים נגד סרטן ויהיה בפיקוחו.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול במבוגרים עם סרטן מתקדם של בלוטת התריס כאשר הטיפול ביוז רדיואקטיבי לא סייע בבלימת המחלה.
לשילוב עם אברולימוס, לטיפול במבוגרים עם סרטן כליה מתקדם מסוג תאים בזירם, כאשר טיפולים אחרים [הנקראים "טיפול כגדל גזרם הגדלה של אנדויתל כלי הדם – VEGF (Vascular endothelial growth factor)] לא סייעו בעצירת המחלה.
כטיפול יחיד לטיפול בסרטן הכבד (*hepatocellular carcinoma*) במבוגרים שלא טופלו בעבר בטיפול סיסטמי בתרופה אחרת נגד סרטן. אנשים מקבלים טיפול בלנווימה כאשר סרטן הכבד שלהם בעל כוח מתקדם או שלא ניתן להסירו ניתוח.
לשילוב עם פמברוליזומב לטיפול בסרטן מתקדם או חודר של רירית הרחם (*carcinoma endometrial*) במבוגרות בנות הוסרטן התפשט במהלך או לאחר טיפול קודם בתרופות אחרות נגד סרטן המכילות פלטינום, ואשר לא ניתן להסירו באמצעות ניתוח או טיפול כימיו.
לשילוב עם פמברוליזומב לטיפול באשון במבוגרים עם סרטן כליה מתקדם (*advanced renal cell carcinoma*).

לנווימה חוסמת את הפעילות של חלבונים המכונים קולטיני טירוזין קינאז, אשר מעורבים בהתפתחות של כלי דם חדשים המספקים לתאים חמצן וחומרים מדינים ומסייעים לגדול.
חלבונים אלו יכולים להימצא בכמות גדולה בתאים סרטניים, ועל ידי חסימת פעילותם לנווימה יכולה להאט את קצב ההתרבות וצמיחת הגידול של התאים הסרטניים ולעזרו במניעת אספקת הדם הנחוצה לסרטן.

קצובה תרופיית:

מקבצי טירוזין קינאז לטיפול בסרטן.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל (לנוטיוניב) או לכל אחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6).
- את מניקה (ראי מטה סעיף "הריון, הנקה ואמצעי מניעה").

אזהרות מיוחדות הבוגעות בשימוש בתרופה

- לפני החלת הטיפול בלנווימה ספר לרופא אם:**
 - את סובל מלחץ דם גבוה
 - את אישה בגיל הפוריות (ראי מטה סעיף "הריון, הנקה ואמצעי מניעה")
 - יש לך היסטוריה של בעיות בלב או שבץ מוחי
 - יש לך בעיות כבדב או בכליות
 - עברת לאחרונה ניתוח או הקרנות
 - אתה צריך לעבור הליך כירורגי. רופאך עשוי לשקול להפסיק את הטיפול בלנווימה אם אתה עתיד לעבור הליך כירורגי משמעותי מכיוון שלנווימה עשויה להשפיע על ריפי פעצעים.
כיתן להחחיל את הטיפול בלנווימה מחדש לאחר שהושגלם ריפי הפצה כראוי
 - אתה מעל גיל 75
 - אתה משתתף לקבוצה אתנית שונה מאסייתיים או לבנים
 - אתה שוקל פחות מ- 60 ק"ג
 - סבלת בעבר מחיבורים או תקצינים (מוכרזים בשם פיסטולה) בין איברים שונים בגוף או מאיבר כלשהו לא העור
 - אם יש לך או הייתה לך מפרצת (אנורזימה aneurysm) (הרחבה והחלשות של דופן כלי הדם) או קרע בדופן כלי הדם.
 - היך סובל או סבלת מכאב בפה, שיניים ו/או לסת, נפיחות או פעצעים בתוך הפה, נימול או תחושת כבדות בלסת או אבדן שן. ייתכן שהרופא ימליץ לך על בדיקה בלפני החלת הטיפול בכך כן יא, זאת משום שלמליץ לך על בדיקה בלפני החלת הטיפול בכך כן יא, זאת משום שדווחו מקרים של נזק לעצם של הלסת (נמק של העצם) אצל מטופלים שהשתמשו בלנווימה. אם היך עומד לעבור טיפול שיניים חודרני או ניתוח דנטלי, ספר לרופא המטפל רך שאתה מטופל כעת בלנווימה, כי ייחוד אם הטיפול במקביל או טופלע במקביל בבדיקות של שיניים ופונאטיס (תרופות שנועדו לספל או למנוע מחלת של עצמות).
 - היך נוטל או נטלת תרופות ססימות שנועדו לטיפול באוסטאופורוזיס (תרופות שמעכבות פירוק עצם) או תרופות נגד סרטן שמשפיעות על היווצרות כלי דם (תרופות שמעכבות צמיחת כלי דם חדשים), משום שהסיכון לנזק לעצם של הלסת עלול להיות גבוה יותר.

ילדים ומתבגרים:

התרופה אינה מומלצת לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות מוקבע:

לפני שאתה נוטל לנווימה, ייתכן שהרופא שלך יבצע כמה בדיקות, למשל כדי לבדוק את לחץ הדם שלך ואת תפקוד הכבד או הכליות שלך ולראות אם בדם יש רמות נמוכות של מלחים ורמות גבוהות של הורמון המגרה את פליטת בלוטת התריס. הרופא ידון איתך בתוצאות הבדיקות ויחליט אם אפשר לתת לך לנווימה. ייתכן שתדקדק לטיפול נוסף בתרופות אחרות, הצטנך לטיפול מינון נמוך יותר של לנווימה או לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים של הסיכון לאמנע להופעת תופעות לוואי.

לפני הטיפול בלנווימה, דבר עם הרופא שלך אם אינך בטוח.

הרופא יבצע בדיקות בעוד:

- לחץ דם גבוה – יש לבצע בדיקות לחץ דם שבוע לאחר התחלת הטיפול, כל שבועיים במהלך החודשיים הראשונים לטיפול ופעם בחודש לאחר מכן.
- סימני מוקדם של נזק לכליות.
- סימני מוקדמים של נזק לכבד - יש לבצע בדיקות תפקודיות של הטיפול, כל שבועיים במהלך החודשיים הראשונים לטיפול ופעם בחודש לאחר מכן.
- בעיות בלב - הרופא יבצע בדיקות תקופתיות של א.ק.ג על פי שיקול דעתו.
- רמת מלחים נמוכה בדם - לפני התחלת הטיפול יש לתקן הפרעות אלקטרוליטים, אם קיימות. כמו כן, הרופא יבצע בדיקות תקופתיות של אלקטרוליטים (מגנזיום, אשלגן, סידן) על פי שיקול דעתו. יש לבצע בדיקת רמות סידן בדם לפחות פעם בחודש.
- תפקוד בלוטת התריס - הרופא יבצע בדיקות לתפקוד בלוטת התריס לפני תחילת הטיפול וכמהלך הטיפול, על פי שיקול דעתו.
לרם גבוהה של הורמון המגרה את בלוטת התריס (TSH) בדם - במידת הצורך הרופא יתאים לך את המינון של הורמון בלוטת התריס.
- חלבון בשתן.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול את הכמוסות עם או בלי אוכל.
הריון, הנקה ואמצעי מניעה:
יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני תחילת הטיפול בתרופה אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון.

- אם היך בגיל הפוריות ויכולה להרות, עליך להשתמש באמצעי מניעה יעיל במיוחד במהלך הטיפול בלנווימה ולמשך חודשי ימים לפחות לאחר סיום הטיפול.
- מכיוון שלא ידוע אם לנווימה עלולה לפגום בהשפעת הגלולה נגד הריון, אם את נוטלת גלולות כאמצעי מניעה, עליך להבטיח את עצמך בנוסף על ידי שימוש גם בשיטה חוסמת, כגון כובעון צווארי או קונדום, אם את פעילה מינית בתקופת הטיפול בלנווימה.
- אין לקחת לנווימה אם את מתכננת להריון במהלך הטיפול בטיפול מכיוון שהתרופה עלולה לגרום לנזק חמור לעובר.
- אם הרית במהלך הטיפול בלנווימה, עליך לייעו את הרופא מיד. הרופא יסייע לך להחליט באם להמשיך בטיפול.
- אין להביק בתקופת הטיפול בלנווימה מכיוון שהתרופה עוברת לחלב האם ועלולה להזיק לתינוקך באופן חמור.

נהיגה ושימוש במכונית:

לנווימה עלולה לגרום תופעות לוואי אשר יכולות להשפיע על כושרך לנהוג או להפעיל מכונית. הימנע מנהיגה או משימוש במכונית אם אתה חש סחרחורת או עייפות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

טיפול בסרטן מתקדם של בלוטת התריס: המינון המקובל למבוגרים בדרך כלל הוא:
24 מ"ג פעם ביום (2 כמוסות של 10 מ"ג וכמוסה אחת של 4 מ"ג).
אם היך סובל מפגיעה חמורה בתפקוד כלייתי או כבדי, המינון המומלץ הוא 14 מ"ג פעם ביום (כמוסה אחת של 10 מ"ג וכמוסה אחת של 4 מ"ג).
ייתכן והרופא יפחית את המינון במידה ותסבל מתופעות לוואי.

טיפול בסרטן כליה מתקדם מסוג תאים בזירם: המינון המקובל למבוגרים בדרך כלל הוא:

- 18 מ"ג פעם ביום (כמוסה אחת של 10 מ"ג ו- 2 כמוסות של 4 מ"ג) בשילוב עם טבליה אחת (5 מ"ג) פעם ביום של אברולימוס.
- אם היך סובל מפגיעה חמורה בתפקוד כלייתי או כבדי, המינון המומלץ הוא 10 מ"ג פעם ביום (כמוסה אחת של 10 מ"ג) בשילוב עם טבליה אחת (5 מ"ג) פעם ביום של אברולימוס.
- ייתכן והרופא יפחית את המינון במידה ותסבלו מתופעות לוואי.

טיפול בסרטן כבד: המינון המקובל למבוגרים בדרך כלל הוא:
המינון המומלץ של לנווימה תלוי במשקל הגוף שלך בעת תחילת הטיפול. במידה והיך נשוקל ק"ג או יותר, המינון הוא בדרך כלל 12 מ"ג פעם ביום (3 כמוסות של 4 מ"ג). במידה והיך נשוקל פחות מ-60 ק"ג, המינון הוא בדרך כלל 8 מ"ג פעם ביום (2 כמוסות של 4 מ"ג).
ייתכן והרופא יפחית את המינון במידה ותסבלו מתופעות לוואי.

טיפול בסרטן בטרטן מתקדם או חודר של רירית הרחם: המינון המקובל למבוגרות בדרך כלל הוא:
המינון המומלץ של לנווימה הינו 20 מ"ג פעם ביום (2 כמוסות של 10 מ"ג), בשילוב עם פמברוליזומב. פמברוליזומב ניתן על ידי הרופא שלך כהדלפה תוך-ורידית מינון של 200 מ"ג כל 3 שבועות.
ייתכן והרופא יפחית את המינון במידה ויהיו תופעות לוואי.

טיפול בסרטן כליה מתקדם: המינון המקובל למבוגרים בדרך כלל הוא:
המינון המומלץ של לנווימה הינו 20 מ"ג פעם ביום (2 כמוסות של 10 מ"ג), בשילוב עם פמברוליזומב. פמברוליזומב ניתן על ידי הרופא שלך כהדלפה תוך-ורידית מינון של 200 מ"ג כל 3 שבועות.
ייתכן והרופא יפחית את המינון במידה ויהיו תופעות לוואי.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטיילה:

- יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן עם מים או להמיסן.
- להמסת הכמוסות הוסף כף אחת של מים או מיץ תפוחים לתוך כוס קטנה והכנס את הכמוסות לנדלל **בשכמותן** (מבלי לטבוע או לכתוש אותן). המתן לפחות 10 דקות אותך כמות עררב לפחות 3 דקות על מנת להמיס את מטעפת הכמוסה. שחה את ההערובת. לאחר ששתיה, הוסף לכוס אותה כמות של מים או מיץ תפוחים, עררב ובלע.
- יש ליטול את הכמוסות בסביבות שעה מיד יום.
- למטופלים להימנע מחשיפה לחכולת הכמוסות ועל כן אין לפתוח את הכמוסות.

משך הטיפול:

אתה בדרך כלל תמשיך לקחת את התרופה כל עוד אתה מקבל תועלת מהטיפול.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, אתה עלול לסבול מתופעות הלוואי הבאות:
לחץ דם גבוה, בחילות, שלשולים, עייפות, חרדה, דלקת ברירית הפה, רמת גבוהה של חלבון בשתן, כאב ראש, התחרה של הסמכות כפי-ד/רגל (אדמומיות, כאב ונפיחות של העור בכפות הידיים והרגליים), אי ספיקת כליות או לב.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע יד מן התרופה, נהג מיד להופא או לחדר מיון של בית-חולים והבא את אירדת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש לנהוג כדלקמן:

- אין ליטול מנה כפולה (שתי מנות יחד) על מנת לפצות על מנה שנשכחה.
- אם נותרו לפחות 12 שעות עד לנטיילת המנה הבאה: אם את המנה שנשכחה ברגע שנדכרת. יש ליטול את המנה הבאה אחריה במועד הקבוע.
- אם נותרו פחות מ- 12 שעות עד לנטיילת המנה הבאה: יש לזלע על המנה שנשכחה. יש ליטול את המנה הבאה במועד הקבוע.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

- אין ליטול תרופות בחושה! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שהיך נוטל תרופה. הרכב משפיים אם היך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בלנווימה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא מיד אם אתה סובל מאחת מתופעות הלוואי הבאות – ייתכן וצטנך טיפול רפואי דחוף:

- חוסר תחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש חמור, פרכוס, בלבול, קושי בדיבור, שינויים בראייה או תחושת סחרחורת – אלו עלולים להיות סימנים של שבץ מוחי, דימום מוחי או השפעה על המוח כתוצאה מעלייה חמורה בלחץ הדם.
- כאב או לחץ בחזה, כאב בדוועות, בגב, בצוואר או בלסת, קוצר נשימה, דופק מהיר או לא סדיר, שיעול, שפתיים או אצבעות כחלחלות, תחושת עייפות יתר – אלו עלולים להיות סימנים לבעיה לבבית, לקריש דם בריאה או ללליפת אוויר מהריאה לתוך החזה כך שהריאה לא יכולה להתנפח.
- כאב חזק בטטן - עלול להירגם כתוצאה מחורר בדופן המעייים או פיסטולה (חור במעיים היוצר מעבר דמוי צינור אל חלק אחר בגוף או בעור).
- צואה שחורה, דמיות צפת או דמית או שיעול דמי - אלו עלולים להיות סימנים של דימום פנימי.

- עור צהוב או הצהבה של הלבן בעיניים (צהבת) או נמנום, בלבול, ריכוז ירוד – אלה עשויים להיות סימנים לבעיות כבד.
- שלשולים, בחילות והקאות – אלו הן תופעות לוואי שכיחות מאוד העלולות להיות חמורות אם הן גורמות לך להתייבשות אשר עלולה לגרום לאי ספיקת כליות. ייתכן והרופא ייתן לך תרופה על מנת להפחית תופעות לוואי אלו.
- כאב בפה, שיניים ו/או לסת, נפיחות או פעצעים בתוך הפה, נימול או תחושת כבדות בלסת או אבדן שן. אלה עלולים להיות סימנים של נזק לעצם של הלסת (נמק של העצם).

דווח לרופא שלך מיד אם היך מבחין באחת מתופעות הלוואי המתוארות מעלה.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע עם השימוש בלנווימה כטיפול יחיד:
תופעות לוואי שכיחות מאוד:
(משפיעות על יותר מ-1 מתוך 10 מטופלים)
לחץ דם גבוה או נמוך
חוסר תיאבון או ירידה במשקל
בחילות והקאות, עצירות, שלשול, כאב בטן, קלקול קיבה
תחושת עייפות יתר או חולשה
צרידות
נפיחות ברגליים
פריחה
פה יבש, כאוב או דלקתי, תחושת טעם מוזרה בפה
כאבי מפרקים או שרירים
תחושת סחרחורת
נשירת שיער
דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעייים)
הפרעות בשינה
שינויים בתוצאות בדיקות שתן: רמת חלבון (גבוהה) וזיהומים בדרכי שתן (השתנה תכופה וכאבים בעת מתן שתן)
כאב גב וכאב ראש
אדמומיות, כאבים ונפיחות של העור בכפות הידיים והרגליים (תסמונת כפי-ד/רגל)
תת פעילות של בלוטת התריס (עייפות, עלייה במשקל, עצירות, תחושת קור, עור יבש) ושינוי בתוצאות בדיקות דם ברמת ההורמון המגרה של בלוטת התריס (TSH) (גבוהה)
שינויים בתוצאות בדיקות דם – רמות אשלגן (נמוכות), רמות סידן (נמוכות), רמות מגנזיום (נמוכות) וכולסטרול (גבוה)
ירידה במספר תאי הדם הלבנים
שינויים בתוצאות בדיקת דם לתפקוד הכבד
רמות נמוכות של סטיות בדם, אשר עלולות לגרום לחבורות וקושי בריפוי פעצעים
שינויים בתוצאות בדיקת דם עבור תפקודי כליות ואי ספיקת כליות עליה בליפאז ועמילאז (אנדימים המעורבים בעיכול)

תופעות לוואי שכיחות:
(משפיעות על עד 1 מתוך 10 מטופלים)
אובדן נודלים בגוף (התייבשות)
דפיקות לב (פלפליציות)
עור יבש, מעובה ומגמד
תחושת נפיחות או עודף גדים
בעיות לבביות או קרישי דם בריאות (קשיי נשימה, כאבים בחזה) או באיברים אחרים שעלולים לכלול כאבים או לחץ בחזה, כאב בדוועות, גב, צוואר או לסת, קוצר נשימה, קצב לב מהיר או לא סדיר, שיעול, הכחלה של השפתיים והאצבעות ותחושת עייפות רבה.
כשל בכבד
נמנום, בלבול, ריכוז ירוד, ואובדן הכרה שעשויים להיות סימנים לכשל בכבד
תחושה כללית רעה
דלקת בכיס המרה
סימני שבץ מוחי, כולל אובדן תחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש חמור, פרכוסים, בלבול, קושי בדיבור, שינויים בראייה או תחושת סחרחורת.
פיסטולה בפי הטבעת (תעלה קטנה שנוצרת בין פי הטבעת לבין העור שמסביב)
תחושת סחרחורת
נשירת שיער
דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעיים)

ירידה במספר תאי הדם הלבנים
תת פעילות של בלוטת התריס (עייפות, עלייה במשקל, עצירות, תחושת קור, עור יבש) ושינויים בתוצאות בדיקת דם עבור ההורמון המגרה של בלוטת התריס (TSH) (רמות גבוהות)
שינויים בבדיקות דם לרמות אשלגן (נמוכות) ורמות סידן (נמוכות)
שינויים בתוצאות בדיקות דם למגנזיום (נמוך) ושינויים בתוצאות בדיקת דם לרמות כולסטרול (גבוהות)
חוסר תיאבון או ירידה במשקל
הפרעות בשינה
תחושת סחרחורת
כאבי ראש

דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעיים)
ירידה במספר תאי הדם הלבנים
תת פעילות של בלוטת התריס (עייפות, עלייה במשקל, עצירות, שלשול, כאב בטן, קלקול קיבה
תחושה כללית רעה
דלקת בכיס המרה
סימני שבץ מוחי, כולל אובדן תחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש חמור, פרכוסים, בלבול, קושי בדיבור, שינויים בראייה או תחושת סחרחורת.
פיסטולה בפי הטבעת (תעלה קטנה שנוצרת בין פי הטבעת לבין העור שמסביב)
תחושת סחרחורת
נשירת שיער
דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעיים)
ירידה בהפרשת הורמונים המיוצרים על ידי בלוטת יותרת הכליה (אדרנל)

תופעות לוואי שכיחותותן אינה ידועה:
(על תופעות הלוואי שלהלן התקבלו דיווחים מאז שהחל השיוק של לנווימה, אבל שכיחות הופעתן אינה ידועה)
סוגים אחרים של פיסטולה (חיבור לא תקין בין איברים שונים בגוף או בין העור לאזורים הצמודים לו, כמו הגרון וקנה הנשימה).
תסמנים חלויים במקום שבו הפיסטולה השמאלית של הבטן שעלול להיות מלווה בחום, בתסמינים חדשים או חריגים כלשהם כגון שיעול בזמן הבליעה.
התרחבות והיחלשות של דופן כלי הדם או קרע בדופן כלי הדם (מפרצת אנורזימה) ומפרצת (אנורזימה) או בתירה (דיסקציה) בכלי דם עורקי).

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע בשילוב של לנווימה עם אברולימוס:

תופעות לוואי שכיחות מאוד:
(משפיעות על יותר מ-1 מתוך 10 מטופלים)
לחץ דם גבוה
חוסר תיאבון או ירידה במשקל
בחילות והקאות, עצירות, שלשול, כאב בטן, קלקול קיבה
תחושת עייפות יתר או חולשה
צרידות
נפיחות ברגליים
פריחה
כאבי מפרקים או שרירים
דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעיים)
הפרעות בשינה
שינויים בתוצאות בדיקות שתן: רמת חלבון (גבוהה)
כאב גב וכאב ראש
אדמומיות, כאבים ונפיחות של העור בכפות הידיים והרגליים (תסמונת כפי-ד/רגל)
תת פעילות של בלוטת התריס (עייפות, עלייה במשקל, עצירות, תחושת קור, עור יבש) ושינויים בתוצאות בדיקת דם עבור ההורמון המגרה של בלוטת התריס (TSH) (רמות גבוהות)
שינויים בתוצאות בדיקות דם – רמות אשלגן (נמוכות), רמות סידן (נמוכות), רמות מגנזיום (נמוכות) וכולסטרול (גבוה)
ירידה במספר תאי הדם הלבנים
שינויים בתוצאות בדיקת דם לתפקוד הכבד
רמות נמוכות של סטיות בדם, אשר עלולות לגרום לחבורות וקושי בריפוי פעצעים
שינויים בתוצאות בדיקת דם עבור תפקודי כליות ואי ספיקת כליות עליה בליפאז ועמילאז (אנדימים המעורבים בעיכול)

תופעות לוואי שכיחות:
(משפיעות על עד 1 מתוך 10 מטופלים)
אובדן נודלים בגוף (התייבשות)
דפיקות לב (אנדימים המעורבים בעיכול)
עור יבש, מעובה ומגמד
תחושת נפיחות או עודף גדים
בעיות לבביות או קרישי דם בריאות (קשיי נשימה, כאבים בחזה) או באיברים אחרים שעלולים לכלול כאבים או לחץ בחזה, כאב בדוועות, גב, צוואר או לסת, קוצר נשימה, קצב לב מהיר או לא סדיר, שיעול, הכחלה של השפתיים והאצבעות ותחושת עייפות רבה.
כשל בכבד
נמנום, בלבול, ריכוז ירוד, ואובדן הכרה שעשויים להיות סימנים לכשל בכבד
תחושה כללית רעה
דלקת בכיס המרה
סימני שבץ מוחי, כולל אובדן תחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש חמור, פרכוס, בלבול, קושי בדיבור, שינויים בראייה או תחושת סחרחורת.
פיסטולה בפי הטבעת (תעלה קטנה שנוצרת בין פי הטבעת לבין העור שמסביב)
תחושת סחרחורת
נשירת שיער
דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעיים)
הפרעות בשינה
שינויים בתוצאות בדיקות שתן: רמת חלבון (גבוהה) וזיהומים בדרכי שתן (השתנה תכופה וכאבים בעת מתן שתן)
כאב חזק בטטן - עלול להירגם כתוצאה מחורר בדופן המעייים או פיסטולה (חור במעיים היוצר מעבר דמוי צינור אל חלק אחר בגוף או בעור).
- צואה שחורה, דמיות צפת או דמית או שיעול דמי - אלו עלולים להיות סימנים של דימום פנימי.

תחושת סחרחורת
דפיקות לב (פלפליציות)
תחושת נפיחות או עודף גדים
בעיות לבביות או קרישי דם בריאות (קשיי נשימה, כאבים בחזה) או באיברים אחרים שעלולים לכלול כאבים או לחץ בחזה, כאב בדוועות, גב, צוואר או לסת, קוצר נשימה, קצב לב מהיר או לא סדיר, שיעול, הכחלה של השפתיים והאצבעות ותחושת עייפות רבה.
לחץ דם נמוך
קשיי נשימה חמורים וכאבים בחזה, הנגרמים על ידי דליפת אוויר מהריאות אל תוך בית החזה, המקשה על התנפחות הריאות, פה יבש
תחושה כללית רעה
דלקת בכיס המרה
נשירת שיער
דימום (לרוב דימומים מהאף אך גם סוגי דימום אחרים כגון דם בשתן, בחורות, דימום מהחניכיים או מדופן המעיים)
ירידה במספר תאי הדם הלבנים
תת פעילות של בלוטת התריס (עייפות, עלייה במשקל, עצירות, תחושת קור, עור יבש) ושינויים בתוצאות בדיקת דם עבור הורמון המגרה בלוטת התריס (TSH) (רמות גבוהות)
פעילות יתר של בלוטת התריס (התסמינים עלולים לכלול קצב לב מהיר, הדעה וירידה במשקל)
שינויים בתוצאות בדיקות דם לרמות אשלגן (נמוכות) ורמות סידן (נמוכות)
שינויים בתוצאות בדיקות דם לרמות מגנזיום (נמוכות) ורמות כולסטרול (גבוהות)
חוסר תיאבון או ירידה במשקל
תחושת סחרחורת
כאב ראש
כאב גב
יובש, כאב או דלקת בפה, תחושת טעם מוזר בפה
דימום (לרוב, דימומים באף, אולם גם סוגים נוספים של דימום כגון דם בשתן, חלבות, דימום מהחניכיים או דופן המעי)
לחץ דם גבוה
צרידות
בחילות והקאות, עצירות, שלשול, כאב בטן
עליה ברמות מיליאז (אנדים המעורב בעיכול)
עליה ברמות ליפאז (אנדים המעורב בעיכול)
שינויים בתוצאות בדיקות דם לתפקוד הכבד
שינויים בתוצאות בדיקות דם לתפקוד כליה
אדמומיות, כאבים ונפיחות של העור בדיים וברגליים (תסמונת כפות הידיים והרגליים)
פריחה
כאבי מפרקים או שרירים
תחושת עייפות או חולשה רבה
נפיחות ברגליים

תופעות לוואי שאינן שכיחות:
(משפיעות על עד 1 מתוך 100 מטופלים)
זיהום סוכב או גירוי באזור פי הטבעת
סימני שבץ מוחי, כולל אובדן תחושה או חולשה בצד אחד של הגוף, כאב ראש חמור, פרכוסים, בלבול, קושיים בדיבור, שינויים בראייה או תחושת סחרחורת.
מיני שבץ (אירוע איסכמי חולף)
דלקת בלבול
פיסטולה בפי הטבעת (תעלה קטנה שנוצרת בין פי הטבעת לבין העור שמסביב)
דלקת במעי הגס (קוליטיס)
כשל כבדי או סימנים של נזק לכבד, לרבות עור צהבהב או הצהבה של לובן העין (צהבת) או נמנום, בלבול, ירידה בריכוז נזק לעצם של הלסת (נמק של העצם)
עור יבש, מעובה ומגמד
בעיות בריפוי פעצעים
סוגים אחרים של פיסטולה (חיבור לא תקין בין איברים שונים בגוף או בין העור לאזורים הצמודים לו, כמו הגרון וקנה הנשימה).
תסמנים חלויים במקום שבו הפיסטולה השמאל