

# פולידין® משחה

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986**  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

החומר הפעיל וריכוזו: פובידון יודין **Povidone Iodine 10%** (השווה ל-1% יודין) חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

## 1. **למה מיועדת התרופה?**

תרופה זו מיועדת לחיטוי פצעים וכוויות קלות ולטיפול בזיהומי עור.  
• **קבוצה תרפויטית:** חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

## 2. **לפני שימוש בתרופה:**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוד.

אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- **אם הנך לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.**
- יש להימנע משימוש על אזורים נרחבים של העור. יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בפצעים עמוקים.
- אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).
- **הריון והנקה:** אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

## 3. **כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

**שים לב: לא לבלוע!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

## **אופן השימוש בתכשיר – הוראות כלליות:**

- למרוח על פצע או האזור המטופל 2-4 פעמים ביום.
- ניתן למרוח גם על גזה ולכסות בתחבושת.
- אם לא חל שיפור במצב תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא.
- כתמים על הגוף או על בד כותנה ניתן לנקות ע"י שטיפה במים.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל את התרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

## 4. **תופעות לוואי:**

- כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין משחה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
  - בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: פריחה, גירוי, או נפיחות מתמשכים.
  - אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
- דיווח על תופעות לוואי:** ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. **איך לאחסן את התרופה?**

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
- **אל תגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- ניתן להשתמש עד 36 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

• יש לאחסן באריזה המקורית.

## **6. מידע נוסף**

• נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:  
**PEG 400, PEG 4000, Purified Water, Trisodium Phosphate**

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?  
משחה בצבע חום כהה, ריח אופייני של יוד, תכולה 15 גרם, 50 גרם.

• בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, רחוב בר יוחאי 9,  
בני ברק 5155309 או ת.ד. 39071, ת"א 6139001.

• שם היצרן וכתובתו: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,  
ד.נ משגב 20174.

• פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך נובמבר 2014 ועודכן בהתאם להוראות  
משרד הבריאות בתאריך דצמבר 2023.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 116.74.23415

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.