

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالفة (مستحضرات) 1986
يُوصف هذا الدواء بدون وصفة طبيب

ماء أكسجيني 3% لايف محلول

التركيبية:

ماء أكسجيني 3% w/w (Hydrogen Peroxide 3% w/w)
المواد غير الفعالة ومذيبات الحماضية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات
ملمخنة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
يجب عليك استعمال الدواء وفقًا للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء" في
هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة
الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتطهير.
الفصلية العلاجية: مستحضرات تطهيرية (مطهرة).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة الماء الأكسجيني، أو لأي من
المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- على جلد معافي وفي العينين.
- في تجاويف الجسم المغلقة وفي الجروح الناجمة عن الجراحات.
- في حقتة شرجية.
- لتطهير الأدوات الجراحية.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

هذا الدواء قد يبيّض الأقمشة.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة
طبيب وإضافات غذائية، فاحذر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً، أو قد تكونين حاملاً، أو مرضعاً، فيجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.
لا يجوز استعمال محلول الماء الأكسجيني خلال فترة الحمل أو خلال فترة الإرضاع إلا
إذا أمر الطبيب بذلك.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول:

لا يجوز بلعه! الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

كيفية الاستعمال:

يجب مسح المنطقة المخصصة للتطهير بقطعة من القطن المعرّف بالمادة.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى
غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول
فيها دواءً.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ماء أكسجيني 3% لايف إلى نشوء أعراض جانبية
عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي
واحد منها.

أعراض جانبية محتملة:

تكوّن حروق مؤثرة للتهيج على الجلد وعلى الأنسجة الرخوة والتي تتحول إلى مناطق
بيضاء من التسيخ الميت. الألم المرافق لهذا الشيء سيوزول بعد ما يقارب ساعة.
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض
جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ
عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة
الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن

أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول
أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب
التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على
العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في مكان بارد، في درجة حرارة دون 25°C.
- بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن على
العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Purified Water, Dibasic Sodium Phosphate, Phosphoric Acid

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

الدواء عبارة عن محلول صافٍ وعتيم اللون في قنينة بلاستيكية بنية بحجم 100 ملل.

المصنّع وصاحب الامتياز:

بن شمعون فلوريس م.ض. المنطقة الصناعية ميسجاف، بريد متجول ميسجاف
2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 11/2024 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

162-73-35786-00

من أجل التبسيط والتسهيل للقراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من
ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.