


CAMZYOS® (mavacamten)

קמזיויס® (մեկմետոն)

חברת למטופל



חברת זו ותוכנה אושרו על ידי משרד הבריאות
בנובמבר 2024 11/24 3500-IL-2400018

מבוא

קיבלת **חברת למטופל** זו מכיוון שהרופא רשם ל्र קמז'וס. קמז'וס היא תרופה לטיפול בלבד במרשם בלבד, המשמשת לטיפול במוגרים עם קרדיאומיופתיה היפרטרופית (HCM) חסימתית סימפטומטית עם תסמינים קלים עד משמעותיים בזמן פעילות יומיומית (II-III class AHA) לשיפור התסמינים ויכולת התפקוד.

**החברת למטופל מכילה כרטיס למטופל
שהכרטיס זה עמר בכל עת.**

ספר לכל איש צוות רפואי שאתה פוגש שאתה
מטופל בקמז'וס. **הכרטיס למטופל** מכיל מידע לגבי
הסיכון העיקריים בקמז'וס וכן פרטי קשר של
הרופא שרשם את המרשם.



אנא הקפד לקרוא את העלון לצרכן לטרופה זו, המספק מידע נוספת על קמז'וס.
אם יש לך שאלות נוספות, אנא פנה לרופא שרשם את המרשם, לרופא המטופל או
לרוקח.

מהי קרדיאומיופתיה היפרטרופית (HCM) חסימתית סימפטומטית?

קדיאומיופתיה היפרטרופית (HCM) גורמת לעיבוי והתקשות של דופן שריר הלב,
אשר מקשה על היכולת של הלב להתמלא דם. בחלק מהחולים עם
קדיאומיופתיה היפרטרופית, שריר הלב נעשה כה עבה שהיכולת של הדם לאזרום
מהלב לשאר חלק הגוף פוחתת או נחסמת כליל.

מידע בטיחותי חשוב



- קיימים שלושה סיכונים עיקריים הקשורים לטיפול בקמצזוס:
- אי ספיקת לב כתוצאה מתפקיד סיסטולי לקרי, מצב שבו הלב לא מצליח להזרים מספיק דם לשאר חלקי הגוף.
 - אי ספיקת לב כתוצאה מתגובה עם תרופות מסוימות או תוספים צמחיים.
 - רעלות עוברית.

תופעות לוואי אפשריות נוספות הקשורות לטיפול בקמצזוס מצויות בעלון לצרכן.

קמצזוס ואי ספיקת לב

אי ספיקת לב כתוצאה מתפקיד סיסטולי לקרי הוא מצב רפואי חמור שעלול לופיע לעיתים להוביל למותות.

דוח מיד לרופא שרשם את המרשם או לרופא המתפל או פנה **באופן מיידי** לקבלת עזרה רפואי אם אתה מפתח תסמינים חדשים של אי ספיקת לב או אם חלה חומרה בתסמינים קיימים, לרבות קוצר נשימה, כאב בחזה, تشישות, ופיוחת ברגליים, תחושה של דפוקות לב (פלפיטציות) או עליה מהירה במשקל. לפני תחילת הטיפול בקמצזוס ובמהלכו, דוח לרופא שרשם את המרשם או לרופא המתפל על כל מצב רפואי חדש או קיים שיש לך. מצבים רפואיים מסוימים, כמו דיזומים או פרפור פרוזודרים (קצב לב מהיר ובלתי סדייר) עלולים להשפיע על הטיפול בקמצזוס.

יכן פועלת קמצזוס?



קמצזוס פועלת על ידי הפחחת התכווצות היותר של הלב והפחחת החסימה של זרימת הדם אל הגוף. כתוצאה לכך, קמצזוס עשוי לשפר את התסמינים שלך ואת יכולתך להיות פעיל.

מהן בדיקות אקורדיוגרם (אקו לב) ומדוע הן חשובות?

בדיקות אקורדיוגרם (אקו לב) סידרות יסיעו לרופא המתפל להערך כיצד קמצזוס משפיעה על הלב שלך. בדיקת אקו לב היא בדיקה שעשויה שימוש בגלי קול ליצירת תמונות של הלב. בדיקות אלו מסייעות לרופא המתפל להבין כיצד הלב שלך מגיב לטיפול ולודוא WHETHER שатаה לתקן את המיןון המיטבי. בהסתמך על תוצאות בדיקות אקו לב, הרופא המתפל עשוי לשונו להעלוות, להוריד או לא לשנות כלכלותיו את הטיפול.

בדיקות אקו לב הראשונה תיערך לפני תחילת הטיפול בקמצזוס. בדיקות אקו לב למשך יוצאו 4, 8, ו-12 שבועות לאחר נטילת המנה הראשונה של קמצזוס ולאחר מכן כל 12 שבועות.

יהי עלייך גם לבצע בדיקות אקו לב, לפי הנחיות הרופא המתפל, אם חל שינוי במינון קמצזוס שאתה נוטל או אם חל שינוי במינון של תרופה אחרת שאתה נוטל. זה אומר שתצטרכ് לבצע בדיקות אקו לב למשך 4 ו-8 שבועות לאחר השינוי במינון ואז תחזור ללוח הזמנים הרגיל של בדיקות אקו לב כל 12 שבועות.

חשוב לתרום מושג ולהזכיר לרופא שרשם את המרשם.



לב כפי שהנחה אותך הרופא שרשם את המרשם. היעזר

בתזכורות בטלפון או ביוםן על מנת לזכור את התאריך

והשעה של בדיקות האקו לב שלך.

! מידע בטיחותי חשוב (המשך)



קמציאות ותגובהות בין תרופתיות

תרופות מסוימות, בינהן תרופות ללא מרשם ותוספים צמחים מסויימים, יכולות להשפיע על רמות קמציאות בגוף ועולות להגבר את הסיכון לאירוע לב כתוצאה מתפקיד סיסטולי לילי. דוחה לרופא שרשם את המרשם, לרופא המתפל או לרופח על כל תרופות המרשם שאתה נוטל, כמו גם על התרופות ללא מרשם, הויטמינים והתוספים הצמחיים, גם אם אין נוטל אותם באופן יומיומי. **אל** תחיל טיפול **ואל** תפסק טיפול או תנסה>Mainן בתרופה, בויטמינים או בתוסף צמחים מבלי להיעזע עם הרופא שרשם את המרשם, הרופא המתפל או הרופח.

ניתן למצוא דוגמאות לתרופות ותכשירים שעולמים להשפיע על רמות קמציאות בגוף **בטבלה 1**. לתשומתך, הדוגמאות משמשות להסביר ואינן מהוות רשימה מקיפה של כל התרופות האפשרות שעשוויות להתאים לקטגוריה זו.

נטילה באופן לא סדר של תכשירים שעולמים להשפיע על רמות קמציאות בגוף, כולל תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספים צמחים ומיצ' אשכליות, אינה ממלצת.

טבלה 1: דוגמאות לתרופות ותכשירים שעולמים להשפיע על קמציאות

לשימוש במצב רפואי הבא:	תרופה/תכשיר
כיב קיבה וצרבת (ריפלוקס)	אומפרוזול, איזומפרוזול סימטידין
דיאומים חידקיים	קלריטרומיצין, ריפאמפיצין
מצבים לבבים	ורפמיל, דילטיאזם
דיאומים פטורייטים	פלוקונזול, איטראקונזול, קטוקונזול, פוסקונזול, ויריקונזול
דיכאון	פלואוקסטין, פלוובוקסאמין
ריטונאביר, קובייסיסטאט	נגיף האידס (HIV)
מייצ' אשכליות	



מידע בטיחותי חשוב (המשך)

קמצזים ורעילות נזנברית

אם את בהירין או מתכוננת להרות, יש להיעזר ברופא טרם תחילת הטיפול בקמצזים. קמצזים עלולה לפגוע בעובר.

אם את אישה שיכולה להרות, תתקבשי להציג בדיקת הירון שלילית לפני שתתחלلي טיפול בקמצזים. עליך להשתמש באמצעי מניעהיעיל למניעת הירון במהלך הטיפול בקמצזים ובמשך 4 חודשים לאחר נטילת המנה האחרונה של קמצזים.

קמצזים עלולה להפחית את היעילות של אמצעי מנעה הורמוניים מסוימים. עליך להתייעץ עם הרופא המתפל לגבי אמצעי המונע המתאים ביותר עבורך. ספרי לרופא המתפל אם את שוקלת להרות.

דווחי לרופא שרשם את המרשם או הרופא המתפל **באופן מיידי** אם הרית או שאת חושדת شيיכן והritis במהלך הטיפול בקמצזים. הרופא שרשם את המרשם או הרופא המתפל ישוחחו איתך על אפשרויות הטיפול.



מתי עליי לפנות לקבלת עזרה רפואית?

ספר לכל איש צוות רפואי שאלוי אתה מגיע אם אתה מפתחת תופעות לוואי כלשהן בזמן שאתה נוטל קמצזים, גם תופעות לוואי שלא מוזכרות בחוברת למטופל זו.

מידע על תופעות לוואי אפשריות וכייד לדוח עליהן נמצא בעלון לצרכן. דיווח תופעות לוואי למשרד הבריאות מסיע לאוסף מידע בטיחותי נוסף על התפקיד.

ניתן לדוחות על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

או על ידי כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>
דווח **מייד** לרופא שרשם את המרשם או לרופא המתפל או פנה **באופן מיידי** לקבלת עזרה רפואית אם אתה מפתחת תס敏ים חדשים של אי ספיקת לב או אם חלה החמרה בתס敏ים קיימים, לרבות קוצר נשימה, כאב בחזה, תשישות, נפיחות ברגליים, תחושה של דפיקות לב (פלפיטציות) או עליה מהירה בمشקל.





יש לסרוק את הקוד
לקבלת הגירה
ה דיגיטלית של
חברת זו



חברת זו ותוכנה אושרו על ידי משרד הבריאות
בנובמבר 2024 11/24 3500-IL-2400018