

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,  
ברצוננו להודיעך על עדכון בעלונים לרופא ולצרכן של **Medrol 4 mg**:

המרכיב הפעיל:

methylprednisolone 4 mg

צורת מינון:

Tablet

התוויה:

Anti-allergic, anti-inflammatory for treatment of allergic conditions such as asthma and diverse skin disease, inflammatory states and arthritis.

**להלן העדכונים העיקריים בעלון לרופא:**

#### 4.4 Special warnings and precautions for use

Thyrotoxic Periodic Paralysis (TPP) can occur in patients with hyperthyroidism and with methylprednisolone-induced hypokalaemia.

TPP must be suspected in patients treated with methylprednisolone presenting signs or symptoms of muscle weakness, especially in patients with hyperthyroidism.

If TPP is suspected, levels of blood potassium must be immediately monitored and adequately managed to ensure the restoration of normal levels of blood potassium.

**להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן:**

2. לפני השימוש בתרופה

...

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

...

- היפרתירואידיזם (פעילות יתר של בלוטת התריס).

...

פנה מיד לרופא אם אתה חווה חולשת שרירים, כאבי שרירים, התכווצויות ונוקשות בזמן השימוש במתילפרדניזולון. אלה יכולים להיות תסמינים של מצב שנקרא שיתוק תירוטוקסי תקופתי, אשר עלול להתרחש בחולים עם פעילות יתר של בלוטת התריס (היפרתירואידיזם) אשר מטופלים במתילפרדניזולון. ייתכן שתצטרך טיפול נוסף כדי להקל על מצב זה.

...

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החמרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים אשר אינם מוצגים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה.

העלון המעודכן נשלח למשרד הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:  
[מאגר התרופות\(health.gov.il\)](http://health.gov.il)

לחילופין, לקבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פיזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, ת.ד. 12133 הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,  
אושרית עשת  
רוקחת ממונה