

**עלון לצרכן לפי תקנות הרחוקים (מכשירים) התשמ"א - 1986**
תרופה זו רחיבת בתכרשם רופא

## אמיטריפטילין טבע 10 מ"ג טבליות מצופות

**הרכב:**

כל טבליה מכילה:

אמיטריפטילין הידרוכלוריד 10 מ"ג (Amitriptyline Hydrochloride 10 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואופרגנים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוק.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך נ מחלתם דומה.

**מה עליי לדעת בנוגע לתרופה?**

תרופות נגודות דיכאון (Antidepressants) מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים. עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון: החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקנות וכדומה.

במידה וחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מייד לרופא.

### 1. למה מיועדת התרופה?

**פעילות רפואית:** לטיפול בסימפטומים של דיכאון ולטיפול בהרטבת לילה (Enuresis nocturna).

**קבוצה תרופטית:** מעכבי פיגת-נוואמין אל בררניים (NO6AA).

### 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש לחומר הפעיל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף")
- עברת לאחרונה התקף לב (אוטם שריר הלב)
- אתה סובל ממחלת לב, כגון: הפרעות בקצב הלב אשר נראות באלקטרוקארדיוגרם (א.ק.ג.), חסם לב או מחלת לב כלילית
- אתה חונט לתרופות מוקצות מעכבי מונואמינ' אוקסידאז (MAOIs)
- נטלת MAOIs במהלך 14 הימים האחרונים
- נטלת מילוקלומיד' יום קודם
- אתה סובל ממחלת כבד חמורה
- אתה מטופל באמיטריפטילין טבע על־ך להפסיק את התרופה ולחכות 14 ימים לפני התחלת טיפול ב-MAOIs
- אתה מתחמת לגיל 12 שנים

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

**ספר לרופא או לרוקח לפני התחלת הטיפול באמיטריפטילין טבע:** ייתכנו הפרעות בקצב לב ותת-לחץ דם אם אתה מקבל מינון גבוה של התרופה. תופעות אלו עלולות להתרחש גם במינומים רגילים אם קיימת מחלת לב.

**הארכת מקטע QT:**

בטיפול באמיטריפטילין דווח על בעיה בלב הנקראת הארכת מקטע QT (הפרעות בקצב הלב שניתן לזהות באלקטרוקארדיוגרם, א.ק.ג.) ועל הפרעות בקצב הלב (דפיקות לב מהירות או בלתי סדירות).

- ספר לרופא שלך אם:
- יש לך קצב לב איטי
- יש לך או היתה לך בעיה שבה הלב אינו מסוגל להזרים את הדם בגוף באופן תקין (עוצם שקראי אי-ספיקת לב)
- אתה נוטל תרופה אחרת כלשהי שעלולה לגרום לבעיות לב, או
- יש לך בעיה היגורנית לרמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם, או לרמה גבוהה של אשלגן בדם.
- אתה עומד לעבור ניתוח, ייתכן שיהיה צורך בהפסקת הטיפול עם אמיטריפטילין טבע לפני תום הניתוח אלושח. במקרה של ניתוח חירום, יש לדווח לרופא המרדים המטפל על נטילת תרופה זו.
- אתה סובל מעמליות יתר של בלוטת התריס (תירוואיד) או נוטל תרופות לטיפול בהפרעה בתפקוד בלוטת התריס.

**מחשבות אובדניות, החמרה של הדיכאון או החרדה**

אם אתה סובל מדיכאון, ייתכן שלעתים תחווה מחשבות על התאבדות או פגיעה עצמית. מחשבות אלו עלולות להתגבר בתחילת הטיפול בתרופות נגודות דיכאון, היות שלוחק יתר על עדהתרופות מתחילות להשפיע, בדרך כלל שבועיים, אך לעיתים יתר.

ישנה סבירות גבוהה יותר שתחשוב מחשבות אלה אם:

- היו לך בעבר מחשבות על התאבדות או על פגיעה עצמית
- אתה מבוגר צעיר. מידע מפורט על קליניים הראה עלייה בסיכון להתנהגות אובדנית במבוגרים (מתחת לגיל 25 שנים) עם מצבים ספסיכיאטריים, אצל טופלו בנוגדי דיכאון.

אם, בכל זמן שהוא, יש לך מחשבות על התאבדות או על פגיעה עצמית **פנה מייד לרופא או לבית חולים.**

ייתכן שיהיה מועיל לך לקרוב משפחה או לחבר קרוב שאתה מדוכא ולבקש מהם לקרוא עלון זה. אתה יכול לבקש מהם לומר לך אם הם חושבים שהדיכאון או החרדה שלך מחמירים, או אם הם מודאיכים לגבי שינויים בהתנהגות שלך.

**אירועים של מגיפה (mania)**

ייתכן שמטופלים מסוימים עם הפרעת מאניה-דפרסיה ייכנסו לשלב המאניה, שלב המאופיין פרעונות המשתנים הרבה ובמהירות, עליות מגדמת ופעילות גופנית מופרזת. במקרים אלו חשוב לפנות לרופא שכפי הנראה יחליף לך את התרופה.

**ספר לרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר מבעיה רפואית כלשהי ובמיוחד אם:**

- יש לך גלאוקומה צרת זווית (אובדן ראייה עקב לחץ תוך עיני גבוה באופן חריג)
- יש לך אפילפסיה, היסטוריה של התכווצויות או התקפים
- יש לך קושי במתן שתן
- אתה סובל מערמונית מגודלת
- יש לך מחלה בבלוטת התריס
- יש לך הפרעה ביפואליטי
- יש לך סכיזופרניה
- יש לך מחלת כבד חמורה
- יש לך מחלת לב חמורה
- יש לך היצרות של השוער (היצרות של פתח היציאה מהקיבה - pylorus stenosis) וחסימת מעיים שיתוקית (paralytic ileus)
- יש לך סוכרת (ייתכן שיתדרש התאמת מינון של תרופות סוכרת שלך)

אם אתה משתמש בנוגדי דיכאון כגון SSRIs, ייתכן שהרופא ישקול לשנות את המינון של התרופה (ראה סעיף 2 - "אינטראקציות/תגובות בין-תרופותיות"). שימוש בבופרופרון יחד עם אמיטריפטילין עלול לגרום לתסמונת סרטונין (מצב העלול להיות מסכן חיים), ראה סעיף 2 - "אינטראקציות/תגובות בין-תרופותיות".

לקשישים נטייה מוגברת לסבול מתופעות לוואי מסוימות כגון סחרחורת במעבר לעמידה עקב לחץ דם נמוך (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").
**שימוש בילדים ובמתבגרים:**

**דיכאון**

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מחזותבגרים מגיל 18 שנים לטיפול בדיכאון כיוון שבטחיות ועילות לטווח ארוך לא נקבעו בקבוצת הגיל הזו.

**הרטבת לילה**

א.ק.ג. צריך להתבצע לפני תחילת הטיפול עם תרופה זו כדי לשלול הפרעה של הארכת מקטע QT.

אין להשתמש בתרופה זו ביחד עם תרופה אנטיכולרגית (ראה סעיף 2 - "אינטראקציות/תגובות בין-תרופותיות").

מחשבות והתנהגות אובדניות עלולות להופיע בשלבים ראשונים של הטיפול וע נוגדי דיכאון גם עבור הפרעות אחרות שאינן דיכאון, לכן במטופלים עם הרטבה, יש לנקוט באותם אמצעי זהירות שצוינו עבור מטופלים עם דיכאון.

**אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות:**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:**

- מעכבי MAOIs (כגון פנלזין, אפרוניאזיד, איזוקרובוקסאזיד, ניאלמיד או טרניגליפרומין (לטיפול בדיאון)) או סגליילי (טיפול במחלת פרקינסון) אין לטילול תרופות אלו בז-מצית עם אינטראקציות/טיפול טבע (ראה סעיף 2 - "אין להשתמש בתרופה אם")

• אדרלין, אפדרין, אפרונלין, פנילאפרין ופנילפרופנואמין (אלו יוכלים להיות בתרופות לשיעול והצטננות ובחלק מהתרופות להרדמה)
• תרופות להרדדת לחץ דם, למשל, חוסמי מעלות סידן (כגון, דילטיאזד ורופאמיל), גואנתילין, בתנאזין, קולג'ידין, רסרפין ומתיילדופה
• תרופות אנטיכולרגיות כמו תרופות מסוימות לטיפול במחלת פרקינסון
• אביעות במערכת העיכול (כגון, אטרופין, היוסקימין)
• תיורידאזין (טיפול בסכיזופרניה)
• טרמדול (משכך כאבים)

• תרופות לטיפול בדיכאון דו-הימיים פטרייטיים (כגון, פלוקונאזול, טרבינאפין, קטונאזול ואיטראקונאזול)

• תרופות להרגעה (כגון, ברביטורטים)

• תרופות נגודות דיכאון (כגון SSRIs (פלוואוקסטין, פרוקסטין, פלובוקסמין), דולוקסטין ובופרופיון)

• תרופות לטיפול במחלות לב מסוימות (למשל, חוסמי-בטא, תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב)
• סימטיזין (טיפול בקצב קיבה)
• מיתלפנידאט (טיפול בהפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות - ADHD)
• ריטונאביר (טיפול ב-HIV)
• גלגולול למניעת היריון
• ריפאפיזין (טיפול בזיהומים)
• פינטסואין וקרבמפיין (טיפול באפילפסיה)
• St. John's wort (הפיריקום - צמח מרפא המשמש לטיפול בדיאון)

• תרופות לטיפול בבלוטת התריס

• חומצה ולפואליטי

• בופרופרין/**אופיאוידיים** - תרופות אלו עלולות להגיב עם אמיטריפטילין ועלולות לגרום לסימפטומים כגון התכווצויות שרירים אל רצונות כולל שרירים השולטים בתנועת העינים, אי שקט, הזיות, תרדמת, הזעה מרובה, רעד, רפלקסים מוגזמים, מתח שריר מוגבר, טמפרטורת גוף מעל 38°C. פנה לרופא אם אתה חש תסמינים כאלה.

אשת צריך לספר לרופא אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות משפיעות על קצב הלב כגון:

- תרופות לטיפול בדופק לא סדיר (כגון כינידין, סוטלול)
- אסטמיזול וטרפראדלין (טיפול באלרגיות ובקדחת השחפת)
- תרופות לטיפול במחלות נפש מסוימות (כגון, פימוזיד וטרסידול)
- ציסאפריד (טיפול בסוגים שונים של קשיי עיכול)
- הלופאטריין (טיפול במלריה)
- מתאדון (טיפול בכאב ולגמיהל)
- משתנים (כגון פורוסמיד)

אם אתה צריך לעבור ניתוח ולקבל חומר להרדמה כללית או מקומית יש לדווח לרופא על נטילת אמיטריפטילין טבע.

כמו כן, יש לידע את רופא השיניים על נטילת אמיטריפטילין טבע אם הטיפול כרוך במתן חומר הרדמה מקומי.

**שימוש בתרופה זמון:**

ניתן לטול את התרופה עם או ללא זמון.

**שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול:**

אם מומלץ לשנות אלכוהול בזמן נטילת תרופה זו כיוון שזה עלול להגביר את ההשפעה המרדמיה.

**היריון והנקה:**

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת בהריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

לקיחת התרופה אינה מומלצת במהלך ההריון אלא אם הרופא חושב שיש בכך צורך ורק לאחר שיתוף זהיר של התועלת מול הסיכון.

אם נטלת את התרופה במהלך החלק האחרון של ההריון, התינוק עלול לסבול מסחרים מגמילה כגון, עצבנות, מתח שרירים מוגבר, רעד, נשימה לא סדירה, שתייה ירודה, בכי חזק, אבידות שותן ועצרות.

הרופא ימליץ לך האם להתחיל/להמשיך/להפסיק הנקה או להפסיק

להשתמש בתרופה זו לפי שיקולים של תועלת הנקחה עבור הילד של ותועלת הטיפול התרופתי עבורך.

**הגיבה ושימוש במכונות:**

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לנמנום וסחרחורת. במיוחד בתחילת הטיפול. אל תנהג או תפעיל מכונות אם אתה חש שהתרופה משפיעה עליך באופן זה.

באשר לילדים, יש להזהרים מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

אמיטריפטילין טבע 10 מ"ג מכילה **לקטוז**. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, אנא ידע את הרופא לפני נטילת התרופה.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא.

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

**צורת הטיפול:**

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

אין לחכות את הטבליה, בהיעדר קו חניה.

אין מידע לגבי תטישה או לטישה של הטבליה.

אם נטלת **טבעות מינון גבוה יותר:** אם נטלת טבעות מנת יתר או אם טבעות בלב ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא אל חדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. התסמינים של מינון יתר כוללים:

- אישינום מורחבים • דופק מהיר או לא סדיר • קושי במתן שתן • יובש בפה ובלושן • חסימת מעיים • התקפים • חום • עצבנות • בלבול • הזיות • תועות ואל רצונות • תת-לחץ דם, דופק חלש, חיוורון • קושי נשימה • שינוי בצבע העור לכולול • ירידה בקצב הלב • ישנוניות • אובדן הכרה • תרדמת • תסמינים לבביים שונים כגון, חסם לב, אי ספיקת לב, תת-לחץ דם, הלם קרדיוגני, חמצנת מטבולית (אצידוזיס), תת-אשלגן בדם (היפוקלמיה) • מינון יתר בילדים עלול לגרום להשלכות רציניות. ילדים חשופים במיוחד לתרדמת, תסמינים לבביים, קושי בנשימה, הזיקפים, רמת נתרן נמוכה בדם, עיפות, נמנום, בחילות, הקאות ורמת סוכר גבוהה בדם.

**אם נסחת לקחת את התרופה:** אם נסחת לטילול תרופה זו בזמן שנקבע, יש לטילול מנה מייד כשזכרתי, אך בשום אופן אין לטילול שתי מנות ביחד.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק את טיטול התרופה:** גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה באופן פתאומי ללא התייעצות עם הרופא, הרופא יחליט מתי ויצעד להפסיק את הטיפול כדי להימנע מתסמינים לא רצויים שעלולים לקרות אם הטיפול מופסק בפתאומיות (כמו כאב ראש, הרגשה רעה, נדודי שינה, עצבנות).

**דיכאון:**

כמו בתרופות אחרות לטיפול בדיכאון, ייתכן שייקח מספר שבועות לפני שתרגיש שיפור.

בטיפול בדיכאון משך הטיפול הוא אישי ובדרך כלל נמשך לפחות 6 חודשים. משך הטיפול ייקבע על ידי הרופא.

יש להמשיך בטיפול כל עוד הרופא ממליץ. המחלה הבסיסית עלולה להימשך זמן רב. אם תפסיק את הטיפול מוקדם מדי, התסמינים שלך עלולים לחזור.

**הרטבת לילה:**

בטיפול בהרטבת לילה, הרופא ישקול אם יש צורך להמשיך בטיפול מעבר ל-3 חודשים.

**אין לטילול תרופות בחושרך! בודק התויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.** הרכב **משתמשים**. **אלי תיבה למוקרא רשימת תופעות הלוואי.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

**כמו בכל תרופה, השימוש באמיטריפטילין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי שונות המשתמשים. אלי תיבה למוקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.**

**יש לפנות מייד לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות:**

- התקפים של ראייה מטושטשת לסירוגין, ראיית הילה בצבעונית סביב נקודות אור או כאב בעיניים. יש לפנות מיידית לביקת עיניים בטרם תמשיך בטיפול, מצב זה יכול להעיד על גלאוקומה חריפה. תופעות לוואי בדירה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים.
- בעיה בלב הנקראת הארכת מקטע QT (ניתן לזהות אותה באלקטרוקארדיוגרם, א.ק.ג.). תופעת לוואי שכיחה העלולה להופיע **בעד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים**.
- עצירות קשה, כטן נפוחה, חום והקאה. תסמינים אלה עלולים להופיע כתוצאה מחסימת מעיים שיתוקית. תופעות לוואי בדירה העלולה להופיע **בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים**.
- הצהבת העור והלבן בעיניים (צהבת). עלולה להיות בעיה כבד. תופעת לוואי בדירה העלולה להופיע **בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים**.
- בחורות, בלדום, חיוורון או כאב גרם בתמשך וחום. תסמינים אלה עלולים להיות הסימן הראשון לבעיה בדם או במוח העצם. בעיה בדם יכולה להתבטא בירידה במספר תאי הדם האדומים (הנושאים חמצן לגוף), תאי הדם הלבנים (אשר מסמיעים הליחם בזיהום) וטסיות דם (אשר עוזרות בקרישה). תופעת לוואי בדירה העלולה להופיע **בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים**.
- מחשבות או התנהגות אובדניות. תופעת לוואי בדירה העלולה להופיע **בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים**.

**תופעות לוואי נוספות:**
**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר משתמש 1 מתוך עשרה:**

- שינויות/נמנום
- רעד בידיים או בחלקי גוף אחרים
- סחרחורת
- כאבי ראש
- דופק לא סדיר, חזק או מהיר
- סחרחורת כשנעמדים בגלל תת-לחץ דם (תת-לחץ דם אורתוסטטי)
- יובש בפה
- עצירות
- בחילה
- הזעה מוגברת
- עלייה במשקל
- קושי בדיבור או דיבור איטי
- תוקנות
- גודש באף

**תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100:**

- בלבול
- הפרעות בתפקוד המיני (ירידה בחשק המיני, בעיות זקפה)
- הפרעות קשב
- שינויים בטעם
- חוסר תחושה או תחושת עקצוץ בזרועות או ברגליים

• הפרעות בקואורדינציה

• אישונים מורחבים

• חסם בלב

• עיפות

• רמות נמוכות של נתרן בדם

• עצבנות

• הפרעות במתן שתן

• תחושת צמא

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000:**

- התרגשות, חרדה, קושי שינה, סינטי לילה
- פרכוסים
- צלצולים באוזניים (טנטון tinnitus)
- עלייה בלחץ הדם
- לשול, הקאה
- פריחה בעור, סרפדת (אורטיקריה), נפיחות של הפנים ושל הלשון
- קשיים במתן שתן
- ייבוז מוגבר של חלב אם או זדימה של חלב אם ללא הנקה
- עלייה בלחץ התוך-עיני
- התמוטטות
- החמרה של אי ספיקת לב
- תפקוד כבד לקוי (כגון, כולסטטיס)

**תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000:**

- ירידה בקצב הלב (בעיקר במטופלים קשישים), הזיות
- הפרעות בקצב הלב או בדופק • נפיחות של בלוטות הרוק • נשידת שיער
- רגישות מוגברת לאור השמש • הגדלת של בגברים • חום • ירידה במשקל
- תוצאות חריגות של בדיקות תפקודי כבד

**תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) - תופעות שמופיעות בפחות משתמש אחד מתוך 10,000:**

• מחלת שריר הלב • תחושה של חוסר מנוחה פנימי •צורך חדוף להיות בתנועה מתמדת • הפרעה של העצבים ההיקיפים • עלייה חריפה בלחץ בתוך הנין • הפרעות קצב לב מסוימות (מסוג הנקרא "torsade de pointes") • דלקת אלרגית של נאדיות הריאות ושל רקמת הריאה

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):**

- חוסר תיאבון • עלייה או ירידה ברמות הסוכר בדם • פרניה • הפרעות תנועה (תנועות לא רצונות או ירידה בתנועתיות) • דלקת אלרגית של שריר הלב • דלקת כבד • גלי חום • יובש בעיניים

עלייה בסיכון לשברים בעצמות נצפתה במטופלים שנטלו סוג זה של תרופות.

**אם הופכת תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.**

**דיוח על תופעות לוואי:**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיוח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המכפה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ילדים וטווח ראייתם של ילדים • מלאו תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אל תגרום להקמה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**נתאי אחסון:**

יש לאחסן מחמת ל-25°C.

**6. מידע נוסף**

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Calcium hydrogen phosphate dihydrate, lactose monohydrate, maize starch, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol