

## أميتريبتيلين تيفغ 10 ملغ أقراص مطبئة

التريبتيلين:  
يحتوي كل قرص على:

أميتريبتيلين هيدروكلوريد 10 ملغ (Amirptolyne Hydrochloride 10 mg)  
للمعلومات عن مبركات غير فعالة ومؤثرة للحساسية انظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".  
اقرأ النشرة **تضمن قبل نهايتها** وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

ماذا يجب على معرفته بالنسبة للدواء؟

تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب (Antidepressants) من خطر حدوث سلوكيات وأفكار انتحارية لدى الأطفال والمراهقين والبالغين الصغار.  
عند بدء العلاج بالدواء، على المتعالجين من كل الأعمار وأقاربهم، متابعة التغييرات السلوكية مثل: تفاهق الاكتئاب، أفكار انتحارية، عوانية وما شابه.  
إذا طرأت تغييرات كهذه، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

### 1. لم أعَ هذا الدواء؟

النشاط الطبيعي: أعراض الاكتئاب والوجع سلس البول الليلي (Enuresis nocturna).  
المجموعة العلاجية: مضادات امتصاص موناامين غير انتقائية (N06AA).

### 2. قبل استعمال الدواء:

يمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- أجرت مؤخرًا نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب)
- كنت تعاني من مرض قلبي، مثل: اضطرابات في نظم القلب التي تظهر في تخطيط كهربائية القلب (ECG)، احمرار القلب، أو مرض قلبي تاجي
- كنت تتناول أدوية من مجموعة مضادات موناامين أو أكسيداز (MAOIs)
- تتألمت MAOIs خلال آخر 14 يومًا
- تتألمت موكلوباميد في اليوم السابق
- كنت تعاني من مرض كبدي خطير
- كنت تألمج بـ أميتريبتيلين تيفغ، عليك التوقف عن الدواء والانتظار 14 يومًا قبل بدء العلاج بـ MAOIs
- كنت نوبة عن 12 سنة

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء:

أخير الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بـ أميتريبتيلين تيفغ:

من الجائز أن تكون هناك اضطرابات في نظم القلب وانخفاض ضغط الدم إذا تلتقيت جرعة مرتفعة من الدواء. قد تحدث هذه الأعراض أيضًا بجرعات عادية إذا كان هناك مرض قلبي.

إطالة مقطع QT:

يُلبغ في علاج أميتريبتيلين عن مشكلة في القلب تسمى إطالة مقطع QT (اضطرابات في نظم القلب التي يمكن اكتشافها في تخطيط كهربائية القلب، ECG) وعن اضطرابات في نظم القلب (ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة).

- كان لديك نظم قلب بطيء
- أخذت دواءً كان لديك مشكلة التي لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم في الجسم بشكل سليم (حالة تسمى قصور القلب)
- كنت تتناول أي دواء آخر قد يسبب مشاكل في القلب، أو
- أخذت دواءً كان لديك مشكلة تؤدي إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم، أو ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.
- كنت مريضًا على إجراء عملية جراحية، قد يكون من الضروري التوقف عن العلاج بـ أميتريبتيلين تيفغ قبل إعطاء مادة مخدرة. في حال عملية جراحية طارئة، يجب إبلاغ طبيب التخدير المعالج عن تناول هذا الدواء.
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid) أو تتناول أدوية لعلاج اضطراب وظيفة الغدة الدرقية.

أفكار انتحارية، تفاهق الاكتئاب أو الفلق

إذا كنت تعاني من الاكتئاب، قد تقاسي أحيانًا من أفكار حول الانتحار أو إيذاء نفسك. قد تتزايد هذه الأفكار في بداية العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب، حيث يستغرق الأمر وقتًا حتى تبدأ الأدوية بالتأثير، عادةً حوالي أسبوعين، ولكن أحيانًا أكثر.

هناك احتمال أكبر أن تفكر مثل هذه الأفكار إذا:

- أخذت أفكار حول الانتحار أو إيذاء نفسك في الماضي
- راودك بالأفكار. أظهرت المعلومات من التحارب السيروية ارتفاعًا في خطر السلوك الانتحاري لدى البالغين (دون عمر 25 سنة) الذين لديهم حالات نفسية، حيث تم علاجهم بمضادات الاكتئاب.

إذا أردت في أي وقت كان، أفكار حول الانتحار أو إيذاء النفس فتوجه فوراً إلى الطبيب أو المستشفى.

قد يكون من المجدي أن تخبر قريبًا للعائلة أو صديقًا مقربًا أنك مكتئب واطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم إخبارك إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب أو الفلق لديك يتفاقمان، إذا كانوا قلقين بشأن التغييرات في سلوكك.

أحداث الهوس (mania)

من الجائز أن يدخل حركتك اضطراب الهوس الاكتيبي في مرحلة من المرحلة تتميز بأفكار تتغير كثيرًا ويسرع، الهيجة المفرطة والنشاط البدني المفرط في هذه الحالات، من المهم التوجه إلى الطبيب الذي على ما يبدو سيوفر بتبديل الدواء لك.

أخير الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من أي مشكلة طبية، وخاصة إذا:

- كان لديك جلوكوما ضيقة الزاوية (فقدان الرؤية جراء ارتفاع ضغط داخل العين بشكل شاذ)
- كان لديك صرع، سابقة من النكصات أو النوبات
- كان لديك صعوبة في التبول
- كنت تعاني من تضخم البروستات
- كان لديك مرض في الغدة الدرقية
- كان لديك اضطراب ثنائي القطب
- كان لديك مرض الفصام
- كان لديك مرض كبدي خطير
- كان لديك مرض قلبي خطير
- كان لديك تضيق في الأبواب (تضييق فتحة الخروج من المعدة - pylorus stenosis)
- وانسداد الأمعاء الشلالي (paralytic ileus)
- كان لديك سكري (قد يتطلب الأمر ملاءمة جرعة أدوية السكري الخاصة بك)

إذا كنت تستعمل مضادات الاكتئاب مثل SSRIs، من الجائز أن يفكر الطبيب بتغيير جرعة الدواء (انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").

قد يؤدي استعمال بوبروبيونين سوية مع أميتريبتيلين إلى حدوث متلازمة السيروتونين (حالة التي قد تشكل خطرًا على الحياة)، انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية".

للمسنين مثل مزاييد المعالجة من بعض الأعراض الجانبية مثل دوام عند الانتقال إلى الوقوف جراء انخفاض ضغط الدم (انظر البند 4 - "الأعراض الجانبية").

الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين:

الكتاب

يُمنع إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة لعلاج الاكتئاب لأنه لم يتم إثبات السلامة والنجاعة على المدى الطويل في هذه الفئة العمرية.

سلس البول الليلي

يجب إجراء تخطيط كهربائية القلب ECG قبل بدء العلاج بهذا الدواء لنفي وجود اضطراب إطالة مقطع QT.

يمنع استعمال هذا الدواء سوية مع دواء مضاد للفعل الكولينري (انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").

يمكن أن تظهر الأكتئاب والسلوكيات الانتحارية في المراحل الأولى من العلاج بمضادات الاكتئاب أيضًا بالنسبة لاضطراب آخر غير الاكتئاب، لذلك لدى المتعالجين الذين يعانون من سلس البول، يجب اتخاذ نفس وسائل الحذر التي ذكرت بالنسبة للمتعالجين الذين لديهم اكتئاب.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ويشكل خاص، إذا كنت تتناول:

مضادات MAOIs (مثل فينيلزين، إيزوفينازيد، إيزوكاربوكسازيد، نيفاميد أو ترانيلسيبرون (لعلاج الاكتئاب)) أو سيليجلين (لعلاج مرض باركنسون) يُمنع تناول هذه الأدوية بالتزامن مع أميتريبتيلين تيفغ (انظر البند 2 - "يمنع تناول الدواء إذا") أدريبتلين، إيفيرتين، إيزوبروبيلين، ثورادرائين، فينيل إيفرين وفينيل بروبانولامين (هذه يمكن أن تكون في أدوية السعال أو الرشع وفي بعض أدوية التخدير)

دواء خفض ضغط الدم المرتفع، مثلاً، حاصرات قنوات الكالسيوم (مثل، ديلتيازيم وفيراباميل)، حو اثينيدين، بيتانيدين، كلوندين، ريسبرين وميثيل دوبا

أدوية مضادة للفعل الكولينري مثل بعض الأدوية لعلاج مرض الباركنسون أو مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل أرتزين، هيسوكسيم)

تيوريدازين (لعلاج الفصام)

ترامادول (مسكن للألم)

أدوية لعلاج حالات العدوى الفطرية (مثل، فلوكونازول، تريبنافين، كيتوكونازول وإيتراكونازول)

أدوية مهدئة (مثل، باربيتورات)

أدوية مضادة للاكتئاب (مثل SSRIs (فلوكستين، باروكستين، فلوفاكسامين، دولوكسيتين وبوبروبيون)

أدوية لعلاج أمراض معينة للقلب (مثل، حاصرات بيتا، أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب)

سيميبتيد (لعلاج قرحة المعدة)

ميثيلفينيديت (لعلاج اضطراب الإصغاء والتركيز مع فرط النشاط - ADHD)

ريتنوتافير (لعلاج HIV)

أقراص منع الحمل

ريفاميسين (لعلاج حالات العدوى)

فينيتوين وكاربامازيبين (لعلاج الصرع)

St. John's wort (هيبيريكوم - نبتة طبية تُستعمل لعلاج الاكتئاب)

أدوية لعلاج الغدة الدرقية

حمض الفالوريك

بوبروبيون/فين/أفونلات - هذه الأدوية قد تتفاعل مع أميتريبتيلين وقد تسبب أعراضًا مثل نقصانات عضلية لا إرادية، بما في ذلك العضلات المسيطرة على حركة العينين، عدم هوء، هوسات، غيبوبة، تعرق مفرط، ارتفاع، منعكسات مفرطة، زيادة توتر العضل، درجة حرارة الجسم فوق 38°C. توجه إلى الطبيب إذا شعرت بمثل هذه الأعراض.

يجب أن خراب الطبيب إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أدوية تؤثر على نظم القلب مثل:

أدوية لعلاج النقص غير المنتظم (مثل كينيدين، سوتالول)

أستيميزول وتيرفينادين (لعلاج حالات التحسس وحصى الكلى)

أدوية لعلاج أمراض نفسية معينة (مثل، بيموريد وسرنتيدول)

سيزايريد (لعلاج أنواع مختلفة من حالات عسر الهضم)

هالوفانترين (لعلاج الملاريا)

ميثادون (لعلاج الألم والظلم)

مدرات بولية (مثل فوروسيميد)

إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية وتلقي مادة للتخدير العام أو الموسمي يجب إخبار الطبيب عن تناول أميتريبتيلين تيفغ.

كذلك، يجب إعلام طبيب الأسنان عن تناول أميتريبتيلين تيفغ إذا كان العلاج ينطوي على إزالة مادة التيجاجة للمرضى.

استعمال الدواء والغذاء:

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول:

لا يوصى شرب الكحول أثناء تناول هذا الدواء لأنه قد يزيد من التأثير المخدر.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملًا أو مرضعة، تعتقدن أنك حامل أو تحظين لأن تحملي، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

لا يوصى بتناول الدواء أثناء الحمل إلا إذا كان يعتقد الطبيب أن هناك حاجة لذلك فقط بعد التفكير بحذر بالفائدة مقابل الخطر.

إذا تناولت الدواء خلال الجزء الأخير من الحمل، فقد يعاني الطفل من أعراض الانسحاب مثل، عصبية، زيادة توتر العضلات، ارتفاع، تنفس غير منتظم، سوء الشرب، بكاء شديد، احتباس البول وإمساك.

سوف يوصيك الطبيب سواء بالبدء بالإرضاع/المواصلة/التوقف عن الإرضاع أو التوقف عن استعمال هذا الدواء بناءً على اعتبارات تتعلق بالفائدة الرضاعة بالنسبة لطفلك وفائدة العلاج الدوائي بالنسبة لك.

السفالة واستخدام الماكينات:

قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نعاس ودوار، خاصة في بداية العلاج. لا تقم بالسيارة أو تشغيل الماكينات إذا شعرت أن الدواء يؤثر عليك بهذه الطريقة.

أما بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:

تحتوي أقراص أميتريبتيلين تيفغ 10 ملغ على لاكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يرجى إبلاغ الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب ما حدده المعالج.

طريقة تناول:

يجب بلع الدواء مع قليل من الماء.

يمنع شطر القرص في حالة عدم وجود خط للشطر.

لا توجد معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى:

كثيرًا من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك. تشمل أعراض الجرعة المفرطة:

إسراع حديقات العينين، نبض سريع أو غير منتظم، صعوبة التبول، جفاف في الفم واللسان، انسداد الأمعاء، غيبوبة، سخونة، عصبية، ارتباك، هوسات، حركات لا إرادية، انخفاض ضغط الدم، نبض ضعيف، شحوب، صعوبات تنفس، تغير في لون الجلد التي قد تشكل خطرًا على الحياة)، انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية".

الجلد التي قد تشكل خطرًا على الحياة)، انظر البند 2 - "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية".

للمسنين مثل مزاييد المعالجة من بعض الأعراض الجانبية مثل دوام عند الانتقال إلى الوقوف جراء انخفاض ضغط الدم (انظر البند 4 - "الأعراض الجانبية").

استقلابي (acidosis)، انخفاض البوتاسيوم في الدم (hypokalemia)

قد تكون الجرعة المفرطة لدى الأطفال معرضون بشكل خاص لحدوث غيبوبة، أعراض قلبية، صعوبة في التنفس، نوبات، انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، إرقاق، غثاس، حالات غثيان، تقيؤات وارتفاع مستوى السكر في الدم. إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناول جرعة بمجرد أن تتذكر، ولكن يُمنع تناول جرعتين معاً بأي حال من الأحوال. يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء: حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بشكل فجائي بدون استشارة الطبيب، سيقدر الطبيب متى وكيفية التوقف عن العلاج لتجنب الأعراض غير المرغوب فيها التي قد تحدث إذا تم إيقاف العلاج فجأة (مثل صداع، شعور سيئ، إرق، عصبية).

#### الكتابة:

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تشعر بالتحسن. في علاج الاكتئاب تكون مدة العلاج شخصية وتستمر عادة 6 أشهر على الأقل. يتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب. يجب الاستمرار بالعلاج طالما يوصيك الطبيب بذلك. قد يستمر المرض الأساسي لفترة طويلة. إذا قمت بوقف العلاج مبكراً جداً، قد تعود الأعراض لديك.

#### سلس البول الليلي:

في علاج سلس البول الليلي، سينظر الطبيب فيما إذا كانت هناك حاجة لمواصلة العلاج بما يتجاوز 3 أشهر.

يُمنع تناول الألبان في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. أعراض جانبية:

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال أمينيريتيلين تبعاً أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان لديك أي من الأعراض الجانبية التالية:

- نوبات من تشوش الرؤية المنقطع، رؤية هالة ملوثة حول نقاط الضوء أو ألم في العينين.
- يجب التوجه فوراً لإجراء فحص للعينين قبل استمرارك بالعلاج، هذه الحالة قد تشير إلى حدوث جلوكوما حادة. وهو عرض جانبي نادر قد يحدث لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.
- مشكلة في القلب تسمى إمالة مقطع QT (يمكن كشفها من خلال تخطيط كهربائية القلب، ECG). وهو عرض جانبي شائع قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10 مستعملين.

إسهال شديد، انتفاخ في البطن، سخونة وتقيؤ. قد تظهر هذه الأعراض نتيجة انسداد الأمعاء الشللي. هنا عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

- اصفرار الجلد وبيضاء العينين (يرقان). قد تكون هناك مشكلة في الكبد. هذا عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.
- كدمات، زرق، شحوب أو ألم مستمر في الحجرة وسخونة. قد تكون هذه الأعراض هي أول علامة على وجود مشكلة في الدم أو في نخاع العظام مشكلة في الدم يمكن أن تتسبب في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (التي تحمل الأكسجين إلى الجسم)، خلايا الدم البيضاء (التي تساعد في محاربة العدوى) والصفائح الدموية (التي تساعد في التئام). عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.
- أفكار أو سلوكيات انتحارية. عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

#### أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين عشرة:

- غثاس/الميل لنوم
- ارتجاج في اليدين أو أجزاء أخرى من الجسم
- دوام
- صداع
- نبض غير منتظم، قوي أو سريع
- دوام عند الوقوف بسبب انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم الانتصابي)
- جفاف في الفم
- إسهال
- غثيان
- زيادة التعرق
- زيادة في الوزن
- صعوبة أو بطء في النطق
- عدوانية
- احتقان الأنف

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- ارتباك
- اضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي (انخفاض الرغبة الجنسية، مشاكل الانتصاب)
- اضطرابات الإصغاء
- تغيرات في التنوع
- خدر أو الشعور بالخوخ في الزراعين أو الرجلين
- اضطرابات في التئام
- امتناع الحقيقتين

#### أضرار القلب

##### • إرقاق

• انخفاض مستويات الصوديوم في الدم

##### • عصبية

• اضطرابات في التبول

##### • الشعور بالعطش

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• إثار، قلق، صوبات في النوم، كوبايس

##### • اختلاجات

• رنين في الأذنين (طنين tinnitus)

##### • ارتفاع ضغط الدم

##### • إسهال، تقيؤ

- طفح في الجلد، شرى (urticaria) - انتفاخ في الوجه واللسان
- صوبات في التبول
- زيادة إفراز حليب الأم أو تدفق حليب الأم دون إرضاع
- ارتفاع الضغط داخل العين
- إبهيار
- نفاخ قصور القلب
- خلل في وظائف الكبد (مثل، ركود صفراوي)

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- قلة الشهية للطعام. ارتباك حاد (خاصة لدى متعالجين مسنين)، هوسات • اضطرابات في نظم القلب أو البتض • انتفاخ في الغدد اللعابية • تساقط الشعر • زيادة الحساسية لضوء الشمس • تضخم الكبد • سخونة • تناقص في الوزن • نتائج شاذة في فحوص وظائف الكبد

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- مرض عضلة القلب • الشعور بعدم راحة داخلي والحاجة المباشرة أن تكون في حركة دائمة • اضطراب في الأصابع المحيطة • ارتفاع شديد في الضغط داخل العين
- اضطرابات معينة في نظم القلب (من النوع المسمى "torsade de pointes")
- التهاب تخمسي للحويصلات الهوائية في الرئتين ونسج الرئة
- أعراض جانبية سمية شبيهة بها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديدها وتواترها بعد):
- قلة الشهية للطعام • ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم • دهان كبرياتي
- (paranoia) • اضطرابات الحركة (حركات لاإرادية أو تناقص في الحركة) • التهاب عضلة القلب التخمسي • التهاب الكبد • هبات من الحر • جفاف في العينين
- لوحظت زيادة خطر الإصابة بكمور في العظام لدى المتعالجين الذين تناولوا هذا النوع من الأدوية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاعم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التعليق عن أعراض جانبية:

من الممكن الإبلاغ وتبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن الأعراض الجانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين:

يجب التخزين بدرجة حرارة تحت الـ 25°C.

يُمنع تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

#### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً: Calcium hydrogen phosphate dihydrate, lactose monohydrate, maize starch, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol, talc, brilliant blue (E133).

#### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

قرص مطلي بلون أزرق سماوي، محذب من كلا الجانبين. على أحد جانبي القرص منقوش "D" والجانب الآخر أملس.

تحتوي كل عبوة على 28 قرصاً.

#### اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:

تيفغ إسرائيل لمض، شارع دفوراً هغنيا 124، تل أبيب 6944020. تم تحريرها في آب 2024.

لرقت تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 172.41.36523

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكور. مع هذا الدواء معد لكلا الجنسين.