



File Name	Aquimod-pil-ARB-D11-F.docx		
Product	Aquimod	Job No.	SO24000622
Language	Hebrew	Artwork	Patient Leaflet
Document History			
Ver.	Date	Change description	By
10-Sep-24	13:01	Last save	
<i>Our Expertise. Your Success.</i>			

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

أكويمود كريم 5%

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل كيس من 0.25 غرام على:

12.5 ملغ إميكيومود (imiquimod 12.5 mg)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

تختلف طريقة العلاج بأكويمود كريم 5% في الاستجابات الثلاثة التي من أجلها مخصص المستحضر. قد يصف لك الطبيب أكويمود كريم لعلاج:

- الثآليل على الأعضاء التناسلية وفي منطقة فتحة الشرج (الثآليل المؤنفة *condyloma acuminata*) لدى البالغين.
- التقران السفعي (*actinic keratosis*) لدى البالغين ذوي جهاز مناعة سليم.
- سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية (*superficial basal cell carcinoma*) لدى البالغين ذوي جهاز مناعة سليم، في الحالات التي لا يوصى فيها بإجراء جراحي.

المجموعة العلاجية: مستحضرات تعديل المناعة (معدلات الاستجابة المناعية).

يساعد أكويمود جهاز المناعة على إنتاج مواد طبيعية التي تساعد الجسم على محاربة الخلايا السرطانية، في التقران السفعي أو في الفيروس الذي يسبب الثآليل.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (إميكيومود) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- إذا تمت معالجتك فيما مضى بأكويمود كريم 5% أو بأدوية مشابهة، أخبر الطبيب بذلك قبل بدء العلاج بأكويمود كريم 5%.
- أخبر الطبيب إذا كان معروفاً لديك بوجود أي مشاكل في الجهاز المناعي.
- أخبر الطبيب إذا كان معروفاً لديك بوجود حالات تعداد الدم شاذة عن الطبيعي.
- أخبر الطبيب إذا كنت قد خضعت لعملية زرع أعضاء.
- يجب الامتناع عن استعمال أكويمود كريم 5% قبل أن يشفى الجلد من علاج دوائي سابق أو علاج جراحي.
- يجب تجنب ملامسة الكريم بالعينين، الشفتين والمنخرين. في حالة ملامسة الكريم بهذه المناطق، فینبغي شطف المنطقة بالماء.
- يُمنع استعمال الكريم بما يتجاوز الوقت، الكمية والتوتيرة الموصى بها.
- يُمنع تغطية المنطقة المعالجة بعصابات أو بضمادات أخرى، بعد دهن أكويمود كريم 5%.
- إذا شعرت بانزعاج لا يطاق في المنطقة المعالجة، اغسل المنطقة التي تم دهن أكويمود كريم 5% عليها بالصابون المعتدل والماء. بعد أن هدأت المنطقة، يمكن بدء العلاج باستعمال أكويمود كريم 5% مرة أخرى.
- بسبب آلية عمل أكويمود كريم 5%، فقد يكون هناك تفاقم في الحالات الالتهابية الموضعية في المنطقة المعالجة.
- أثناء العلاج بأكويمود كريم 5% وحتى الشفاء التام، فقد تبدو المنطقة المعالجة مختلفة جداً عن الجلد الطبيعي.

إذا كنت تعالج بأكويمود كريم 5% للثآليل في منطقة الأعضاء التناسلية وفي منطقة فتحة الشرج، فيجب الانتباه إلى هذه التحذيرات الإضافية:

- لدى الرجال الذين يعالجون الثآليل تحت القلفة، يجب التشمير عن القلفة وغسل المنطقة تحتها بشكل يومي. إذا لم يتم تنظيف هذه المنطقة يوميًا، فقد يصبح جلد القلفة مشدودًا، متورمًا ومتقشرًا. نتيجة لذلك، سيكون من الصعب التشمير عن القلفة. إذا ظهرت هذه الأعراض، فتوقف عن العلاج واتصل بالطبيب.
- يُمنع الاستعمال على الجروح المفتوحة. انتظر حتى تلتئم الجروح.
- في حالة الثآليل الداخلية، فَيمنع دهن الكريم على المناطق الداخلية مثل فتحة قناة الإحليل، المهبل، عنق الرحم أو فتحة الشرج.
- أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز المناعي بسبب مرض أو أدوية تتناولها، لأنه لا ينبغي استعمال أكويمود كريم 5% لأكثر من دورة علاج واحدة لهذه الحالات.
- أخبر الطبيب إذا كنت حاملًا لفيروس HIV، لأنه لم يثبت أن أكويمود كريم 5% ناجع لدى هؤلاء المتعالمين.
- إذا قررت القيام بعلاقة جنسية بينما لا تزال الثآليل موجودة، فيجب دهن الكريم بعد العلاقة الجنسية وليس قبلها.
- قد يضعف أكويمود كريم 5% من نجاعة الواقيات الذكرية والعازلات المهبلية، لذا ينبغي شطف المنطقة من الكريم قبل القيام بعلاقة جنسية.
- تذكر، أن أكويمود كريم 5% لا يحمي من إصابة أشخاص آخرين بعدوى فيروس HIV أو غيره من الأمراض المنقولة جنسيًا.

إذا كنت تُعالج بأكويمود كريم 5% لعلاج التقران السفعي أو سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية فيجب الانتباه إلى هذه التحذيرات الإضافية:

- يجب تجنب استعمال مصابيح التشمير أو أسرة التشمير وتجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أثناء العلاج بأكويمود كريم 5%. استعمل واقي من الشمس، ارتد ملابس واقية وقبعات واسعة الحواف أثناء الخروج خلال النهار.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بالعلاج بأكويمود كريم 5% لدى الأطفال والمراهقين.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ليس معروفًا عن وجود أدوية يكون استعمالها أثناء العلاج بأكويمود كريم 5% غير مرغوب فيه.

الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب إذا كنت حاملًا أو تخططين للحمل. سيقوم طبيبك بتقييم الفائدة مقابل الخطر المنوط باستعمال أكويمود كريم 5% أثناء الحمل. لم تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات تأثيرًا ضارًا مباشرًا أو غير مباشر في الحمل. يُمنع الإرضاع أثناء العلاج بأكويمود كريم 5%، لأنه من غير المعروف ما إذا كانت المادة الفعالة إميكويمود يُطرح في حليب الأم أم لا.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يؤثر الدواء في قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على:

- **ميثيل بارابين وپروپيل پارابين اللذان قد يسببان ردود فعل تحسسية (من الجائز حدوث ردود فعل متأخرة).**
- **كحول سيتيلي وكحول ستياريلي اللذان قد يسببان ردود فعل جلدية موضعية (مثل التهاب الجلد التماسي).**
- **كحول بنزيلي الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية وتهيج موضعي خفيف. يحتوي الدواء على كحول بنزيلي بتركيز 2% w/w.**

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

تعليمات عامة:

1. قبل النوم، اغسل اليدين والمنطقة المعالجة بالصابون المعتدل والماء. جفف المنطقة.
2. افتح كيسًا جديدًا، اضغط على الكيس وضع أكويمود كريم 5% على طرف الإصبع.
3. ادهن طبقة دقيقة من أكويمود كريم 5% على المنطقة المخصصة، عندما تكون نظيفة وجافة، وفق تعليمات الطبيب. ذلك الكريم بلطف إلى داخل الجلد حتى يختفي.
4. كل كيس مخصص للاستعمال لمرة واحدة. بعد الاستعمال، تخلص من الكيس المفتوح. اغسل يديك بالماء والصابون.
5. اترك أكويمود كريم 5% في المكان المعالج حسب توصية الطبيب. يُمنع الاستحمام طوال وجود الكريم على الجلد.
6. في نهاية العلاج اليومي، يجب غسل المنطقة التي دهنت عليها أكويمود كريم 5% بالصابون المعتدل والماء.

يُمنع البلع. الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

المقدار الدوائي المعتاد عادة هو:

في العلاج الخارجي الموضعي للتآليل في منطقة الأعضاء التناسلية وفي منطقة فتحة الشرج

1. قبل الخلود للنوم، يجب دهن الكريم على التآليل (عندما تكون نظيفة وجافة)، والتدليك بلطف إلى داخل الجلد حتى يختفي الكريم.
2. يجب دهن الكريم مرة واحدة في اليوم، 3 مرات في الأسبوع (على سبيل المثال الأحد، الثلاثاء والخميس). يمكن أن تتراوح مدة العلاج بين 4-12 أسبوعًا.
3. اترك أكويمود كريم 5% على التآليل لمدة 6-10 ساعات، يُمنع الاستحمام خلال هذا الوقت.
4. بعد 6-10 ساعات، اغسل المنطقة التي دهنت عليها أكويمود كريم 5% بالصابون المعتدل والماء.
5. يحتوي كيس واحد على كريم كافٍ لتغطية التآليل بمساحة 20 سم مربع.
6. يجب الاستمرار في العلاج بأكويمود كريم 5% حسب تعليمات الطبيب، حتى تختفي التآليل (نصف النساء اللواتي تعافين بالعلاج بأكويمود كريم 5% سيتعافين في غضون 8 أسابيع، ونصف الرجال الذين يتعافون سيتعافون في غضون 12 أسبوعًا، ولكن هناك متعافين تتحسن صحتهم في غضون 4 أسابيع فقط).
7. يُمنع استعمال أكويمود كريم 5% لمدة تزيد عن 16 أسبوعًا لأي نقشي للتآليل.

لدى الرجال الذين يعالجون التآليل تحت القلفة، يجب التشمير عن القلفة وغسل المنطقة تحتها يوميًا (انظر الفصل 2 بند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء").

في علاج سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية

1. قبل الخلود للنوم، يجب دهن الكريم على المنطقة التي تحتاج إلى علاج وحوالي سنتيمتر واحد حولها (عندما تكون نظيفة وجافة)، والتدليك بلطف إلى داخل الجلد حتى يختفي الكريم.
2. يجب دهن الكريم مرة واحدة يوميًا، 5 مرات في الأسبوع (على سبيل المثال الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس) لمدة 6 أسابيع.
3. اترك أكويمود كريم 5% على الجلد لمدة 8 ساعات، يُمنع الاستحمام خلال هذا الوقت.
4. بعد 8 ساعات، اغسل المنطقة التي وضعت عليها أكويمود كريم 5% بالصابون المعتدل والماء.

في علاج الثقران السفعي

1. قبل الخلود للنوم، يجب دهن الكريم مرة واحدة يوميًا، 3 مرات في الأسبوع (على سبيل المثال الأحد، الثلاثاء والخميس)، على المنطقة التي تحتاج إلى علاج (عندما تكون نظيفة وجافة)، والتدليك بلطف إلى داخل الجلد حتى يختفي الكريم.
2. اترك أوكيومود كريم 5% على الجلد لمدة 8 ساعات، يُمنع الاستحمام خلال هذا الوقت.
3. بعد 8 ساعات، اغسل المنطقة التي وضعت عليها أوكيومود كريم 5% بالصابون المعتدل والماء.
4. يحتوي الكيس الواحد على كريم كاف لتغطية ثؤلول مساحته 25 سم مربع.
5. يجب استعمال العلاج لمدة 4 أسابيع.
6. بعد 4 أسابيع من نهاية العلاج الأول، سيقوم الطبيب بتقييم حالة جلدك. إذا لم تختف الآفات الجلدية، فقد تكون هناك حاجة إلى فترة علاج إضافية مدتها 4 أسابيع.

يُمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا قمت بدهن مقدارًا دوائيًا أعلى عن طريق الخطأ، فاغسل المنطقة بالصابون المعتدل والماء. بعد أن يهدأ الجلد، يمكن دهن الكريم مرة أخرى. إذا ابتلعت عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفلاً عن طريق الخطأ من الدواء، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت دهن الدواء في الوقت المحدد، فقم بدهن المقدار الدوائي التالي بمجرد أن تتذكر. لا تدهن الكريم أكثر من مرة في اليوم.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أوكيومود كريم 5% أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

- في أوقات متباعدة تم الإبلاغ عن ردود فعل جلدية خطيرة. إذا لاحظت آفات أو بقع على الجلد، والتي تبدأ كنقاط حمراء صغيرة وتنتشر ببطء. في بعض الأحيان يكون ذلك مصحوبًا بحكة، سخونة، شعور عام بالإعياء، مفاصل مؤلمة، مشاكل في الرؤية، حرق، ألم أو حكة في العينين وتقرحات في الفم، توقف عن استعمال أوكيومود كريم 5% وتوجه إلى الطبيب على الفور.
- إذا كنت تختبر رد فعل جلدي غير جيد أثناء استعمال أوكيومود كريم 5%، توقف عن دهن الكريم، اغسل المنطقة بالصابون المعتدل والماء واتصل بالطبيب أو الصيدلي.
- لدى بعض المتعالجين، هناك انخفاض في تعداد الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة الحساسية لحالات العدوى، إلى الميل لحدوث كدمات والشعور بالإرهاق. إذا كنت تختبر أحد هذه الأعراض، فتوجه الطبيب.
- أخبر الطبيب أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا كنت لا تشعر بصحة جيدة أثناء العلاج بأوكيومود كريم 5%.
- قد يختبر بعض المرضى الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية (حالة يهاجم فيها جهاز المناعة عضوًا، مادة أو جهازًا في الجسم) تفاعلاً في حالتهم. أخبر الطبيب إذا لاحظت أي تغيير في حالتك أثناء العلاج بأوكيومود كريم 5%.
- لقد اختبر عدد قليل من المتعالجين تساقط الشعر في منطقة العلاج أو حولها.
- ترتبط العديد من الأعراض الجانبية باستعمال أوكيومود كريم 5% بفعالية المستحضر الموضعية في المنطقة المصابة، وتشير إلى أنه يعمل على النحو المخطط له.
- أثناء استعمال الدواء، قد يتغير لون الجلد في منطقة العلاج. في حين أن هناك ميلاً للتحسن بمرور الوقت، فقد يكون التغيير ثابتًا لدى بعض المرضى.

إذا كنت تتعالج بأوكيومود كريم 5% للتآليل في منطقة الأعضاء التناسلية ومنطقة فتحة الشرج:

معظم الأعراض الجانبية لأوكيومود كريم 5% هي نتيجة لعمله الموضعي في الجلد.

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- احمرار، تقشير الجلد، جلد حرشفي، انتفاخ، سماكة الجلد، تقرحات في الجلد، اندمال وقعاات تحت الجلد.
- حكة، إحساس بحرق، ألم موضعي في المناطق التي يتم فيها دهن الكريم.
- معظم هذه الأعراض ليست خطيرة وسوف تنقضي بعد حوالي أسبوعين من نهاية العلاج.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- حالات صداع.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000:

- سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، آلام العضلات والمفاصل.
- هبوط الرحم، ألم أثناء القيام بعلاقة جنسية عند النساء، صعوبات في الانتصاب لدى الرجال.
- زيادة العرق، حالات غثيان وتقيؤ.
- أعراض في الجهاز الهضمي.
- رنين في الأذنين.
- تورّد الوجه، إرهاب، دوخة، حالات شقيقة، إحساس بالوخز، أرق، اكتئاب، فقدان الشهية.
- انتفاخ الغدد، حالات عدوى جرثومية، فيروسية أو فطرية، حالات عدوى مهبلية بما في ذلك الفطريات المهبلية.
- سعال وزكام يرافقه ألم الحلق.

أعراض جانبية نادرة جدًا (very rare) - أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- ردود فعل جلدية شديدة ومؤلمة، خاصة في حالات المقدار الدوائي المفرط.
- ردود فعل جلد مؤلمة عند فتحة المهبل، لدرجة أنه يجعل من الصعب التبول، في هذه الحالات يجب طلب المساعدة الطبية على الفور.

إذا كنت تتعالج بأكويمود كريم 5% لسرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية:

معظم الأعراض الجانبية لأكويمود كريم 5% هي نتيجة لعمله الموضعي في الجلد. يمكن أن تكون ردود الفعل الجلدية الموضعية علامة على أن الدواء له تأثير على النحو المخطط له.

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- حكة في المنطقة المعالجة.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- إحساس بوخز، مناطق صغيرة منتفخة في الجلد، ألم موضعي، حرق، تهيج، نزيف، احمرار أو طفح جلدي.
- إذا ظهر قيح أو علامات عدوى أخرى، فتوجه إلى الطبيب.
- في حال كنت تشعر بانزعاج شديد في الجلد أثناء العلاج، فيجب استشارة الطبيب. باستطاعة الطبيب أن يوصي بالتوقف عن استعمال أكويمود كريم 5% لبضعة أيام (راحة قصيرة من العلاج).
- انتفاخ الغدد، آلام الظهر.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000:

- تغييرات في المنطقة المعالجة على سبيل المثال تقشير الجلد، التهاب، انتفاخ، اندمال في الجلد، تشققات في الجلد، حويصلات، التهاب الجلد.
- شعور بالعصبية، حالات غثيان وتقيؤ، جفاف الفم، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تعب.

إذا كنت تتعالج بأكويمود كريم 5% للنتران السفلي:

معظم الأعراض الجانبية لأكويمود كريم 5% هي نتيجة لعمله الموضعي في الجلد. يمكن أن تكون ردود الفعل الجلدية الموضعية علامة على أن الدواء له تأثير على النحو المخطط له.

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- حكة في المنطقة المعالجة.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- ألم موضعي، حرق، تهيج، احمرار.
- إذا ظهر قيح أو علامات عدوى أخرى، فيجب التوجه إلى الطبيب.
- في حال كنت تشعر بانزعاج شديد في الجلد أثناء العلاج، فيجب استشارة الطبيب. باستطاعة الطبيب أن يوصيك بالتوقف عن استعمال أكويمود كريم 5% لبضعة أيام (راحة قصيرة من العلاج).
- حالات صداع.
- فقدان الشهية (قَهْم)، غثيان.
- آلام العضلات، آلام المفاصل وإرهاق.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000:

- تغييرات في المنطقة المعالجة على سبيل المثال نزيف، التهاب، تقشير الجلد، حساسية الجلد، انتفاخ، مناطق صغيرة منتفخة في الجلد، إحساس بالوخز، تشكل جلبة على الجلد، تندب، تقرحات، شعور بالدفع في المنطقة أو انزعاج.
- التهاب في القسم الداخلي من الأنف، احتقان الأنف، إنفلونزا أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا، ألم في الحلق، آلام في الأطراف، سخونة، ضعف أو رجفان.
- اكتئاب.
- تهيج في العينين، تورم الجفون.
- إسهال.
- احمرار.
- انتفاخ في الوجه، تقرحات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يُمنع التخزين في درجة حرارة أعلى من 25°C. يجب الحماية من التجميد.
- يجب استعمال الكيس فور فتحه. يجب التخلص من الكيس مع بقايا الكريم التي في داخله بعد الاستعمال. يُمنع حفظ كيس مفتوح لاستعماله لاحقاً.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Isostearic acid, polysorbate 60 (Tween 60), stearyl alcohol, white petrolatum, cetyl alcohol, benzyl alcohol, glycerin, xanthan gum (Xantural 75), sorbitan monostearate, methylparaben (methyl parahydroxybenzoate), propylparaben (propyl parahydroxybenzoate) and purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

كريم أملس بلون أبيض-مصفر. الكريم معبأ في عبوة تحتوي على 12 أو 24 كيسًا بوزن 0.25 غرام، أو في أنبوبة تحتوي على 3 غرامات. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

المنتج وصاحب التسجيل: تارو للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هكتور 14، خليج حيفا 2624761

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 144.90.33114.00

تم تحريرها في حزيران 2024.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

ALDPIL 052023 P.5