

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו במאי 2019

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ו-1986  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## אמנדין 100 טבליות מצופות פילם

### AMANDIN 100 Film Coated Tablets

חומר פעיל:

Amantadine – hemisulphate 100mg  
אמנטידין המיסולפט 100 מ"ג

לרשימת הרכיבים המלאה ראה: סעיף 6 "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בתסמיני מחלת הפרקינסון כגון: נוקשות שרירים, רעידות, הפחתה בתנועות או חוסר תנועתיות

קבוצה תרפויטית: נוגדת פרקינסון

#### 2. לפני השימוש בתרופה.

##### אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אמנטידין ותרכובותיו, לקטוז, Orange-yellow S (E 110) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, (אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף")
- הינך סובל מאי ספיקת לב חמורה (שאינה מפוצה)
- הינך סובל מבעיות בשריר הלב, כגון *cardiomyopathy myocarditis*
- הינך סובל מבעיות בהולכה העצבית של שריר הלב (חסימה בהולכה בין העליות לחדרי הלב בדרגת חומרה 2 ו-3)
- הינך סובל מקצב לב נמוך (מתחת ל- 55 פעימות לדקה)
- הינך סובל ממאפיינים לא רגילים בבדיקת א.ק.ג (הארכת מקטע QT, גלי U הניתנים לזיהוי)
- יש לך קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם מחלת לב מולדת (תסמונת QT)
- סבלת בעבר מבעיות חמורות בקצב הלב (הפרעות קצב חדריות כולל הפרעה בשם *torsade de pointes*)
- הינך סובל מרמות נמוכות של אשלגן או מגנזיום בדם
- הינך נוטל תרופה בשם בודיפין (*Budipine*) או תרופות אחרות העלולות להאריך את מקטע QT (ראה סעיף 'תגובות בין תרופתיות')

##### אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה

לפני ובמהלך הטיפול בטבליות אמנדין 100, ספר לרופא אם:

- הינך סובל מהגדלה של בלוטת הפרוסטטה
  - הינך סובל מלחץ תוך עיני מוגבר כגון גלאוקומה צרת זווית.
  - הינך סובל מאי ספיקת כליות (ברמות חומרה שונות, אנא ראה פירוט בסעיף 3 'כיצד תשתמש בתרופה')
  - הינך סובל ממצבים של אי שקט (אגיטציה) ובלבול
  - הינך סובל מסינדרומים של הזיות (Delirious syndromes) או מפסיכוזה (הפרעות נפשיות חמורות)
- הינך מטופל בתרופות המכילות את החומר הפעיל ממנטיין (*memantine*), יש לשים משנה זהירות במטופלים אלו (ראה סעיף 'תגובות בין תרופתיות')

## מידע נוסף חשוב

אצל חולים עם קוצבי לב אשר לא ניתן לקבוע אצלם את מקטע QT באופן מדויק, הרופא (קרדיולוג) המטפל יפעיל שיקול דעת האם ניתן לטפל בטבליות אמנדין 100.

אצל מטופלים הסובלים מתפקודי כליה לקויים, תיתכן עליה ברמת החומר הפעיל בגוף בעקבות פינוי לקוי מהכליות. דבר זה עלול לגרום לסימפטומים זהים לאלו הנגרמים במצב של מינון יתר. לכן, הרופא המטפל יצטרך לעקוב ולבדוק את המינון, ואת קצב הפינוי הגלומרולרי (glomerular filtration rate) במהלך הטיפול בטבליות אמנדין 100. (ראה סעיף 3 כיצד תשתמש בתרופה?)

אצל מטופלים הסובלים ממחלת מוח אורגנית או מעוויתות ונוטלים טבליות אמנדין 100, צריך לנקוט ביתר זהירות כיוון שעלולה לחול התדרדרות במצבם.

אם אתה חווה דפיקות לב חזקות, סחרחורות או איבוד הכרה קצר, הפסק מיידית את השימוש בטבליות אמנדין 100 והתייעץ עם הרופא כדי שזה יבדוק את קצב הלב שלך. במידה ואין הפרעות קצב, תתכן חזרה לטיפול בטבליות אמנדין 100 (בהתאם להתוויות הנגד ולאינטראקציות הבין תרופתיות, (ראה סעיף 4, 'תופעות לוואי').

אל תפסיק בפתאומיות את השימוש בטבליות אמנדין 100, מאחר ובחולי פרקינסון זה עלול לגרום להתדרדרות ביכולת התנועה, ובמקרה הגרוע, לאיבוד יכולת התנועה.

מטופלים אשר נוטלים טבליות אמנדין 100 ביחד עם תרופות נויורולפטיות לטיפול בהפרעות נפשיות, עלולים לפתח מצב מסכן חיים (malignant neuroleptic syndrome) אם הטיפול בטבליות אמנדין 100 מופסק בפתאומיות. מצב זה מאופיין בעלייה פתאומית של חום הגוף, קישיון שרירים והפרעות במערכת העצבים האוטונומית.

סימפטומים כמו לחץ דם נמוך, ריור, הזעה, עליה בחום הגוף, תחושת חום, אצירת נוזלים ודיכאון נצפים לעתים קרובות בחולי פרקינסון. יש לטפל בהם תוך התחשבות בתופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופתיות אפשריות עם טבליות אמנדין 100 (ראה סעיף 'תופעות לוואי').

התייעץ עם הרופא, במקרה שיש לך בעיות במתן שתן.

הודע לרופא שלך, אם אתה, בני משפחתך או מטפלים שלך, מבחינים שאתה מפתח דחפים או יצר להתנהג בצורה שאינה רגילה עבורך, או שאינך יכול להתנגד לדחף, ליצר או לפיתוי לעשות פעולות מסוימות שעלולות לפגוע בך או באחרים. תופעות אלה נקראות הפרעות שליטה בדחף (Impulse Control Disorders) ועלולות לכלול תופעות כגון התמכרות להימורים, אכילת יתר, בזבז כסף, יצר מיני חזק באופן בלתי רגיל או עלייה בתדירות מחשבות ורגשות מיניים. במקרה זה ייתכן שהרופא שלך יתאים לך מינון אחר של התרופה או יפסיק את השימוש בה לגמרי.

במידה ויש לך הפרעות בראייה (כגון ראייה מטושטשת), עליך לפנות לרופא עיניים באופן מידי.

## ילדים

אין מספיק מידע לגבי שימוש בטבליות אמנדין 100 בילדים.

## קשישים

יש לנקוט משנה זהירות בעת נטילת התרופה, במיוחד בקרב הסובלים מאי שקט, בלבול או מסינדרומים של הזיות (delirious syndromes).

## בדיקות ומעקב

הרופא שלך יבצע לך בדיקת א.ק.ג (50 mm/s):

- לפני הטיפול, ובשבוע הראשון והשלישי מתחילתו
- לפני העלאת מינון ושבועיים לאחר מכן
- באופן שגרתי, לפחות פעם בשנה.

מטופלים אשר יש להם נטייה לסבול מהתקפים (עוויתות ופרקוסים) או סבלו בעבר מהתקפים, כמו כן מטופלים עם הפרעות לב וכלי דם, חייבים לעבור בדיקות תקופתיות אצל הרופא במהלך הטיפול בטבליות אמנדין 100.

## אינטראקציות / תגובות בין תרופתיות:

**אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- אין ליטול את **אמנדין 100** יחד עם תרופות אחרות אשר ידוע כי הן מאריכות את מקטע **QT** כגון:
  - תרופות לטיפול בהפרעות קצב לבביות, תרופות מסוג class IA: קווינידין, דיסופיראמיד, פרוקאינאמיד. **ותרופות מסוג Class III:** אמודארון וסטאלול
  - תרופות אנטי פסיכיות לטיפול בהזיות (תרופות אנטיפסיכיות) כגון: תיאורידזין, כלורפרומזין, הלופרידול ופימוזיד
  - תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון, נוגדי דיכאון טריציקליים או טטרציקליים כגון: אמטירפטילין
  - תרופות מסוימות לטיפול בקדחת השחת, תרופות אנטיהיסטימיניות כגון: אסטמיזול, טרפנאדין
  - תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים ופטרייתיים, אנטיביוטיקות ממשפחת המקרולידים כגון: אריתרומיצין וקלריתרומיצין
  - תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים, מעכבי האנזים גיראז, כגון ספארפלוקסצין
  - תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים פטרייתיים כגון תרופות ממשפחת האזולים (azole antimycotics)
  - תרופות נוספות כגון: בודיפין, הלופנטרין, קוטרימוקסזול, פנטמידין, סיספריד או בפרידיל.

רשימה זו אינה מכילה את כל האינטראקציות האפשריות. לפני השימוש ב**אמנדין 100** במקביל לשימוש עם תרופה נוספת הרופא שלך יודא כי אין אינטראקציות נוספות על רקע הארכת מקטע **QT**.

- ניתן ליטול טבליות **אמנדין 100** ביחד עם תרופות נוספות לטיפול בפרקינסון (אין מחקרים ספציפיים על האינטראקציות ביניהן) כגון: לבדופה, ברומוקריפטין, טריהקסיפנידיל או תרופות לטיפול באלצהיימר כגון ממנטין. כדי להמנע מתופעות לוואי (כגון תגובות נפשיות) יתכן ויהיה צריך להתאים את המינון של התרופות. (ראה סעיף 4, 'תופעות לוואי')
  - טיפול בתרופות הבאות ביחד עם טבליות **אמנדין 100** עלול לגרום לאינטראקציות הבאות:
    - תרופות אנטיכולינרגיות: התגברות תופעות הלוואי של תרופות אנטיכולינרגיות (כגון בלבול או הזיות) בשימוש עם תרופות נוספות כגון: טריהקסיפנידיל, בנזטרופין, סקופולאמין, ביפרידן, אורפנדרין ועוד.
    - תרופות המזרזות את מערכת העצבים הסימפטטית באופן עקיף, יגרמו להעצמה של האפקט של **אמנדין 100** על מערכת העצבים המרכזית.
    - לבדופה (תרופה לטיפול בפרקינסון)-התרופות מגבירות את האפקט הטיפולי המשותף.
    - ממנטין (תרופה לטיפול באלצהיימר), - יכולה להגביר את האפקט הטיפולי ואת תופעות הלוואי של טבליות **אמנדין 100**.
    - טיפול במקביל עם תרופות משתנות כגון הידרוכלורתיאזיד או טרימטרן (triamterene) עלולות להקטין את הפרשת החומר הפעיל אמנטידן ולגרום לרמה רעילה בדם הגורמת להפרעה תנועתית, פרכוסים ובלבול. לכן, יש להימנע משימוש בתרופות מסוג זה ביחד עם טבליות **אמנדין 100**.
- לתשומת לבך, מידע זה עלול להיות רלוונטי גם לתרופות בהן השתמשת לאחרונה.

## נטילת התרופה ומזון

אין מידע

## שימוש בתרופה וצריכת אלקהול

אין לצרוך אלקהול בזמן הטיפול בטבליות **אמנדין 100**, כיוון שזו מורידה את הסבילות לאלכוהול.

## הריון והנקה

הריון

אין מספיק מידע לגבי השימוש באמנדין 100 בהריון. דווחו מקרים על ילדים בריאים לאמהות שנטלו את התרופה אך דווחו גם מקרים על סיבוכים בלידה ומומים. במחקרים על בעלי חיים החומר הפעיל באמנדין 100, אמנטידן, גרם נזק לצאצאי החיות. פוטנציאל הסיכון לבני אדם לא ידוע.

השימוש בתרופה זו במהלך ההריון יתאפשר רק לאחר שהרופא קבע כי זה חיוני.

אם את נוטלת תרופה זו במהלך שלושת החודשים הראשונים להריון הרופא שלך ימליץ על בדיקת אולטרסאונד. אם הינך מתכננת הריון או חושדת שהינך בהריון, הודיעי לרופא מיד על מנת שיקבע האם להמשיך בטיפול, להפסיקו או להחליפו בתרופה אחרת.

## הנקה

החומר הפעיל, אמנטידן המיסולפט, עובר בחלב האם. אם הרופא החליט כי הטיפול בתרופה נחוץ במהלך ההנקה, צריך לבצע בדיקות מעקב לתינוק בגלל הסיכון לתופעות לוואי כגון פריחה בעור, אי מתן שתן, הקאות. יתכן והרופא יורה שתפסיקי להניק.

## נהיגה והפעלת מכונות

לא ניתן לשלול השפעה על הריכוז, הערנות ויכולת העין להתמקד ביחס למרחקים, זאת בנוסף למאפיינים נוספים בטיפול בסינדרום פרקינסון. בתחילת הטיפול (בנוסף למוגבלויות המאפיינות את המחלה), ייתכן כי תהיה ירידה ביכולת לנהוג ולהפעיל מכונות. ייתכן כי לא תוכל להגיב במהירות וביעילות מספקת לאירועים לא צפויים או פתאומיים. על כן אין לנהוג במכונית או כל כלי רכב אחר או להפעיל מכונות ללא התייעצות מוקדמת עם הרופא.

יש לשים לב כי אלקהול מוריד עוד יותר את היכולת לנהוג.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכיל **Orange-Yellow S (E-110)** העלול לגרום לתגובות אלרגיות. תרופה זו מכילה לקטוז. אם הרופא שלך אמר לך שהינך סובל מחוסר סבילות לסוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל טבליות אמנדין 100.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

### אין להחליף בין טבליות של אמנטידין המיסולפט לבין טבליות של אמנטידין הידרוכלוריד.

אופן המתן: יש לקחת טבליות אמנדין 100 עם מעט נוזלים, עדיף בשעות הבוקר ואחר הצהריים. אין לקחת את המנה האחרונה לאותו יום אחרי שעה ארבע אחר הצהריים. תקופת הטיפול תיקבע על ידי הרופא המטפל ונקבעת על פי מצב מחלתך וכיצד אתה מגיב לטיפול. אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא. ניתן לחצות את הטבליה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל: במהלך 4-7 ימים ראשונים לטיפול: טבליה אחת ביום של 100, ולאחר מכן עליה במינון ב-100 (טבליה אחת) פעם בשבוע עד למינון אחזקתי. בדרך כלל המינון האפקטיבי נע בין 1-3 טבליות פעמיים ביום (מינון שנע בין 200-600 מ"ג אמנטידין המיסולפט ליום).

מבוגרים: במיוחד כאלו הסובלים מאי שקט, בלבול או הזיות, יש להתחיל את הטיפול ממינון נמוך יותר.

אם נוטלים את אמנדין 100 טבליות ביחד עם תרופות נוספות לטיפול בפרקינסון, הרופא יתאים עבורך את המינון בהתאם.

אם טופלת בעבר בפק-מרץ אינפוזיה, ייתכן והרופא יתחיל את הטיפול בטבליות אמנדין 100 במינון גבוה יותר.

### מטופלים עם אי ספיקת כליות:

הרופא יתאים את מינון אמנדין 100 טבליות בהתאם לערכי ה-GFR שלך. (GFR הינו ערך המודד את קצב סינון נוזלי הדם בגופך דרך הכליות)

### אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות ילד בלע מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם הינך חש בסימפטומים של הרעלה חמורה כגון: בחילה, הקאות, עירור יתר, רעידות, חוסר שיווי משקל ובחוסר שליטה על תנועות במרחב (ATAXIA), ראייה מטושטשת, ישנוניות, דיכאון, בעיות בדיבור, התקפים יש לפנות לרופא או למיון.

דווח מקרה אחד של בעית קצב לב הנקראת malignant cardiac arrhythmia. נצפו מצבים של בלבול עם הזיות עד למצב של קומה, ועוויתות בשרירים בקרב מטופלים שנוטלים אמנדין 100 ותרופות נוספות לטיפול בפרקינסון.

לטבליות אמנדין 100 אין תרופת נגד (אנטידוט) ולכן במקרה של הרעלה, ייתכן כי יבצעו בחדר המיון שטיפת קיבה או יעודדו הקאה. סינון הדם (המודיאליזה) אינו מומלץ במקרה כזה.

מקרים של הרעלה מסכנת חיים דורשים אמצעים אינטנסיביים למעקב רפואי. ייתכן כי הפעולות הבאות ינקטו: אספקת נוזלים, החמצת השתן לצורך פינוי מהיר יותר של התרופה מהגוף, מתן תרופות הרגעה, תרופות לטיפול בעוויתות ופרכוסים, תרופות לבעיות בקצב הלב (לידוקאין במתן תוך ורידי), פיזוסטיגמין במתן תוך ורידי לטיפול בסימפטומים של רעילות עצבית.

במקרה הצורך, הרופא יבצע לך בדיקות א.ק.ג. ויבצע מעקב אחר מצבים שיכולים לעודד בעיות בקצב הלב, כגון חוסר איזון במלחים בדם (אשלגן או מגנזיום) או קצב לב איטי.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ לך ע"י הרופא.

אם אינך מגלה סבילות לתרופה וגם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה או לשנות את המינון ללא התייעצות עם הרופא כיוון שזה עלול לגרום להתדרדרות במצבך ולתסמיני גמילה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

#### 4. תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש בטבליות אמנדין 100 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא במידה ואתה חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

#### תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה)

- הפרעות שינה
- אי שקט מוטורי או מנטלי
- אצירת שתן בחולים הסובלים מהגדלת בלוטת הערמונית
- הזיות ואשליות פרנואידיות (הפרעות בתפיסה ובהתנהגות), במיוחד במטופלים מבוגרים עם נטייה להזיות.

נדירות תופעת לוואי אלו עלולה לגדול במטופלים הנוטלים בנוסף לטבליות אמנדין 100 גם תרופות נוספות לטיפול בפרקינסון (כגון לבודופה, ברומוכריפטין) או לטיפול באלצהיימר (ממנטין).

#### תופעות לוואי שכיחות נוספות (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה)

- תגובת עור אופיינית לאמנדין 100 הנקראת ציור רישתי עורקי (*LIVEDO RETICULARIS*), לעיתים מלווה בבצקת בחלק התחתון של הרגליים ובקרוסוליים.
- בחילה
- סחרחורת
- יובש בפה
- שינויים בוויסות זרימת הדם בזמן עמידה או קימה.

#### תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- ראייה מטושטשת

#### תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000)

- איבוד זמני של חדות הראייה וראיה מטושטשת בעקבות בצקת בקרנית – במקרה שכזה הטיפול באמנדין 100 צריך להפסק ועליך לפנות לרופא עיניים מיד עם הופעת סימפטומים.
- פגיעה בקרנית.
- נפיחות בקרנית (בצקת בקרנית).
- ירידה בחדות הראייה.

#### תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בכחות ממשתמש אחד מתוך 10,000)

- שינויים בדם (המטולוגים) כגון לויקופניה (מספר נמוך מאוד של תאי דם לבנים), וטרומבוציטופניה (ירידה במספר טסיות הדם).
- הפרעות בקצב הלב כגון טכיקרדיה חדרית, פרפור חדרים, *torsade de pointes* והארכת מקטע QT. ברוב מקרים אלה היו ברקע אחד מגורמים אלו: ממינון יתר, מתן משולב עם תרופות אחרות או גורמי סיכון להפרעות בקצב הלב (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה").
- עלייה ברגישות לאור, הפרעות קצב לבביות עם עלייה בקצב הלב.
- התקפים אפילפטיים (לרוב אצל מטופלים אשר נטלו מינון גבוה יותר מזה המומלץ ע"י הרופא).
- עוויתות בשרירים והפרעה בתחושת הגפיים.
- נסיונות התאבדות דווחו בחולים שטופלו בטבליות אמנדין 100 להתוויות אחרות.
- תגובה אלרגית כתוצאה מהמרכיב Orange-yellow S (E 110) הבלתי פעיל שבתרופה.

### תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה

- רצון להתנהג באופן בלתי רגיל – דחף חזק להתנהגות מוגזמת, דחף מיני שונה או מוגבר, עריכת קניות ובזבזז כספים באופן מוגזם וללא יכולת לשלוט בדחף לכך, אכילת כמויות גדולות של אוכל במעט זמן או אכילה באופן כפיתי (אכילה יתר על המידה גם לאחר תחושת שובע).

**אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### **דיווח על תופעות לוואי:**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il/>

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

### **מידע נוסף**

- נוסף על החומר הפעיל Amantadine - hemisulphate, התרופה מכילה גם:
  - Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone (K 28/32), croscarmellose sodium, maize starch, talc, magnesium stearate (Ph. Eur.), polyacrylate dispersion 30%, titanium dioxide (E 171), orange yellow (E 110), macrogol 6000, hypromellose.
  - כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
טבליות מצופות עגולות וקמורות משני הצדדים, כתומות, עם קו חצייה בצד אחד
  - ארוז בבליסטר אלומיניום באריזות המכילות 20, 30, 60, 100 טבליות.
  - בעל הרישום וכתובתו: מגאפארם בע"מ, התדהר 15, רעננה, ישראל.
  - שם היצרן וכתובתו: Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 23 40764 Langenfeld, Germany
  - עלון זה נערך בספטמבר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  - מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 162-30-35338
  - לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני שני המינים.