

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## קורסודיל דנטל ג'ל 1%

חומר פעיל וריכוזו: כלורהקסידין דיגלוקונאט 1% w/w.  
Chlorhexidine Digluconate 1% w/w

רשימת החומרים הבלתי פעילים מפורטת בסעיף 6 ובסעיף 2 תחת סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

### 1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלאק.
- כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'נג'יביטיס).
- כעזר בשמירה על היגיינת הפה.
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים.
- לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרת בפה.
- כעזר למניעה של עששת לנמצאים בסיכון גבוה, בתוספת לפלואוריד.

החומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונאט הוא חומר אנטיביוטיקטריאלי המפחית את היווצרות הפלאק

### 2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אתה רגיש (אלרגי) לכלורהקסידין דיגלוקונאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).</li> </ul> |
|---|

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12 שנים אלא בהמלצת רופא שיניים.
- אין להשתמש בתרופה בכל מקום אחר למעט הפה שלך. שטוף ביסודיות אם התכשיר בא במגע העיניים או האוזניים שלך.
- אין להשתמש בתרופה מיד לאחר צחצוח השיניים שלך. משחת השיניים יכולה לפגוע בפעילות התכשיר. לאחר צחצוח השיניים יש לשטוף את הפה ביסודיות במים ולהמתין 5 דקות בטרם השימוש בקורסודיל דנטל ג'ל. לחילופין ניתן להשתמש בקורסודיל דנטל ג'ל בזמן אחר במהלך היום.
- הפסק את השימוש בקורסודיל ג'ל ופנה לסיוע רפואי דחוף באם הנך חווה תגובה אלרגית קשה. ראה מידע נוסף בסעיף תופעות לוואי.
- תיתכן הכתמה זמנית של השיניים והלשון. ראה מידע נוסף בסעיף תופעות לוואי.
- הנך עלול להבחין בשינוי בתחושת הטעם, בתחושת צריבה, בעקצוץ או בנימול הפה. ראה מידע נוסף בסעיף תופעות לוואי.
- אין להלבין בדים שהיו במגע עם הג'ל.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון הנקה ופוריות:

אין עדות לפגיעה בעובר בשימוש עם קורסודיל ג'ל הנך יכולה להשתמש בקורסודיל אם את בהריון או מניקה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
קורסודיל דנטל ג'ל מכיל את הרכיב Macrogolglycerol hydroxystearate, הרכיב עלול לגרום לגירוי בעור.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. **המינון המקובל הוא:**

- **דלקת חניכיים:** צחצח את שינייך למשך דקה אחת לפחות, פעם או פעמיים ביום תוך שימוש ב-2 ס"מ של ג'ל. המשך בטיפול למשך כחודש אחד.
- **כיבים בפה ופטרת בפה:** מרח ג'ל ישירות על האזורים הכואבים באמצעות קצה האצבע שלך או מקלון צמר גפן פעם או פעמיים ביום למשך דקה אחת לפחות. המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר הריפוי.
- **דלקות פה בעקבות שיניים תותבות:** לפני הכנסת התותבות, מרח בעדינות קורסודיל דנטל ג'ל על התותבות באיזורי המגע עם החניכיים; נקה והשרה את התותבות בקורסודיל לשטיפת פה למשך 15 דקות פעמיים ביום, או לפי הוראות רופא השיניים שלך.
- **כעזר למניעה של עששת או לאחר ניתוחים דנטליים:** השתמש לפי הוראות רופא השיניים שלך.

אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא שלך.

### אין לעבור על המנה המומלצת

אין לבלוע, לשימוש מקומי בחלל הפה

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקורסודיל דנטל ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחד מהן.

- **הפסק להשתמש בקורסודיל דנטל ג'ל ופנה מיד לעזרה רפואית** אם מופיעה אצלך פריחה, נפיחות של השפתיים, הלשון, הגרון או הפנים או אם יש לך קשיי נשימה. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד.
- **הפסק להשתמש בג'ל ופנה לרופא השיניים שלך** אם מופיע אצלך גירוי, כאב או נפיחות בפה.

**תופעות לוואי אחרות** שיכולות להתרחש:

- תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה) **הכתמה זמנית של הלשון.** ההכתמה נעלמת עם הפסקת הטיפול.
- **הכתמה זמנית של השיניים.** הכתמה זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול להימנע מהכתמה באמצעות המנעות משתיית תה, קפה או יין אדום – במיוחד שעה לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה 'כיצד תשתמש בתרופה?'). אם ההכתמה נותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השינית. אתה יכול לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות.
- יתכן שתבחן בשינוי בחוש הטעם, בתחושת צריבה, בעקצוץ או בנימול הפה כאשר אתה משתמש בג'ל לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

"ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות או ע"י כניסה לקישור: [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

#### **5. איך לאחסן את התרופה**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- לאחר פתיחה ראשונה יש להשתמש בתוך 6 חודשים.

#### **6. מידע נוסף**

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכירה גם –  
Purified water, Isopropyl Alcohol, Hydroxypropylcellulose, Macroglycerol  
Hydroxysearate, Sodium Acetate, Peppermint Oil, Levomenthol.
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה** – שפופרת המכילה 50 גר' ג'ל צלול או מעט עכור, בריח מנטה.
- **בעל הרישום ויבואן:** הלאון סי. אייץ. ישראל בע"מ, ת.ד. 3256 פתח תקונה.
- נוערך בספטמבר 2024.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 114-62-29571
- לשם פשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מנוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.