



File Name	Rivaroxaban-Patient Card-HEB-S14-F		
Product	Rivaroxaban	Job No.	SO24000716
Language	Hebrew	Artwork	Patient Card
Document History			
Ver.	Date	Change description	By
5-Dec-24	09:09	Last save	

Our Expertise. Your Success.

כרטיס מידע בטיחותי למטופל בנוגד הקרישה ריברוקסבאן פרופארם

ריברוקסבאן פרופארם 10 מ"ג
ריברוקסבאן פרופארם 15 מ"ג
ריברוקסבאן פרופארם 20 מ"ג

שא כרטיס זה עימך בכל עת.
הצג כרטיס זה לכל רופא או רופא שיניים בתחילת הביקור.

נושא כרטיס זה מטופל בנוגד הקרישה ריברוקסבאן פרופארם

שם _____
כתובת _____
תאריך לידה _____ משקל _____
מידע לגבי מחלות ותרופות נלוות _____

מידע לשעת חירום

במקרה חירום אנא הודיעו לרופא המטפל _____
טלפון _____

אנא הודיעו גם לי:

שם _____ קרבה משפחתית _____
טלפון _____
טלפון חירום (מרפאה/עזרה ראשונה) _____

מידע על השימוש בתרופה

תאריך התחלת הטיפול

התוויה

מינון ומשטר מתן

תפקוד כלייתי בעת תחילת הטיפול (creatinine clearance ml/min)

מידע לצוות הרפואי:

מדידת INR אינה מתאימה להערכת הפעילות האנטיקואגולנטית של ריברוקסבאן פרופארם, ולכן אין להשתמש בה למטרה זו.

מידע אודות נוגדי קרישה והנחיות למטופל

- ◆ נוגד הקרישה ריברוקסבאן פרופארם הוא מדלל דם שמגן עליך מפני היווצרות קרישי דם מסוכנים.
- ◆ יש ליטול ריברוקסבאן פרופארם בדיוק לפי מרשם הרופא. על מנת להבטיח הגנה אופטימלית מפני קרישי דם, יש להקפיד על מועדי הנטילה כפי שהומלץ על ידי הרופא ולא לדלג על אף טבלייה, אלא בהוראת הרופא.
- ◆ אין להפסיק את נטילת ריברוקסבאן פרופארם ללא התיעצות עם הרופא, זאת מאחר שהדבר עלול להגביר את הסיכון להיווצרות קרישי דם.

נטילה עם מזון:

על מנת להבטיח יעילות מרבית של הטיפול:

- ◆ ריברוקסבאן פרופארם במינון 20 מ"ג - חובה ליטול עם מזון.
- ◆ ריברוקסבאן פרופארם במינון 15 מ"ג - חובה ליטול עם מזון.
- ◆ ריברוקסבאן פרופארם במינון 10 מ"ג - ניתן ליטול עם או בלי מזון.

יש לבלוע את הטבלייה עם מים. אם קשה לך לבלוע את הטבלייה בשלמותה, ניתן לרסק את הטבלייה ולערבב עם מים או מחית תפוחים, מייד לפני נטילתה. במינונים 15/20 מ"ג יש לאכול מייד לאחר נטילת התרופה המרוסקת.

אם שכחת ליטול ריברוקסבאן פרופארם בזמן הדרוש:

- ◆ במינון של 10/15/20 מ"ג פעם ביום - יש ליטול מנה מייד כשזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות באותו יום!
- ◆ במינון של 15 מ"ג פעמיים ביום – [במהלך שלושת השבועות הראשונים של הטיפול בפקקת ורידים עמוקים (DVT) או תסחיף ריאתי (PE)] יש ליטול מנה מייד כשזכרת. אין ליטול יותר משתי טבליות של 15 מ"ג ביום אחד. ניתן ליטול שתי טבליות של 15 מ"ג ביחד לקבלת מינון של 30 מ"ג ליום אחד. למוחרת היום יש להמשיך וליטול טבלייה אחת של 15 מ"ג פעמיים ביום.
*בכל מקרה של ספק, יש להתייעץ עם הרופא.

- ◆ ספר לרופא על כל תרופה נוספת שאתה נוטל, שנטלת לאחרונה או שבכוונתך להתחיל ליטול, טרם התחלת הטיפול בריברוקסבאן פרופארם. הנחיה זו כוללת גם תרופות ללא מרשם (לרבות נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, NSAIDs) ותוספי תזונה.
- ◆ טרם ביצוע פעולה כירורגית או פולשנית כלשהי, לרבות טיפולי שיניים, עליך ליידע את הרופא המטפל על נטילת ריברוקסבאן פרופארם.
- ◆ בעת נטילת נוגד קרישה כגון ריברוקסבאן פרופארם, עליך להיות מודע לתופעות הלוואי האפשריות שלו.
 - לרשימה מלאה של תופעת הלוואי, יש לעיין בעלון לצרכן.
 - דימום הוא תופעת הלוואי השכיחה ביותר.
 - אם ידוע לך כי אתה נמצא בסיכון לדימום, אל תחל בנטילת ריברוקסבאן פרופארם לפני שתדון בכך עם הרופא המטפל.

פנה מייד לרופא אם תסבול מסימנים או תסמינים העלולים להעיד על דימום, כגון:

- כאב
- חיוורון
- נפיחות בלתי מוסברת או אי-נוחות
- כאב ראש, סחרחורת, עייפות או חולשה יוצאת דופן
- קוצר נשימה
- כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס)
- שטפי דם תת-עוריים חריגים, דימום מהאף, דימום מהחניכיים, דימום מחתכים אשר אינו פוסק במשך פרק זמן ארוך
- דימום נרתיקי או דימום וסתי מוגבר באופן חריג
- דם בשתן, שעשוי להיות ורוד או חום; צואה אדומה או שחורה
- שיעול דמי או הקאה של דם או של חומר דמוי גרגרי קפה

אם אתה מצוי בסיכון לדימום מוגבר, יש לדון בכך/להתייעץ עם הרופא. גורמי סיכון עיקריים לדימום כוללים בין היתר:

- מחלת כליה בדרגה בינונית או חמורה
- הפרעה כבדית
- תרופות המשפיעות על קרישת דם כגון נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, אספירין ונוגדי קרישה אחרים
- יתר לחץ דם חמור בלתי מאוזן
- אתה סובל מדימומים
- מחלה בקיבה או במעי העלולה לגרום לדימום כגון דלקת המעי או הקיבה, או דלקת בושט כתוצאה, למשל, ממחלת החזר קיבתי-ושטי
- רטינופטיה
- ברונכיאלקטזיות או דימום קודם מהריאה

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות פורטל לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il
או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

כמו כן ניתן לדווח על תופעות לוואי ועל פגמי איכות ליחידת המעקב התרופתי של בעל הרישום:
דואר אלקטרוני: safety@medicalix.com
טלפון: 1-800-200-047
פקס: 073-2638521

למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן. בכל שאלה, אנא פנה לרופא המטפל.
כרטיס זה אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך 09.2024.