

Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
قنينة زجاجية يحوم 60 مل تحتوي على 30 قرصاً. كل قرص بيضوي الشكل،
لونه أزرق فاتح مع خط للشطر.

اسم المصنوع/صاحب الامتياز وعوانه: ك ص للصناعات الكيميائية م.ض.،
هايدبوري، 3، كريات ملاخي.

نَّة تحرير هذه النشرة في 09/2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

1311330853

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على
الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:
للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق الـ **12**: 2 أقراص بعدوجبة الطعام أو
قبل النوم بحسب الحاجة.
لا يجوز تناول أكثر من 4 أقراص خلال 24 ساعة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
إذا أخذ الدواء غير مخصوص عادة للأطفال الرضيع والأولاد الذين عمرهم أقل من

12 عاماً بسبب طريقة الإعطاء/جرعة الدوائية المتوفرة بطريقة الإعطاء هذه.
دون هذا العمر، يوصى باستعمال تينيبيوت سيميكول.

لا يجوز المرضع إدخال الدواء مع الماء.
يُسمح بشرم الفرصة.

إذا تناولت جرعة طبيعية أو إذا قام ولد بلعب الدواء خطأ، فرجحه فوراً إلى
الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عينة الدواء.

إذا أتيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة مضاعفة. تناول
الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في المعتدلة /إراجع المنشق وتأكد من الجرعة في كل مرة
تناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت حجاجة إليها.

إذا تقررت لديك مذكرة أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب
الصحي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال جازيم X إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض
المستعملين. لائق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعلمي من أي
واحد منها.

الأعراض الجانبية المحتملة هي الغثيان، الإمساك أو رد فعل التحسسي مثل
الطفح الجلدي، الحكة في الجلد، انتفاخ الوجه أو اللسان أو الصعوبات في
التنفس.

إذا ظهر عرض جانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من
عرض جانبية لم يذكر في هذه النشرة، طلقي استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط
"التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستماراة
المتعلقة للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امتنع النسم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن
متناول أي الأولاد وأي الأطفال الرضيع و المجال روبيتهم، وبذلك تستمنع التسمم.

لا تسببي التقوير بدون تعليمات مرسومة من الطبيب.
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية .(exp) (المدون على

العبوة). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
يجب التخزين في العبوة الأصلية.

صالحة لاستعمال لمدة شهرين كحد أقصى منذ يوم فتحه.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Tribasic calcium phosphate, Dextrose, Microcrystalline
cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate,

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة (مستحضرات) 1986
يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبية

جازيم X أقراص 125 ملг

يحتوي كل قرص على: 125 ملغ من سيميثكون - Simethicone 125 mg
المادة غير الفعالة ومسننات الأرجية في المستحضر - انظر البند "معلومات
هامة عن بعض مركبات الدواء" والمفصل 6.
اقرأ النشرة بالعلن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على
معلومات مخصصة عن الدواء. إذا تقررت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب
أو الصيدلي.

يُنصح عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بذ الجرعة
الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.
يُنصح عليك راجحة الطبيب إذا تفاقمت أعراضه أو لم تتحسن.
جازيم X غير مخصوص للأطفال الرضيع والأولاد الذين عمرهم أقل من
12 عاماً. دون هذا العمر، يوصى باستعمال تينيبيوت سيميكول.

1. لأي غرض مخصوص هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصوص للتخفيف من الانتفاخ والغازات في الجهاز الهضمي.
الفصيلة العلاجية: مضادات الغازات

2. قبل استعمال الدواء إذا:

• كانت لديك حساسية (أرجحية) لل المادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى
التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

• التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية
بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصصة
إذا كنت تستعمل:

• ليفوثروكسين لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية. قد يقلل جازيم X كمية
ليفوثروكسين التي يتم امتصاصها بذلك وينتزع من ثأثيره.

• استعمال الدواء والطعام
يجب تناول الدواء بعدوجبة الطعام.

• العمل، الارتفاع والخصوصية
يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاماً، قد تكونين

حاملة، تخططين للحمل أو مرضصاً.
لا يجوز استعمال المستحضر في فترة الحمل إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

• معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوي المستحضر على حاطن من السكريتات. إذا أخبرك طبيبك بأن لديك عدم
تحمل لمركبات معينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الفرنس وذلك يعتبر خالياً
من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن
كيفية العلاج بالمستحضر.

