

**Инструкция по применению в соответствии с
фармацевтическими стандартами
(препараты) - 1986**

Препарат продается без рецепта врача

Газим X

Таблетки 125 мг

Каждая таблетка содержит: Симетикон 125 мг - Simethicone 125 mg

Список содержащихся в препарате неактивных компонентов и аллергенов приведен в разделе 6 и в разделе «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата».

Внимательно и полностью прочтите инструкцию перед приёмом препарата. Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Способ применения препарата изложен в пункте «Дозировка» данной инструкции.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация.

Обратитесь к врачу, если признаки (симптомы) заболевания ухудшаются или не улучшаются.

Газим X как правило не предназначен для младенцев и детей младше 12 лет. Младше этого возраста рекомендуется использовать Типтипот Симикол.

1. Показания к применению:

Препарат предназначен для уменьшения образования и скопления газов в желудочно-кишечном тракте.

Терапевтическая группа: ветрогонные средства

2. Перед применением препарата:

☒ Не следует пользоваться препаратом, если:

- У вас имеется чувствительность (аллергия) к активным веществам или к какому-либо из вспомогательных компонентов, содержащихся в препарате (см. пункт 6).

☒ Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту. Это в особенности важно, если вы принимаете:

- Левотироксин для лечения нарушений щитовидной железы. Газим X может снизить абсорбцию Левотироксина и ослабить его действие.

☒ Применение препарата с пищей

Принимайте препарат после еды.

☒ Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если вы беременны, возможна беременность, планируете беременность или кормите грудью.

Не принимайте препарат во время беременности, кроме как по указанию врача.

☒ Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Препарат содержит смесь сахаров. Если ваш врач сказал вам, что у вас имеется непереносимость к некоторым сахарам, проконсультируйтесь с врачом перед приемом данного препарата.

В каждой таблетке препарата содержится менее 23 мг натрия, поэтому препарат считается не содержащим натрия.

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа приема препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Принятая дозировка:

для взрослых и детей старше 12 лет: 1-2 таблетки после еды или перед сном по мере необходимости. Максимально допустимая суточная доза: 4 таблетки. **Не превышать рекомендуемую дозу.**

Данный препарат как правило не предназначен для младенцев и детей возрастом младше 12 лет из-за существующей лекарственной формы/дозировки. Младше этого возраста рекомендуется использовать Типтипот Симикол.

Не жевать! Препарат следует проглотить, запивая водой.

Допускается делить таблетку.

В случае передозировки или случайного приема препарата ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы; покажите упаковку препарата.

Если вы забыли вовремя принять препарат, не принимайте двойную дозу. Примите следующую дозу в обычное время и проконсультируйтесь с врачом.

Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приёме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты:

Как и при приёме любого лекарственного препарата, приём Газим X может привести к побочным эффектам у части потребителей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Возможные побочные эффекты - тошнота, запор или аллергическая реакция, как например кожная сыпь, кожный зуд, отек лица или языка, либо затрудненное дыхание.

В случае появления или обострения какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «Отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), или по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?

Избегайте отравлений! Во избежание отравлений это лекарство, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

Не используйте препарат после истечения срока годности (exp.) указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Условия хранения: Хранить при температуре ниже 25°C.

Храните в оригинальной упаковке. Используйте в течение двух месяцев после открытия.

6. Дополнительная информация:

В дополнении к действующим веществам препарат включает:

Tribasic calcium phosphate, Dextrates, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake

Как выглядит препарат и содержимое упаковки? Стеклянная бутылка объёмом 60 мл, содержащая 30 таблеток. Каждая таблетка имеет овальную форму, светло-синий цвет и разделяющую полосу.

Производитель/владелец регистрационного удостоверения и его адрес: CTS Chemical Industries Ltd. Аккадма 3, Кирьят-Малахи.

Данная брошюра была отредактирована 09/2021 в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 1311330853

