

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקמים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סימיקול טבליות 125 מ"ג

כל טבליה מכילה: 125 מ"ג סימיתקון - Simethicone 125 mg
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6.
קרא בעיון את העלון עד סופו טרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עלך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
עלך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.
סימיקול טבליות אינו מיועד בדרך כלל לתינוקות וילידים מתחת לגיל 12 שנים. מתחת לגיל זה מומלץ להשתמש בטיפטיפות סימיקול.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בנפיחות ובגזים במערכת העיכול. קבוצה תרופתית: נוגדי גזים

2. לפני השימוש בתרופה:

☒ **להשתמש בתרופה אם:**

- אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

ⓘ אינטראקציות ותגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
• לבותריקסין לטיפול בהפרעות בבלוטת התריס. סימיקול טבליות עלול להוריד את כמות הלבותריקסין הנוספת ולהלחיש את השפעתה.

ⓘ שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.

ⓘ הריון, הנקה ופוריות

יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, עשויה להיות בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
אין להשתמש בתכשיר בהריון אלא אם הרופא הורה לך זאת.

ⓘ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל תערובת סוכרים. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך, כי יש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ועל כן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים וילידים מעל גיל 12: 1-2 טבליות לאחר הארוחה או לפני השינה בהתאם לצורך.

אין ליטול יותר מ-4 טבליות ביממה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילידים מתחת לגיל 12 שנים בשל צורת המתן/המינון הזמין בצורת מתן זו. מתחת לגיל זה מומלץ להשתמש בטיפטיפות סימיקול.

אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מים.

מוותר לחצות את הטבליה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בסימיקול טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות לוואי אפשריות הן בחילה, עצירות או תגובה אלרגית כגון פריחה עורית, גרד בעור, התנפחות של הפנים או הלשון או קשיי נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או נאכשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Tribasic calcium phosphate, Dextrates, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

מגשיש של 10 טבליות. כל אריזה מכילה 20 או 30 טבליות.

הטבליות עגולות בצבע כחול בהיר.

שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 09/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפקטס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1487933834

שלש הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

