

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

אמבוטייפ וטרינרי

EMBOTAPE VETERINARY

פסטה לטיפול בתולעים בסוסים, למריחה בחלל הפה

אמבוטייפ הוא תכשיר לטיפול בתולעים בסוסים, המכיל את החומר הפעיל **Pyrantel Embonate** 11.4g בכל מזרק של 28.5g.

מכיל **0.0057g Butylated Hydroxytoluene** כאנטי אוקסידנט. כל סימון במזרק, ל-100 ק"ג משקל גוף, מכיל **Pyrantel Embonate** 1.9g.

חומרים בלתי פעילים:

Butylated Hydroxytoluene (E321), Polysorbate 80, Colloidal Anhydrous Silica, Maize Oil Refined

קבוצה תרופוטיית: לטיפול בתולעים.

פעילות רפואית: לטיפול בזיהומים של:

large and small Redworms, Ascarids and Pinworms המצויים במערכת העיכול של הסוסים. אמבוטייפ משמש גם לטיפול בזיהומי Tapeworm.

התוויות נגד ואזהרות: שימוש משולב של Pyrantel עם Levamisol או Piperazine אינו מומלץ.

יש להימנע ממגע ישיר עם העור. יש לשטוף ידיים וכל חלק גוף אחר שבא במגע עם התכשיר לאחר השימוש.

יש להימנע ממגע עם התכשיר אם ידועה לך רגישות לחומר הפעיל. שימוש באותו מזרק ב-2 חיות אפשרי רק אם הן בריאות ורועות ביחד או נמצאות באותו שטח ובמגע אחת עם השנייה.

השימוש באמבוטייפ בטוח לסוסים ופונים בכל הגילאים, כולל סייחים יונקים ונקבות בהריון.

דחיסה של המעי הדק עלולה להתרחש בסייחים עם זיהום נרחב של Ascarids. עוויתות מעיים עלולות להראות 30 דקות לאחר הטיפול. במקרה של השפעה מופחתת יש להתייעץ עם וטרינר.

אם הבחנת בתופעות לוואי שאינן מצוינות בעלון זה, נא דווח לווטרינר.

בעת הטיפול יש להימנע מן הפעולות הבאות, כיוון שהן מגדילות את הסיכון לפיתוח עמידות לתרופה ויכולות לגרום לבסוף לחוסר יעילות של הטיפול:

- שימוש תכוף מדי, חוזר וממושך של תרופות נגד תולעים מאותה קבוצה (anthelmintic).

- מינון נמוך מדי, היכול להינתן כתוצאה מהערכה נמוכה מדי של משקל הסוס, בעיות במתן התרופה או מדידה לא נכונה של המנה.

תכנון הטיפול: במהלך עונת הרעייה, סוסים מעל גיל 8 חודשים צריכים לקבל טיפול עם אמבוטייפ כל 4-6 שבועות. בשאר השנה, יש לטפל בסוסים כל 6-8 שבועות. לסוסים חדשים ולסוסים שהוחזקו בפנים במהלך החורף יש לתת טיפול ולהשאיר בפנים במשך 3-4 ימים. יש להתייעץ עם וטרינר על המינון המומלץ לטיפול ומניעת תולעים, וזאת על מנת למנוע התפתחות עמידות לתרופה של התולעים. מומלץ כי סוסות עם סייחים ירעו בשטח בו לא רעו סוסים אחרים ב-12 החודשים הקודמים. כאשר זה לא אפשרי, מומלץ שירעו בשטח בו לא רעו סוסים אחרים בתקופה בין ינואר למאי. זה יוריד את הסיכוי לסייח להדבק בתולעים. יש לתת לסוסה טיפול 3-4 ימים לפני הוצאה למרעה ואז במרווחים של 2-4 שבועות עד סוף הסתיו. יש לטפל בסייחים בגיל 1-8 חודשים כל 4 שבועות. אין לטפל בגיל פחות מ-4 שבועות.

מינון והוראות שימוש: מזרק אחד מכיל מנה המספיקה ל-600 ק"ג משקל גוף. כל סימון על המזרק נותן מנה המספיקה ל-100 ק"ג משקל גוף. בטיפול ב-Tapeworm (מסוג Anoplocephala) יש להכפיל את המנה, ז"א 2 מזרקים לטיפול ב-600 ק"ג משקל גוף (ז"א 2 סימונים על המזרק לטיפול ב-100 ק"ג משקל גוף).

יש להעריך את משקל הגוף בצורה מדויקת ככל האפשר לפני הטיפול. את התכשיר יש למרוח בחלק האחורי של לשון הסוס. הרמת הראש תעזור לסוס לבלוע את התכשיר.

המלצות למינון:

משקל הסוס	סוג / זן	מינון לטיפול שגרתי
עד 100 ק"ג	פוני גמדי	עד לסימון 100 במזרק
101-300 ק"ג	סייחים, פונים, חמורים	עד לסימון 300 במזרק
301-400 ק"ג	סוסים בינוניים	עד לסימון 400 במזרק
401-500 ק"ג	סוסים ערביים	עד לסימון 500 במזרק
501-600 ק"ג	סוסים גדולים	עד לסימון 600 במזרק
601 ק"ג ומעלה	סוסים מגזע גדול מאד	1 מזרק + תוספת 100 במזרק לכל 100 ק"ג משקל גוף

אחסון:

* יש לאחסן מתחת ל-25°C. הגן מקרינת שמש ישירה.

* הרחק מהישג ידם ומטווח ראייתם של ילדים.

* המזרק הינו לשימוש חד פעמי בלבד. אין לשמור את המזרק לשימוש חוזר.

* אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה של התכשיר.

מספר רישום התרופה: 083-66-92380

היצרן: **Bimeda Animal Health Limited**, 2, 3 & 4 Airton Close, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland

בעל הרישום: אליעזר לינביץ בע"מ, אדום 6, ת.ד. 7006, א.ת. כנות, ישראל

"נערך ב 2/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות."