

DANALONE SYRUP 15 MG/ 5 ML

דנלון סירופ 15 מ"ג/ג 5 מ"ל

הרכב:

PREDNISOLONE 15 MG/ 5 ML

התוויה מאושרת:

For glucocorticoid responsive inflammation as: Endocrine disorders, rheumatic disorders, Collagen diseases, dermatologic diseases, allergic states, ophthalmic diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, neoplastic diseases, edematous states and gastrointestinal diseases.

להלן העדכונים העיקריים:

1. לפני שימוש בתרופה- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם אתה סובל מטרשת רקמת חיבור (סקלרודרמה) (מחלה אוטואימונית), היות ומינונים יומיים של 15 מ"ג ויותר יכול להגביר את החשש ממשבר סקלרודרמה כלייתי. סימנים למשבר סקלרודרמה כלייתי הם: יתר לחץ דם, הקטנה ביצירת שתן. הרופא יכול להמליץ למעקב אחרי לחץ הדם ושתן.
- התקשר לרופא אם אתה חש בערפול בראייה או כל הפרעה אחרת בראייה.
- ספר לרופא אם הנך (או המטופל אשר נוטל את התרופה) מראה סימנים של בעיות נפשיות, במיוחד אם הנך בדיכאון או חושב על התאבדות. במקרים מועטים בעיות נפשיות התרחשו כאשר המינון הופחת או התרופה הופסקה.

2. אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות:

- יש תרופות שעלולות להגביר את האפקט של דנלון, וייתכן שהרופא ירצה לנטר בקפידה את מצבך אם אתה לוקח תרופות אלו (כולל תרופות ל-HIV: ריטונאביר וקוביסיסטט).

3. תופעות לוואי:

- ראייה מטושטשת
- משבר סקלרודרמה כלייתי- בחולים הסובלים מסקלרודרמה (מחלה אוטואימונית). סימנים למשבר סקלרודרמה כלייתי כוללים עליה בלחץ דם וירידה בתפוקת השתן.

בברכה,

דיויד וגנר

רוקח ממונה

מגפארם בע"מ