


تحضير منطقة الحقن وحقن الدواء


1. إخراج فقاعات الهواء

- أخرجي إبرة الحقن المعلمة بالرمادي من غلافها وولينيها إلى المحقنة. انزع عطاء الإبرة.
- أمسكي المحقنة مع الإبرة الرمادية بحيث تتجه الإبرة باتجاه الأعلى والفحصي وجود فقاعات هواء.
- لإخراج فقاعات الهواء، يجب الطرق على المحقنة بلطف بواسطة الأصبع حتى يتجمع كامل الهواء في الجزء العلوي من المحقنة - ومن ثم يجب الضغط على مكبس المحقنة بلطف حتى يخرج كامل فقاعات الهواء.
- لا يجوز ملامسة الإبرة الرمادية ولا تدعى الإبرة تلامس أي شيء.



3. إدخال الإبرة للجلد

- أمسكي المحقنة بيد واحدة - كما تسمكين قدم الرضاة.
- إقرصي الجلد بإحدى اليدين الثانية بلطف من حول نقطة الحقن لتشكل طية.
- أدخل الإبرة لأرماًنية كاملياً بلطف في نقطة الحقن لأدخل طية الجلد، المتشكلة جراء قرص الجلد، بزاوية 45 درجة حتى 90 درجة. وحينئذ حرري الجلد المقروص.



4. حقن الدواء

- إحمسي بلطف مكبس المحقنة قليلاً إلى الوراء. إننا نظهر دم في المحقنة فيجب التوقف والمواصلة حسب المرحلة 5.
- إذا لم يظهر دم في المحقنة، فومي بحقن المحلول **ببطء** بالضغط على مكبس المحقنة حتى النهاية.
- بعد إدخال كامل محتوى المحقنة و فراغ المحقنة، أخرجي ببطء الإبرة من الجلد بنفس الزاوية التي أدخلت فيها.
- امسحطي بلطف على سطح نقطة الحقن بواسطة إسفنجة الكحول الثانية.

5. في حال ظهور دم

- أخرجي الإبرة ببطء بنفس الزاوية التي أدخلت فيها.
- امسحطي بلطف على سطح نقطة الحقن بواسطة إسفنجة الكحول الثانية.
- يجب إفراغ محتوى المحقنة لأدخل المغسلة والتصرف حسب الإرشادات في المرحلة 6 أدناه.
- اغسلي يديك وإيدي من جديد من المرحلة 1 مع قتيبة ومحقنة معبأة بمزيت جديتين.

6. التخلص من الدواء

- القتيبة، المحقنة والإبر مخصصة للاستعمال لمرة واحدة فقط.
- عند الانتهاء من الإستعمال أعودي لأعطية إلى الإبر لتتسمى رميها بأمان.
- أسألي الصيدلي عن كيفية التخلص بشكل لائق من القتيبة، المحقنة والإبر المستعملة.

DOR-CET-0.25mg-316X605POR-0421-05

- ### 2. تكيم منطقة الحقن
- إختاري نقطة الحقن في منطقة البطن، يفضل من حول السرة، يجب إختيار منطقة جفن أخرى في البطن كل يوم، وذلك لتجنب حدوث تهيج جلدي موضعي.
 - نظفي منطقة الحقن التي إختارتها بواسطة إسفنجة الكحول الثانية - بحركة دائرية.