

يوتيروكس® 50 ميكروغرام يوتيروكس® 100 ميكروغرام

أقراص

المادة الفعالة: صوديوم ليفوثيروكسين (Levothyroxine sodium)

50 أو 100 مكغ.

المواد غير الفعالة - أنظر الفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. إحتفظ بالنشرة بمتناول اليد، من الجائز أن تحتاج إلى قراءتها بتمعن ثانية.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

إذا شعرت بأية أعراض جانبية، توجه للطبيب أو الصيدلي الخاص بك. هذا يشمل أي عرض جانبي محتمل لا تحتويه هذه النشرة. أنظر الفقرة 4.

(1) لأي غرض مخصص الدواء

ليفوثيروكسين، المركب الفعال في يوتيروكس، هو بديل اصطناعي للهورمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية ويستعمل لعلاج أمراض الغدة الدرقية أو في قصور الأداء الوظيفي للغدة الدرقية. ليفوثيروكسين ذو تأثير مشابه للهورمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية.

يوتيروكس يعيارات دوائية مختلفة يستعمل لعلاج الحالات التالية:

- تضخم الغدة الدرقية الحميد (ورم درقي حميد - إنتفاخ في العنق بسبب تضخم الغدة الدرقية) لدى معالين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية
- منع تكرار ظهور ورم درقي بعد عملية جراحية
- الغدي للهورمون الطبيعي الذي تنتجه الغدة الدرقية إذا كانت الغدة الدرقية لديك لا تنتج ثيروكسين بكمية كافية
- تثبيط تجدد نمو ورم لدى معالين يعانون من سرطان الغدة الدرقية
- لموازنة نسب الهورمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، وذلك عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية
- بجرعة دوائية قدرها 100 مكغ وما فوق، يستعمل يوتيروكس لفحص سلامة نشاط الغدة الدرقية.

المقادير الدوائية مفصلة في الفقرة 3.

الفصيلة العلاجية: هورمون الغدة الدرقية (Thyroid).

(2) قبل إستعمال الدواء

من أجل ضمان استمرار العلاج بالمستحضرات الحاوية صوديوم ليفوثيروكسين، فإن إستبدال مستحضر معين بجوي صوديوم ليفوثيروكسين بمستحضر آخر، يتم فقط باستشارة طبية شخصية وبمراقبة حثيثة للمعالج.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها (أنظر الفقرة 6)
 - كنت تعاني من خلل وظيفي غير معالج للغدة الكظرية أو الغدة النخامية أو فرط نشاط غير معالج للغدة الدرقية (انسداد درقي)
 - كنت تعاني من مرض قلبي شديد (إحتشاء عضلة القلب أو إتهاب القلب)
- لا يجوز إستعمال الدواء سوياً مع أدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية وذلك إذا كنت في فترة الحمل (إقرئي بتمعن فقرة «الحمل والإرضاع» لاحقاً).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل بدء العلاج ب يوتيروكس، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أحد أمراض القلب التالية:

- إضطراب في تدفق الدم في الأوعية الدموية التاجية (ذبحة صدرية، angina pectoris)
- قصور القلب
- نبض سريع وغير منتظم
- ضغط دم مرتفع
- طبقة شحمية على جدران الشرايين (تصلب الشرايين، arteriosclerosis)

في هذه الحالات يجب أن تكون متوازن من ناحية طبية وذلك قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية. في فترات متقاربة يتوجب فحص نسب الهورمون الذي تنتجه الغدة الدرقية لديك أثناء العلاج ب يوتيروكس. إذا لم تكن متأكدًا من وجود هذه الحالات لديك، أو إذا كنت تعاني من أي مرض من بين هذه الأمراض لكتمك لم تتلق حتى الآن علاجًا لها، كن على اتصال بطبيبك.

يفحص طبيبك فيما إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الغدة الكظرية، الغدة النخامية أو الغدة الدرقية من إنتاج زائد وغير مراقب لهورمونات الغدة الدرقية (ذاتية الغدة الدرقية)، لأن هذه الحالات يجب أن تكون متوازنة من ناحية طبية قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية.

يجب مراقبة ضغط الدم بشكل متواتر عند بدء العلاج ب ليفوثيروكسين لدى خدج الذين كان وزنهم عند الولادة منخفض جدًا لأنه قد يحدث هبوط سريع في ضغط الدم (فشل دوراني).

قد يحدث عدم توازن في هورمونات الغدة الدرقية إذا توجب عليك تبديل الدواء الخاص بك بمستحضر آخر يحتوي على ليفوثيروكسين. توجه لطبيبك إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص تبديل الدواء الخاص بك. يتطلب الأمر مراقبة متواترة (سريرية وبيولوجية) خلال فترة الإنتقال. إحك للطبيب إذا قاسيت من أعراض جانبية لأن ذلك قد يدل على الحاجة لملاءمة المقدار الدوائي (رفع أو خفض).

إحك للطبيب:

- إذا كنت في فترة الإنقطاع الطمث (سن اليأس) أو بعدها (فترة ما بعد سن اليأس): بسبب الخطورة للإصابة بمرض تخلل العظام، من الجائز أن يحتاج الأمر فحص نشاط الغدة الدرقية بصورة منتظمة.
- قبل البدء، التوقف أو إجراء تغيير في تناول أورليستات (Orlistat)، دواء يستعمل لعلاج السمنة المفرطة) من الجائز أن تخضع لفحوص في أوقات متقاربة أكثر.
- من الجائز أيضًا أن يحتاج الأمر إلى ملاءمة المقدار الدوائي من جديد.
- إذا كنت تقاسي من علامات لإضطرابات ذهانية، فمن الجائز أن يحتاج الأمر أن تجتاز فحوصات في أوقات متقاربة أكثر. من الجائز أيضًا أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي من جديد.

لا يجوز إستعمال هورمونات الغدة الدرقية لفحوص الوزن. إن إستعمال هورمونات الغدة الدرقية لا يؤدي إلى إنخفاض في وزنك، إذا كانت نسبة هورمون الغدة الدرقية لديك ضمن الحدود الطبيعية. أعراض جانبية شديدة أو حتى مهددة للحياة قد تظهر في حال زيادتك للجرعة الدوائية دون إستشارة طبيبك.

لا يجوز إستعمال مقادير دوائية مرتفعة من هورمونات الغدة الدرقية سوية مع أدوية معينة لتخفيض الوزن مثل أمفيمبرامون (Amfepramone)، كاتين (Cathine) وفينيل پروبانولامين (Phenylpropranolamine). لأن خطورة حدوث أعراض جانبية شديدة أو حتى مهددة للحياة قد تزيد.

التداخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخرًا أو إذا من شأنك أن تتناول، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- يوتيروكس قد يؤثر على عمل الأدوية التالية:
- أدوية مضادة للسكري (أدوية خافضة لنسبة السكر في الدم): يوتيروكس قد يقلل من تأثير دواء السكري الذي تتناوله، لذلك يمكن أن تحتاج إلى إجراء فحوص إضافية لنسب السكر في الدم، خاصة عند بدء العلاج ب يوتيروكس. أثناء العلاج ب يوتيروكس، من الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي للدواء المضاد للسكري الذي تتناوله.
- مشتقات الكومارين (أدوية تستعمل لمنع تخثر الدم): يوتيروكس قد يزيد من تأثير هذه الأدوية. هذا الأمر يمكن أن يزيد الخطورة لحدوث نزف، خاصة لدى المسنين، لذلك من الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص منتظمة لقيم تخثر الدم لديك عند بدء العلاج ب يوتيروكس وخلاه. أثناء العلاج ب يوتيروكس، من الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي للدواء من فصيلة الكومارين الذي تتناوله.

إحرص على تقيدك بالفواصل الزمنية الموصى بها للتناول وذلك إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

- الأدوية المستعملة لربط الحموض الصفراوية وتخفيض النسب العالية للكوليسترول (مثل كوليستيرامين - cholestyramine أو كوليستيپول - colestipol): تأكد من أنك تتناول يوتيروكس أربع حتى خمس ساعات قبل تناول هذه الأدوية. لأنها قد تحجب إمتصاص يوتيروكس من الأمعاء.
- مضادات الحموضة (أدوية تستعمل لتخفيف من المشاكل الهضمية)، سوكرفالات (Sucralfate)، لعلاج القرحة في المعدة أو الأمعاء)، أدوية أخرى الحاوية ألومنيوم، الأدوية الحاوية حديد، الأدوية الحاوية على كالسيوم:
- تأكد من أنك تتناول يوتيروكس ساعتين على الأقل قبل تناول هذه الأدوية. لأنها قد تقلل من تأثير يوتيروكس.

بلّغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، لأنها قد **تضعف** من تأثير يوتيروكس:

- بروپيل ثيوأوراسيل (Propylthiouracil)، دواء لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية)
- جلوكوكورتيكويدات (Glucocorticoids)، أدوية ستيروئيدية مضادة للتحسس ومضادة للإلتهاب)

- حاجيات بيتا (أدوية خافضة لضغط الدم تستعمل أيضًا لعلاج أمراض القلب)
- سيرترالين (Sertraline)، دواء لعلاج الإكتئاب (النفسي)
- كلوروكوين أو بروجوانيل (Chloroquine أو Proguanil)، دواء لمنع الملاريا أو لعلاجها)

- أدوية تنشط عمل خلايا معينة في الكبد مثل باربيتورات (أدوية مهدئة أو أقراص نومة) أو كاربامازيبين (Carbamazepine)، دواء لعلاج الصرع، يستعمل أيضًا لتعديل أنواع مختلفة من الألم ولموازنة إضطرابات في المزاج)
- أدوية حاوية أستروجين المستعملة للعلاج الهرموني البديل أثناء فترة سن اليأس أو بعدها أو كوسائل مانعة للحمل
- سيفلماير (Sevelamer)، دواء يربط الفوسفات يستعمل لعلاج مرضى يعانون من فشل كلوي مزمن)
- منبطات تيروزين كيناز (أدوية مضادة للسرطان ومضادة للإلتهاب)
- أورليستات (Orlistat)، دواء يستعمل لعلاج السمنة المفرطة)

بلّغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، لأنها قد **تزيد** من تأثير يوتيروكس:

- سالييلات (أدوية تستعمل لتخفيف الألم أو لتخفيض السخونة)
- ديكومارول (Dicumarol)، دواء مضاد لتخثر الدم)
- فوروسيميد (Furosemide) بجرعة دوائية عالية قدرها 250 ملغ أو أكثر (دواء مدر للبول)
- كلوفيبيرات (Clofibrate)، دواء لتخفيض نسب الشحوم في الدم)

بلّغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، فهي قد **تؤثر** على عمل يوتيروكس:

- ريتونافير، ايندينافير، لوبينافير (Ritonavir، Indinavir، Lopinavir)، مثبّطات بروتيناز، الأدوية لعلاج HIV)
- فينتوتين (Phenytoin)، دواء لعلاج الصرع)

من الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص منتظمة لقيم هورمون الغدة الدرقية لديك، من الجائز أن يحتاج الأمر إلى ملاءمة الجرعة الدوائية ل يوتيروكس.

بلّغ طبيبك إذا كنت تتناول أميودارون (Amiodarone)، دواء يستعمل لعلاج إضطرابات نظم القلب، لأن هذا الدواء قد يؤثّر على وظيفة وعلى نشاط الغدة الدرقية لديك.

إذا كنت بحاجة لإجراء صورة بأشعة رنتجن أو فحوص تشخيصية أخرى بواسطة مواد ظليلة تحوي يود، بلغ طبيبك أنك تتناول يوتيروكس، من الجائز أن يتطلب منك تلقي حقنة التي قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية لديك.

إستعمال الدواء والطعام

بلغ طبيبك إذا كنت تتناول منتجات الصويا، خاصة إذا كنت تغير من نسبة منتجات الصويا التي تستهلكها في غذائك، المنتجات الحاوية صويا قد تخفض إمتصاص يوتيروكس من الأمعاء ولذلك من الجائز أن يحتاج الأمر تغيير الجرعة الدوائية التي تتناولها من يوتيروكس.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، إستمري بتناول يوتيروكس، تكلمي مع طبيبك عن الحمل، لأنه من الجائز أن تكون حاجة لملاءمة الجرعة الدوائية.

إذا كنت تتناولين يوتيروكس بصورة متزامنة مع دواء مضاد لنشاط الغدة الدرقية من أجل معالجة فرط إنتاج هورمونات الغدة الدرقية، فسوف يوصيك طبيبك بالتوقف عن العلاج ب يوتيروكس إذا كنت حاملًا.

إذا كنت في فترة الإرضاع، إستمري بتناول يوتيروكس حسب تعليمات طبيبك، إن كمية الدواء المطروحة في حليب الأم تكون صغيرة بحيث لا تؤثر على رضيعك.

السياقة وإستعمال الماكينات

لم تُجرى أبحاث عن تأثير هذا الدواء على القدرة على السياقة على تشغيل ماكينات، بما أن ليفوثيروكسين يشابه هورمون الغدة الدرقية المنتج في الجسم بصورة طبيعية، فمن غير المتوقع أن يضر الدواء يوتيروكس من القدرة على السياقة أو تشغيل ماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على الكلتوز. لا يجوز تناول يوتيروكس قبل أن تقوم باستشارة طبيبك، إذا كنت تعلم بأنك تعاني من عدم تحمل لأنواع مختلفة من السكر. أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

3 كيفية إستعمال الدواء

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يحدد لك طبيبك الجرعة الدوائية التي تناسك بالاعتماد على فحوص مختلفة وفحوص مخبرية. تبدأ عادة بجرعة دوائية منخفضة، تزداد كل أسبوعين حتى أربعة أسابيع، إلى أن يتم ملاءمة الجرعة الدوائية النهائية لك شخصياً. خلال الأسابيع الأولى للعلاج، يجب أن تحدد لك مواعيد لإجراء فحوص مخبرية، يُعتمد على نتائج الفحوص لتحديد الجرعة الدوائية المناسبة لك.

إذا ولد رضيعك مع قصور في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism)، من الجائز أن يوصي طبيبك بالبدء بجرعة دوائية أكبر، لأنه من المهم إعطاء البديل للهورمون بسرعة. الجرعة الدوائية الابتدائية الموصى بها هي 10 حتى 15 ميكروغرام لكل كيلوغرام واحد من وزن الجسم وذلك في الأشهر الثلاثة الأولى. بعد ذلك، يحدد طبيبك الجرعة الدوائية التي تناسب رضيعك.

المجالات الإعتيادية للجرعات الدوائية مسجلة في الجدول أدناه، مع ذلك، من الجائز أن جرعة دوائية أقل يمكن أن تكون مناسبة إذا:

- كنت مسناً
- كنت تعاني من مرض في القلب
- كنت تعاني من قصور شديد أو متواصل في نشاط الغدة الدرقية
- كان وزن جسمك منخفضاً أو كان لديك ورم درقي كبير

| إستطبابات لتناول يوتيروكس | | الجرعة الدوائية اليومية الموصى بها من يوتيروكس |
|--|---------|---|
| • لعلاج تضخم الغدة الدرقية الحميد (ورم درقي حميد) لدى معالجين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية | | 75 حتى 200 ميكروغرام |
| • لمنع تكرار ظهور ورم درقي بعد عملية جراحية | | 75 حتى 200 ميكروغرام |
| • لإستبدال الهورمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية، إذا كانت الغدة الدرقية لديك لا تنتج تيروكسين بكمية كافية | للذكور | 25 حتى 50 ميكروغرام |
| - جرعة دوائية ابتدائية | للإطفال | 12,5 حتى 50 ميكروغرام |
| - جرعة دوائية داعمة | | 100 حتى 200 ميكروغرام لمتربح من سطح الجسم |
| • لتثبيط نمو الورم لدى معالجين يعانون من سرطان الغدة الدرقية | | 150 حتى 300 ميكروغرام |
| • لموازنة نسب الهورمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية | | 50 حتى 100 ميكروغرام |
| • لفحص سلامة نشاط الغدة الدرقية | | 150 ميكروغرام: بدء العلاج 4 أسابيع قبل الفحص: يجب البدء بـ 75 ميكروغرام لمدة أسبوعين، ومن ثم 150 ميكروغرام حتى الفحص 200 ميكروغرام (قرصان من يوتيروكس 100 ميكروغرام): بدء العلاج: أسبوعان قبل الفحص |

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

طريقة الإستعمال:

- أقراص يوتيروكس مخصصة للإعطاء عن طريق الفم.
- دائماً يجب تناول كامل الجرعة اليومية صباحاً، على معدة خاوية (على الأقل نصف ساعة قبل وجبة الفطور)، من المستحسن مع قليل من سائل، مثلاً نصف كأس من الماء.
- للرضع يجب إعطاء كامل الجرعة اليومية من يوتيروكس على الأقل نصف ساعة قبل وجبة الطعام الأولى اليومية. قبل الإستعمال مباشرة، إسحق القرص واخبطه مع القليل من الماء، قبل إعطائه للطفل مع إضافة قليلة من سائل. حضر دائماً خليطاً طازجاً كالمطلوب.

للقرص خط شطر للتقسيم.

فترة العلاج:

تتعلق فترة العلاج بالحالة الصحية التي من أجلها أنت تتعالج بـ يوتيروكس. لذلك يناقش طبيبك بخصوص الفترة الزمنية التي تحتاجها لتناول هذا الدواء. أغلب المعالجين يجب أن يتناولوا يوتيروكس طوال حياتهم.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر من الجائز أن تشعر بأعراض كنبض سريع، قلق، عدم هدوء أو حركات غير إرادية. إختلاجات قد تظهر في حالات فردية لدى معالجين يعانون من إضطرابات عصبية كالصرع. قد تظهر أعراض لإضطرابات نفسية (ذهان) حادة وذلك لدى مرضى معرضون لخطورة حدوث إضطرابات ذهانية. راجع طبيبك إذا كنت تلاحظ أي عرض من بين الأعراض المذكورة هنا.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسييت تناول الدواء

لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية النسيية. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص كيفية استعمال الدواء، راجع طبيبك أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما هو الحال في كل دواء، فإن استعمال يوتيروكس قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهس من قامة الأعراض الجانبية، فمن الجائز ألا تعاني من أي منها.

من الجائز أن تشعر بعرض واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية المذكورة أدناه إذا كنت تتناول يوتيروكس أكثر مما وصف لك، أو إذا كانت الجرعة الدوائية التي حددت لك غير ملائمة (مثلاً إذا تمت زيادة الجرعة الدوائية بشكل سريع).

نبض سريع أو غير منتظم، ألم في الصدر، صداع، ضعف عضلي أو تقلص عضلي، تورد الوجه (شعور بسخونة وإحمرار في الوجه)، سخونة، تقيؤات، عدم إنتظام الدورة الشهرية، ورم دماغي كاذب (pseudotumor cerebri)، ضغط زائد داخل الجمجمة)، إرتجاف، عدم الراحة، إضطرابات في النوم، ترقق، إنخفاض في الوزن، إسهالات.

إذا كنت تلاحظ أي عرض جانبي من الأعراض التي ذكرت هنا، راجع طبيبك. من شأن طبيبك أن يقرر إيقاف العلاج لعدة أيام أو يقلل الجرعة الدوائية اليومية حتى إختفاء الأعراض الجانبية.

ردود فعل تحسسية لأي من مكونات يوتيروكس (أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية»)، ردود فعل تحسسية يمكن أن تشمل طفح، شرى وإنتفاخ الوجه أو الحنجرة (وذمة وعائية). فإذا حدث ذلك، راجع طبيبك حالاً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

تليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية. يجب حفظ الدواء في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء.
- لا يجوز رمي أدوية في مياه الصرف الصحي (المجاري) أو القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد إستعمالك بعد. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6 معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً - Lactose monohydrate, maize starch, gelatin, croscarmellose sodium, magnesium stearate.
- أقراص يوتيروكس تحتوي على لكتوز: كل قرص من يوتيروكس 50 مكغ يحتوي على 65.948 ملغ لكتوز كل قرص من يوتيروكس 100 مكغ يحتوي على 65.895 ملغ لكتوز أقراص يوتيروكس تحتوي على صوديوم: كل قرص من يوتيروكس 50 مكغ يحتوي على 19 مكغ صوديوم كل قرص من يوتيروكس 100 مكغ يحتوي على 21 مكغ صوديوم
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة - أقراص يوتيروكس 100، 50 ميكروغرام هي بيضاء اللون، دائرية الشكل، مسطحة من جانبيها، ذات حافة مائلة. وعلى السطح العلوي للقرص يوجد خط للشرط مع الكتابة EM 50 أو EM 100 حسب الترتيب. تحتوي كل عبوة على 30، 50 أو 100 قرص. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز وعنوانه: ميرك سيرونو م.ص، شارع هاكيشون 18، يافنه 81220
- إسم المنتج وعنوانه - ميرك KGaA، دارمشتات، ألمانيا
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: رقم سجل يوتيروكس 50 مكغ 147-50-33604-00 رقم سجل يوتيروكس 100 مكغ 147-51-33605-00
- تم إعدادها في آب 2020.
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.