

**Инструкция по применению
в соответствии с фармацевтическими
стандартами (препараты) 1986 г.**

Безрецептурный препарат

Ипадин 0.5%

Раствор

Активные ингредиенты и их концентрация:

хлоргексидин диглюконат (Chlorhexidine Digluconate) 0.5% w/v и изопропанол (Isopropanol) 70% v/v

Для списка неактивных и аллергенных ингредиентов в препарате см. пункт 6.

**Перед применением препарата
внимательно прочтите инструкцию
полностью.** Данный вкладыш содержит краткую
информацию о препарате. Если у вас имеются
дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или
к фармацевту. Вы должны использовать данный
препарат правильным образом. Если вам
необходима дополнительная информация,
проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен препарат?

Ипадин Форт 0.5% - это раствор,
предназначенный для применения в следующих
случаях:

- Дезинфекция кожи, в частности перед
проводением инвазивных процедур.
- Для дезинфекции пуповины у новорожденных.

Терапевтическая группа: Антисептические препараты.

2. Перед использованием препарата

Не используйте препарат в следующих случаях:

- Если у вас имеется чувствительность (аллергия)
к активным ингредиентам или к любому из
дополнительных ингредиентов, содержащихся в
препарата. Для ознакомления со списком
неактивных ингредиентов см. пункт 6
- **«Дополнительная информация».**
- Не используйте данный препарат на тканях
головного мозга, мозговых оболочках, среднем
узе или гениталиях.
- Не используйте на ранах на коже, потрескавшейся,
поврежденной коже или в качестве очищающего
средства для кожи.
- Использование данного препарата не
заменяет собой стерильные перчатки.

Особые предостережения относительно использования данного препарата:

- Если у вас имеется чувствительность к какому-либо
пищевому продукту или препарату, сообщите об этом
врачу перед применением препарата.
- В случаях, когда в области раны развивается отек или
рана сопровождается повышением температуры тела,
следует обратиться к врачу.
- Препарат следует применять по назначению.
Не предназначен для применения в области глаз.

Может нанести значительный и необратимый вред
глазам, если при контакте препарат не был немедленно
смыт. Не предназначен для применения в области рта.
Не глотать. Не предназначен для применения в ухе.
Может вызвать глухоту при попадании в среднее ухо в
случае наличия перфорации барабанной перепонки.
В любом из этих случаев следует немедленно промыть
холодной водой. • Младенцы до одного года могут быть
более чувствительны к препарату. Следует соблюдать
осторожность при применении препарата. • Избегайте
попадания препарата в глаза, уши и рот. В случае
контакта с этими областями, тщательно промойте
холодной водой. • Если продукт применяется в области
кожи головы, следует по возможности избегать нанесения
на волосы. Пропитанные продуктом волосы легко
воспламеняются, и их высыхание займет около часа.
• Следует избегать длительного контакта кожи с
препараторами, содержащими высокую концентрацию
спирта. При возникновении признаков раздражения,
применение препарата следует прекратить. См. раздел
4 - «Побочные явления».

Если вы принимаете или недавно принимали
другие препараты, включая безрецептурные
препараторы и пищевые добавки, сообщите об
этом врачу или фармацевту.

Беременность и грудное вскармливание:
нет противопоказаний к применению препарата при
беременности или кормлении грудью. Важная
информация о некоторых ингредиентах препарата:
• Препаратор содержит изопропанол (Isopropanol),
который также называют изопропиловым спиртом
(Isopropyl Alcohol).

3. Как применять лекарственный препарат

Не зажигайте сигарету и не подвергайте воздействию
огня до полного высыхания препарата.
Не предназначен для применения в области рта.
Не глотать. Только для внешнего применения.
Если вы не уверены в том, как следует применять
препаратор в какой дозировке, обращайтесь к
врачу или фармацевту. Смочите препаратором
стерильную марлевую салфетку и продезинфицируйте
желаемую область. После дезинфекции пупка следует
осушить участок стерильной марлевой салфеткой.
В случае передозировки или если препарат
случайно проглотят ребенок, немедленно
обратитесь в приемный покой больницы и
принесите с собой упаковку препарата.

Не высыпывайте рвоту без четкого указания врача!
Не принимайте лекарства в темноте!

Проверьте этикетку и дозу при каждом
применении препарата. Наденьте очки, если они
в них нуждаются.

Если у вас имеются дополнительные вопросы в
отношении применения препарата, обращайтесь к
врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления:

Как и любой другой лекарственное средство,
данний препаратор может вызывать у некоторых
людей побочные явления. Не пугайтесь, читая
список побочных явлений. Возможно, ни одно из
них у вас не проявится.

Побочные явления, которые требуют особого внимания:
• Аллергическая реакция или острая аллергическая
реакция, которая включает такие признаки, как

затрудненное дыхание, хрипы, шок, отек лица, кожный зуд,
раздражение и отек, сыпь или местное воспаление кожи
(редко); прекратите лечение и обратитесь к врачу.

**Побочные явления и лекарственные взаимодействия среди
детей и младенцев:** родители должны сообщать лечащему
врачу о любом побочном явлении и о любом
дополнительном препарате, который получает ребенок.

Если возникло побочное явление, одно из побочных
явлений ухудшается или если вы страдаете от побочных
явлений, не упомянутых в инструкции, просьба
проконсультироваться с врачом. О побочных явлениях
можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав
на ссылку «Сообщения о побочных явлениях
медицинского лечения». Ссылка приводится на
домашней странице Министерства здравоохранения
(www.health.gov.il) и перенаправляет вас к электронной
форме сообщения о побочных явлениях. Такие вы можете
протянуть по ссылке:https://sideeffects.health.gov.il/

5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие
лекарства необходимо хранить в закрытом месте и вне поля
зрения и досięгаемости детей и/или младенцев, во избежание
отравления. Не высыпывайте рвоту без четкого указания врача.
• Не используйте лекарство после истечения срока годности
(exp. date), указанного на упаковке / флааконе / коробке /
этикете. Срок годности относится к последнему дню
указанного месяца. Условия хранения: хранить при
температуре ниже 25°C в оригинальной упаковке для защиты
от света. После вскрытия флаакона можно использовать
препаратор в течение трех месяцев, но не позднее даты
истечения срока действия. Осторожно!

Легковоспламеняющийся материал. Храните вдали от огня.
Даже при соблюдении рекомендемых условий упаковки и
хранения, лекарства хранятся лишь в течение ограниченного
периода времени. Обращайте внимание на срок годности
препаратора! В случае сомнений проконсультируйтесь с
фармацевтом, выдавшим вам препарат. Не храните
различные лекарства в одной упаковке.

6. Дополнительная информация:

Помимо активного(ых) веществ(а), препарат содержит
также следующие неактивные ингредиенты: очищенная
вода, карбомизин (E122; азурин).

Как выглядят препарат и каково содержимое упаковки:
• Препаратор представляет собой прозрачную жидкость
розового цвета с характерным запахом алкоголя.
• Раствор находится в полутораэрном флааконе с
закручивающейся пробкой. В некоторых случаях флаакон
препаратора оснащен дозатором. Дозатор вкручивается вместо
пробки. • Не все упаковки доступны на рынке.

Размер упаковки: флаакон, содержащий 500 мл раствора.
Производитель и владелец патента: “
Бен-Шимон Флориш” Ltd., И.Л. 51126831, промышленный
парк Мисгав, полевая почта: 2017400.

Листок отредактирован 06/2021, в соответствии с
инструкцией Министерства Здравоохранения.

Номер регистрации фармацевтического препарата в
государственном реестре лекарств в Министерстве
здравоохранения: 166-25-36467-99

Для простоты и удобства чтения данная инструкция
сформулирована в мужском роде. Однако препарат
предназначен как для мужчин, так и для женщин.

