

سوربون 10 أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من سوربون 10 على:
بوسپيرون هیدروکلوريد 10 ملг.

Buspirone HCl 10 mg.

لقائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء".

اقرأ النشرة يتعين حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء لعلاج مردك. لا تعطيه للأخرين. فهو
قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.
هذا الدواء غير مخصص عادة لأطفال ولامراهقين
دون عمر 18 سنة.

يصبح بإعطاء هذه النشرة إلى شخص قريب إليك
لقراءتها.

1) لأى غرض مخصص الدواء؟ تأثيرات الدواء الطبية: علاج القلق لفترات زمنية قصيرة. الفصيلة العلاجية: مضادات القلق من فصيلة أزيپرون.

2) قبل إستعمال الدواء

- لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
 - كنت حساساً (الergicي) لبوسپيرون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
 - كنت مريضاً بالصرع.
 - كنت تعاني من أمراض شديدة في الكلى أو الكبد.
 - كنت في فترة الحمل أو مرضة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ سوربون 10، إحكام للطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد أو الكلى.
- كنت تعاني أو عانت في الماضي من التعلق بالأدوية.
- كنت تتناول علاجاً بأدوية من مجموعة البنزوديازيبينات (مثل نيتارازيبام أو تيمازيبام) أو بأدوية أخرى للهدوء وأو للنوم. يجب التوقف عن هذه الأدوية تدريجياً قبل الدخول بـ إستعمال سوربون 10.
- كنت تعاني من جلوكوما حادة ضخمة الزاوية.

الحمل والإرضاع
إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتدين بأنك حامل، أو خططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.
لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة. الدواء ثالثيات معروفة على ظهور الرضيع/ الجنين. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

الأطفال والمراهقون
هذا الدواء غير مخصص عادة لأطفال ولامراهقين دون عمر 18 سنة.

السيادة واستعمال الماكولات
قد يؤدي إستعمال هذا الدواء إلى التناسع أو الدوار ولذلك يجب توخي الحذر عندقيادة مرتكبة. عند تشغيل ماكولات خطرة وفي أي شاشات يتطلب اليقظة. تأكد من أن هذا الدواء لا يؤثر عليك وذلك قبل السيادة واستعمال الماكولات. إستشير الطبيب أو الصيدلي قبل السيادة أو إستعمال الماكولات إذا لم تكن واثقاً بخصوص ذلك.

معلومات هامة عن عدم مضاع مركبات الدواء
إذا كنت تعاني من عدم تحمل سكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول سوربون 10 لأن الدواء يحتوي على سكر يسمى لكتوز، الذي قد يسبب الحساسية للأشخاص الحساسين للكتوز.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستحضار من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقه العلاج بالمستحضر.

الأطفال والمراهقون - هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال ولامراهقين دون عمر 18 سنة.
إذا كنت تعاني من اضطرابات في وظيفة الكلى أو الكبد، فمن الجائز أن يقدر الطبيب إعطاء مقدار دوائي منخفض أكثر من أجلك.
يجب بلع الدواء مع الماء.

عند الحاجة يمكن شترط الفرض للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات حول سحق أو مضاع الفرض. حاول تناول الدواء في أوقات محددة من كل يوم.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك. أعراض فرط المقدار الدوائي تتشمل غثيان والشعور بوعكة، صداع، دوار، نعاس، طنين أو رنين في الأذنين، عدم القدرة على التفكير، مشاكل في الهضم، نبض بطيء، ضغط دم منخفض، اختلالات وأعراض خارج الهرمي (صعوبات في التنفس أو البلع، فقدان الوزن، ملامح وجه "جامدة"، جر القمدين، الشعور بتصلب في الأطراف، رجحان في اليدين أو في الأصابع).

● كانت تعاني من الوهن العضلي الوبيـل، مرض يتميز بضعف العضلات، صعوبة في المضـغ أو البلـع وتشوش في النطق.

التداخلات / التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية. إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالآخر إذا كنت تتناول:

- مثبطات موتوأمين أو أوكسيدارين (MAOI) مثل فينيلباربرين وترانيلسيبيرومين، التي تستعمل لعلاج الإكتئاب.
- نبتة الهيبيريكوم (St. John's wort) تفاصيل دون، حمض أميني ترازودون (العلاج الإكتئاب).
- مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) مثل فلاؤوكسيتين وباروكسيتين (العلاج الإكتئاب).
- مثبطات إعادة امتصاص نورايبينفررين وسيروتونين (SNRI) (مثلاً دولوكسيتين، فيلافاكيسين).
- مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة (مثلاً أميتريپتيلين وكوليبيرامين).
- هالوبيريدينول ولينتيوم (العلاج للأمراض النفسية).
- أدوية من مجموعة حجاجيات قنوات الكالسيوم، مثل ديلاتايزيم وفيراباميل (العلاج فرط ضغط الدم).
- ريفاميبيسين (العلاج السل).
- تريپيتان مثل سوماتريپيتان (العلاج الشقيقة).
- ترامادول (العلاج الآلام).
- باكلوفين (مرخي العضلات).
- لوفوكسيدين (اللظام).
- نابيلون (العلاج الغثيان والتقيؤات).
- أدوية مضادة لليسوستاتين (العلاج الحساسية).
- إريتريوميسين، إيتراكوتارول، لينزوليد (العلاج للتلوثات).
- أدوية من مجموعة البنزوديازيبينات (مثل نيتارازيبام أو تيمازيبام) أو بأدوية أخرى للهدوء وأللنوم.
- ديلاتايزيم (العلاج الذبحية الصدرية).
- ديجوكسين (العلاج قصور القلب).
- فينوتريباربيتال، فينوتريتين، كاربامازيبين (أدوية للصرع).
- سيميتيدين (العلاج قرحة المعدة).
- ديزاپرم (العلاج القلق).
- وارفارين (مضاد للتخثر).

استعمال الدواء والطعام

يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت خلال فترة العلاج بالدواء. يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام، لكن يجب إتباع نفس النهج والمواظبة على طريقة تناول الدواء التي تم اختيارها.

استعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب النبيذ أو مشروبات روحية خلال فترة العلاج بالدواء.

إذا

تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول مقداراً دوائياً حال تذكر ذلك؛ لكن إذا كان موعد تناول المقدار الدوائي التالي قريباً، فقم بتنقية المقدار الدوائي النفسي وتناول المقدار التالي في الموعد المعتاد. لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدارين دوائين معاً

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي حتى لو طرأ خلل في جهازك الصحي.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سوروبون 10 قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعانى أي منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب حال إذا كنت تقاسي:

• متلازمة السيروبروتينين: كانت تتناول مشطات إنتقافية لإغاثة امتصاص السيروبروتينين (SSRIs) وتعانى من أعراض متلازمة السيروبروتينين، التي تشمل إرثاك، عدم الراحة، عرق، إرتاجاف، تشعربرة، هلوسة (رؤياً أشياء أو سماع أصوات غير موجودة)، تقلصات عضلية مفاجئة أو نبض سريع.

• رد فعل تحسسي: حكة، صعوبات في التنفس أو إلتفاف الوجه، الشفتين، الحنجرة أو اللسان، ردود فعل تحسسية التي تؤدي إلى حكة وإنفاس الجلد.

• هلوسة وذهان.

• اختلالات أو تشنجات.

• رؤية محدودة.

• إغماء أو فقدان الوعي.

الأعراض الجانبية الموصوفة أعلاه نادرة جداً (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 معالجين).

أعراض جانبية شائعة جداً (من شأنها أن تؤثر على أكثر من مرتين واحد من بين 10 معالجين):

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على مرتين واحد من بين 10 معالجين):
عصبية، أرق، صعوبات في الترکيز، إرثاك،
اضطرابات في النوم، غبف، إفاغ، الشعور بوخز
أو نخر، تشوش الرؤية، مشاكل في التنسيق، إرتاجاف،
رنين أو تشنن في الأذنين، تسارع النبض، ألم في الم cedar،
احقان في الأنف، ألم في الحنجرة، غثيان والشعور
بوحكة، ألم في البطن، إمساك، جفاف في الفم، اسهال،
تعرق بارد، مفعح، ألم في العضلات، الأوتار، الأربطة
والعظام، إرهاق نفسي ومسدي.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 معالج):
كمات، طفح جلدي حار ناجم عن رد فعل حساسي -
حيويصلات بازرة غير متناسبة شاحبة أو حمراء تترافق
بحكة حادة (شرى).

أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 معالج):
الشعور بأن الوعي مفصل عن الجسم، عدم إستقرار
عاطفي، ظهور أعراض مفاجئة لمرض، أعراض حارج
الهرمي [إرتاجاف، صعوبات في النطق، عدم القدرة
على الوقوف]، جفاف في الم cedar، غثيان أو تساقط كافة أحشاء العلب.
أعراض سوروبون 10 دائرة، بيباء، مهدبة من
كل الجانبيين، ذات خط للشطرن من جانب واحد.

يمتني المستحضر على لكتور
يحتوى كل قرص من سوروبون 10 على 111.4 ملغ
لكتور.

اسم المنتج وعنوانه: يونيفارم.م.ض، پارك الصناعة
"مافو كرمل".

اسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم.م.ض، ص.ب.
6.6121301، تل - أبيب 21429.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في
وزارة الصحة:
100 07 27954 01

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة
بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص
لكل الجنسين.

تم إعادتها في تموز 2021 بموجب تعليمات وزارة
الصحة.

التبلية عن أعراض جانبية
بالمكان التالى عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة
الطبقة على الرابط "تبلية عن أعراض جانبية عقب علاج
دوائى" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة
الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى
النموذج المباشر للتبلية عن أمراض جانبية.
بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ض".