

الدورات الشهرية، أنيزفة بين الدورات الشهرية وغياب دورات شهرية أو تأخيرها).
أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 مستعمل).

طفح جلدي يمكن أن يشكّل حوصلات، ويبدو وكأنه أهداف صغيرة (بقع داكنة في المركز) محاطة بمحفظة أكثر شعوباً، مع حلقة داكنة حول المعاواف) تسمى حمامي متعددة الأشكال؛ إنتشار طفح جلدي مع حوصلات وتشقّر في الجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة سفينغوسون)؛ طفح جلدي شديد مع ظهور حوصلات وتشقّر الجلد على مساحات واسعة من الجلد (متلازمة السنجي الشعري النسائي)؛ مشكل في الكبد التي تسبّب إصفرار الجلد أو إفرازات بيضاء العينين؛ متلازمة الإفراز غير اللامع للتهور مع اضطراب الميادين الدبراء (SIADH) وهي حالة تطور فيها الجسم ماء زائد وإنخفاضاً في الترطيب أو احتقان في الرئتين (المالح) نتيجة إشارات كيميائية غير سليمة، قد يعرض المتعالجين مع الماء (الماء) كمل خليري أو لا يظهر لهم ارتفاع على الجسم، إحتباس السوائل أو احتقان في الرئتين (SIADH)، مما قد يسبب احتقان في الرئتين أو الرجدين)؛ حساسية لمنفذ الشهيء؛ إنضاج ملأم القصبي لا يزول؛ إختصاص عدد المصفّحات الدموية.

أعراض جانبية شوّهتها غير معروفة (لا يمكن تقدّير الشيوخ من المعطيات المتوفّرة)؛

إنتفاخ الأمعاء (الذي تسبّب الإسهال)؛ تكزّر الأستان. قاسي بعض المتعالجين فيها صرير، حنفي أو ضجة دائمة أخرى في الأنفين (حنفي الـ10) عندما تناولوا ياكست.

لوحظ زيادة خطورة الإصابة بكسر في العظام لدى المتعالجين الذين تناولوا لدوك، فوجّهوا إلى الطوارئ.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت أحدي الأعراض الجانبية أو عندما تفاقم من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التالي عن أعراض جانبية بالذيل عن التالية عن العرض (يونفارم م.ض.)

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تحجب النساء يحبّظن هذه الدواء وكل دواء آخر في مكان ملحق بعيداً عن متطلبات التخزين، مثل: ملحوظة الأطفال والآباء، والرغبة وذلك لتقدير اصحابهم بالتنفس.

لا تسبّب التقيّيود تخلّيات الجسم صرحة من الطبيب! لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر الصنفية يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين درجة حرارة دون 20 درجة مئوية وفي مكان محظى من الضوء.

لا يجوز أخذ الدوارة في الماء أو في مقام الماء، واستشر الطبيب حول كيفية التخلص من الدوارة لم تدع قيد الاستعمال بعد، إن اتخاذ هذه الخطوات يساعد في الحفاظ على جودة الدويبة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Dicalcium phosphate dihydrate, Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Magnesium stearate, Opadry coating.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

يأكلست مصنوع من لوحيات (ليست) داخل علبة كرتون، في كل علبة يوجد 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 أو 50 قرصاً، من الجائز أن تستهلك كافة أدوام العلبة.

أعراض ياكست 20 هي مطالية، مستabilizer، حميدة من كل الجنين مع خط الشطر من جانب واحد، لون بيج وردي.

أعراض ياكست 30 هي مطالية، مستabilizer، حميدة من كل الجنين مع خط الشطر من جانب واحد، لون بيج شاحب.

اسم صاحب الإمتياز وعوانه: يونفارم م.ض.، ص.ب. 2929، تل أبيب، 6121301.

اسم المنتج وعوانه: يونفارم م.ض.، بارك الصناعية "ماقو كرم".

رقم سجل الدواء في مجلس الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 117 10 29855 02، ياكست 20 143 53 29943 02.

من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تمت سياسة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في حزيران 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

يجب تناولها في الدورة الشهرية.

إذا توفّرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ياكست قد يسبّب أمراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندفع من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز أن تختفي أي منها.

من المرجح أكثر حدوث الأعراض الجانبية في الأيام الأولى لتناول ياكست.

توجه إلى الطبيب إذا قاسّيت أي من الأعراض الجانبية التالية أثناء العلاج من الجائز أن تؤثّر على طبلبك أو انتفاحها على القبور، أو انتفاحها على القبور.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 مستعمل)؛ إذا وجد لديك كدمات أو انتفاح شاذة، بما في ذلك تقوّق دم أو دم في البراز، فوجّه إلى طبلبك أو اذهب إلى غرفة الطوارئ.

إذا لاحظت أنك غير قادر على النبُول، توجه إلى طبلبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 مستعمل)؛ إذا كنت تقاضي من اختلالات (نوبات)، توجه إلى طبلبك أو اذهب إلى إلى الماء (قد يسبّب احتقان عدد المصفّحات الدموية).

إذا كنت تقاضي من إختلالات (نوبات)، توجه إلى طبلبك أو اذهب إلى إلى الماء (قد يسبّب احتقان عدد المصفّحات الدموية).

إذا كنت تشعر بعدم راحة وتشعر بعدم القدرة على الجلوس أو الوقوف بهدوء، فمن الجائز أن تكون لديك ظاهرة سميّة تغدر الجلوس (akathisia).

قد تؤدي زيادة المقدار الدوائي إلى ياكست لديك إلى تفاقم هذه المشاعر. إذا شعرت مكتّتاً، توجه إلى طبلبك.

إذا شعرت قطّعاً بالتبّغ، الصعف أو الإرثاك ولدوك، تصلّب أو قلة تناسق في العضلات، فمن الجائز أن تكون ذلك ناتجاً عن انتفاح سبّة الصوديوم في الدم لديك. إذا قاسّيت أي من هذه الأعراض، فوجّه إلى طبلبك.

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 مستعمل)؛ إذا وجد لديك طفح جلدي آخر مع درنات، انتفاح في الجفنين، في الوجه، في العين، في الشفتيّن، أو في اللسان، بادات بالحكة أو تجد صعوبة في التنفس (شفيق في التنفس) أو في البالغ، وتكتّن، ياضف، أو دم الدوار مما يسبّب في اهتزاز أو فقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور.

إذا وجدت لديك دليل على جزء من جسمه غير مطابق للدماء الدوائية (مثل: اللذاب، الشعور بعدم القدرة على التبول، انتفاح، ارتجاف، ارتجاف، تشنجات، تشنجات مفاجئة في العضلات، إلخ) طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

أعراض جانبية شوّهتها غير معروفة (لا يمكن تقدّير الشيوخ من المعطيات المتوفّرة)؛ إذا لم يجد الأشخاص أشكار لإذيهن أنفسهم أو الإختار أثناء تناول ياكست.

إذا لم يجد الأشخاص أشكار لإذيهن أنفسهم أو الإختار أثناء تناول ياكست أو ما يزيد عن تناول ياكست، قد تمسّر لفترة أطول.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، أو نبض سريعة، إذا شعرت مكتّتاً، توجه إلى طبلبك.

جذب حكمها حادة.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

أعراض جانبية إضافية (قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 مستعمل)؛ إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

يرشّد الطبيب إلى متى يجب أن تستمر في تناول الأقراص، قد يستغرق الأمر عدة أشهر وربما أطول من ذلك.

الأشخاص الكبار المقدار الدوائي للأطعمة للأشخاص فوق عمر 65 سنة هو 40 ملغم في اليوم.

متعالجون يبلغون من مرضاً مركب في الكبد أو الكلى، إنما الجائز أن يقرر طبلبك أنه يجب عليه إداً وجد لديه مقدار دوائي أقل من المعتاد من ياكست، إذا كان لديك مرض شديد في الكبد أو الكلى، فإن المقدار الدوائي للأطعمة للأطعمة هو 20 ملغم في اليوم.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من المقدار الموصى به طبلبك، إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ.

إذا لاحظت أنك غير قادر على النبُول، توجه إلى طبلبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور.

أعراض جانبية على الفور (قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 مستعمل)؛ إذا تناولت دوائك في نفس الوقت كل يوم، إذا نسيت تناول جرعة دوائية، وتندرت قبل الخلو إلى النوم، فتناولها على الفور.

الكماتان في اليوم التالي، فقم بتقويم الجرعة الدوائية إذا تذكرت فقط أثناء الليل، أو في اليوم التالي، فقم بتقويم الجرعة الدوائية إذا تذكرت في اليوم التالي، أو في اليوم الثاني، فقم بتقويم الجرعة الدوائية إذا تذكرت فقط في اليوم الثاني، أو في اليوم الثالث، أو في اليوم الرابع، فقم بتقويم الجرعة الدوائية إذا تذكرت في اليوم الرابع، فقم بتقويم الجرعة الدوائية إذا تذكرت في اليوم الخامس.

إذا تناول جرعة دوائية مفقرة في المقدار الدوائي في الوقت المحدد، لا تناول جرعة دوائية مفقرة من ياكست، إنما تناول جرعة دوائية مفقرة من المقدار الموصى.

ماذا تفعل إذا لم يحسن شعوره؟ لا ينفع بالطبع، إنما تفعل إذا لم يحسن شعوره فورياً - كل مضادات الاكتئاب تحتاج

لكل بالنسبة للأطعمة الأخرى قد يسفر عن انتفاح قليل، يشعر بعض الأشخاص بالشعور بالتشنج بعد أسبوعين، فأرجح إلى طبلبك للحصول على استشارة، يطلب طبلبك مقابلتك مرة أخرى بعد أسبوعين من بدء العلاج لأول مرة، إنك لطيف.

إذا تناولت دوائك في نفس الوقت كل يوم، لا ينفع بالطبع، إنما تفعل إذا لم يحسن شعوره فورياً - كل مضادات الاكتئاب بطيئاً في التغير بعد تناولها.

لا يجوز التوقف عن العلاج بسبب توصية الطبيب، على حسابه دون استشارة الطبيب حتى ولو طرأ حسن على حالتك الصحية.

عندما توقف عن تناول ياكست، سيساعدك طبلبك على خفض المقدار الدوائي الذي تدخله جسمك، الشعور بعدم القدرة على الصبيحة أو الإرثاك، الشعور بالإرثاك، الشعور بالحرارة، العرق، ارتجاف، ارتجاف، تشنجات، تشنجات مفاجئة في العضلات أو انتفاح، أو نبض سريعة، إذا شعرت مكتّتاً، توجه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

أعراض جانبية شوّهتها غير معروفة (لا يمكن تقدّير الشيوخ من المعطيات المتوفّرة)؛ إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شاهدت أو أصوات غريبة، شعور بفقدان الوعي، فوجّه إلى طبلبك.

يرشّد الطبيب إلى متى يجب أن تستمر في تناول الأقراص، قد يستغرق الأمر

عدة أشهر وربما أطول من ذلك.

الأشخاص الكبار المقدار الدوائي للأطعمة للأطعمة فوق عمر 65 سنة هو 40 ملغم في اليوم.

متعالجون يبلغون من مرضاً مركب في الكبد أو الكلى، إنما الجائز أن يقرر طبلبك أنه يجب عليه

إداً وجد لديه مقدار دوائي أقل من المعتاد من ياكست، إذا كان لديك مرض شديد في الكبد أو الكلى، فإن المقدار الدوائي للأطعمة للأطعمة هو 20 ملغم في اليوم.

إذا تناولت أبداً ياكست، إنما تناولت مقداراً دوائياً أكبر من المقدار الموصى به طبلبك، إذا تناولت مقداراً دوائياً

مفرباً أو إذا بلغ بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ.

إذا لاحظت أنك غير قادر على النبُول، توجه إلى طبلبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور.

إذا شعرت مكتّتاً، توجه إلى طبلبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.

إذا شعرت بألم في عنقين وتطور لديك تشوش رؤية، فوجّه إلى طبلبك.