

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

اسم المستحضر، شكله والعيار

موتيليوم™ 10 ملغ أقراص

يحتوي كل قرص على 10 ملغ دوميپريدون.

Domperidone 10 mg

المواد غير الفعالة وموادات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك/من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك/حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستخدم موتيليوم لعلاج الغثيان والتقيؤات لدى الكبار والمرأهقين الذين تجاوزوا عمر 12 سنة والذين يزنون أكثر من 35 كغم.

الفصيلة العلاجية: حاجب مستقبل دوامين.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت مسasa (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية»).
- كنت تعاني من نزف في البطن أو إذا كنت تعاني بشكل دائم من ال الشد في البطن أو من براز أسود بشكل ثابت.
- كنت تعاني من إننساد أو ثقب في الأمعاء.
- كنت تعاني من ورم في الغدة النخامية (prolactinoma).
- كنت تعاني من مرض كبدى متوسط حتى شديد.
- وجد لديك تحطيم كهربائي للقلب الذي يدل على مشكلة في القلب المسماة «إطالة مقطعة QT».
- وجد لديك الآن أو كانت لديك مشكلة حيث فيها ليس بمقدور القلب ضخ الدم حول جسمك كما يجب (حالة سمية قصور قلبى).
- وجدت لديك مشكلة التي تؤدى إلى انخفاض نسبة الپروتاسيوم أو المغنتسيوم، أو لارتفاع في نسبة الپروتاسيوم في الدم.
- كنت تتناول أدوية معينة (انظر أدناه الفقرة «التداللات / التفاعلات بين الأدوية»).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بموتيليوم، إحدى الطبيبين إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في الكبد (مشاكل في الأداء الوظيفي للكبد أو فشل كبدى) (انظر «لا يجوز استعمال الدواء إذا»).

كنت تعاني من مشاكل في الكلى (مشاكل في الأداء الوظيفي للكلى أو فشل كلوى)، من الموصى به أن تستشير الطبيب في حالة الإستعمال المطول نظراً لأنه من الجائز أن تتحسن جرعة دوائية أقل أو تناول الدواء بوتيرة منخفضة أكثر. كذلك من الجائز أن يرغب الطبيب في فحصك بشكل دائم.

قد تكون دوميپريدون علاقة في زيادة الخطورة لحدوث اضطرابات في نظم القلب ولiskeة قلبية. هذه الخطورة الزائدة قد يتعرض لها مرضى يعمر 60 سنة وما فوق ومرضى يتناولون جرعة دوائية أعلى من 30 ملغ لليوم. تزداد الخطورة أيضاً عند إعطاء دوميپريدون سوية مع أدوية معينة. بلغ الطبيب إذا كنت تتناول أدوية لعلاج التلوثات (ال滂اثات الفطرية أو التلوثات الجرثومية) و/أو إذا كانت لديك مشاكل في القلب أو إيدز (HIV) (انظر أدناه الفقرة «التداللات / التفاعلات بين الأدوية»).

يجب استعمال الجرعة الدوائية الناجحة الأخذ من موتيليوم. اتصل بالطبيب في حال قياسك أثناء العلاج بـ موتيليوم من اضطرابات في نظم القلب، مثل ضربات قلب، صعوبات في التنفس، فقدان الوعي. يجب التوقف عن العلاج بـ موتيليوم.

المرأهقون الذين يزنون أقل من 35 كغم والأطفال لا يجوز إعطاء موتيليوم لمراهقين بعمر 12 سنة وما فوق، الذين يزنون أقل من 35 كغم، أو لاطفال دون عمر 12 سنة.

التداللات / التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى الطبيبين أو الصيدلي عن ذلك، بالأسف إذا كنت تتناول:

- لا تتناول موتيليوم في حال كنت تتناول أدوية لعلاج التلوثات الفطرية مثل بنتاميدين أو أزولات مضادة للطفريات، خاصة إيتراكونازول، كيتوكونازول المعطى عن طريق الفم، فلوكونازول، بوساكونازول أو فوروكونازول.
- التلوثات الجرثومية، خاصة اريتروميسيين، كلارتيروميسيين، تيليتروميسيين، ليقوفلوكاسين، موكيسلوكاسين، سپيراميسيين (ذلك هي مضادات حيوية)
- مشاكل في القلب أو ضغط دم مرتفع (مثلًا: أميدارون، درونيدارون، إيبوتيليد، ديزوپریدام، دوفيتيليد، سوتالول، هيدروكوبيندين، كيندين)
- الذئاب (مثلًا: هالوبيريدول، بيموزيد، سيرتندول)
- الإكتنات (مثلًا: ستيالوبرام، استيتالبورام)
- مشاكل الجهاز الهضمي والأمعاء (مثلًا: سيزاپريد، دولاسترون، پروکالپرید)
- الحساسية (مثلًا: ميكباتازين، ميزولاستين)
- الملاراريا (خاصة هالوفانترين، لوسيفانترين)
- الإيدز / HIV مثل ريتونافير أو ساكوبينافير (مثبطات بروتياز)
- إلتهاب الكبد C (مثلًا: تيلابيريفير)
- السرطان (مثلًا: توريميفين، فانديتاتيب، فينكامين)

لا تتناول موتيليوم إذا كنت تتناول أدوية معينة أخرى (مثلًا: بيبيريديل، ديفيمايل، ميتادون).

قل للطبيب إذا كنت تتناول أدوية لعلاج التلوثات، مشاكل في القلب، إيدز / HIV أو مرض الپاركينسون.

قبل استعمال موتيليوم وأپومورفين، يتأكد طبيبك من أنك قادر على تحمل ذين الواءين عند إعطائهما في نفس الوقت. أطلب من الطبيب أو من الأخصائي استشارة تتم ملاءمتها شخصياً. الرجاء توجه أيضاً لنشرة أپومورفين.

استعمال الدواء والطعام

تناول موتيليوم قبل وجة الطعام، نظراً لأن التناول بعد الطعام، يؤخر قليلاً من امتصاص الدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

ليس معروفاً فيما إذا كان استعمال موتيليوم أثناء فترة الحمل يسبب

الضرر. إذا كنت في فترة الحمل أو تظنين بأنك حامل، بلغي طبيبك، الذي يقرر فيما إذا يمكنك تناول موتيليوم.

عُذر علىكم قليلة من دوميپريدون في حلبي الأم. يمكن أن يسبب موتيليوم أعراضًا جانبية غير مرغوبة التي تؤثر على قلب الطفل الرضيع.

لا يجوز استعمال موتيليوم أثناء فترة الرضاعة، إلا إذا أعتبر الطبيب أن الاستعمال ضروري، إشتريه الطبيب قبل تناول الدواء.

السيادة وإستعمال الماكنتات

بلغ عدد من المرضى عن شعور بدوار ونعاس بعد تناول موتيليوم، لا تقم بالسيادة ولا تنتقل مراكبات خلال فترة تناول موتيليوم، إلى أن تكون مدراكية تاثير موتيليوم عليك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز (نوع من السكر).

يحتوي كل قرص على 54.2 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنه كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، فإتصل بطبيبك قبل استعمال الدواء.

يحتوي كل قرص على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) للقدر الذي يتعذر إيقافه.

3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستี่صالج من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب دائماً تناول موتيليوم قبل وجة الطعام لأنه في حال قمت بتناوله بعد وجة الطعام، فإن امتصاص الدواء سيتأخر قليلاً.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

فترقة العلاج:

عادة تختفي الأعراض بعد مرور 3-4 أيام من تناول الدواء. لا تتناول

موتيليوم لأكثر من 7 أيام بدون استشارة الطبيب.

يجب بلع الأقراص مع القليل من الماء أو سائل آخر. الأقراص مطلية من أجل حجب مذاقها، لذا لا يجوز مضغ، سحق أو شطر الأقراص.

أعراض جانبية ذات شيوخ غير معروفة (أعراض شيووها لم يحدد بعد):

حركة للعين باتجاه الأعلى
توقف الدورة الشهرية لدى النساء
تضخم الثديين لدى الرجال
قلة القدرة على التبول
تغير في نتائج فحوص مخبرية معينة
متلازمة تململ الساقين (Restless legs syndrome) (الشعور بعدم راحة، مع دافع يصعب مقاومته لتحريك الرجلين وأحياناً الذراعين وأعضاء أخرى من الجسم)
عد من المرضى الذين تناولوا موتيلىوم لحالات وجرعات دوائية التي تتطلب إشرافاً طبياً قاسوا من الأعراض الجانبية التالية:
عدم الراحة، تضخم أو إنفاس الثديين، إفراز غير اعتيادي من الثديين، دوره شهرية غير منتظمة لدى النساء، مشاكل في الإرتفاع، اكتئاب، حساسية مفرطة.
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التمودج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

٥ كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال ورؤية الأطفال / أو الرضع، وذلك تفادياً لإصابتهم بالتسم، لا تنسَ التقيّد بدور تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين ما بين 15 إلى 30 درجة مئوية.

٦ معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch, microcrystalline cellulose, pregelatinized potato starch, hypromellose 2910 5mPas, polyvidone K90, magnesium stearate, hydrogenated cottonseed oil, sodium lauryl sulphate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص مدور مطلي، مقرن من كل الجانبي، أبيض حتى كريم شاحب. مطبوع على جانب واحد من القرص العلامة "M10" والكتابة "Janssen" في الجانب الثاني.

تحتوي كل علىه على 30 قرصاً.

المستورد وصاحب الامتياز وعنوانه: جيبي-سي هيلث كير م.ض، كيبوتس شفافيم 6099000، إسرائيل.

تم إعدادها في 02.2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 0130324314

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

فرط الجرعة الدوائية

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر مما ينبغي من موتيلىوم، فاتصل بالطبيب بشكل فوري. في حال تناول جرعة دوائية مفرطة، فمن الجائز أن تحتاج إلى علاج الأعراض. من الجائز أن تحتاج إلى متابعة للتخطيط الكهربائي للقلب جراء إحتمالية وجود مشكلة في القلب المسماة إطالة مقطع QT.

إذا نسيت تناول الدواء، تناوله حال تذكر بذلك. إذا تذكرت ذلك قريباً جداً من موعد تناول الجرعة الدوائية التالية، فلا تتناول الجرعة الدوائية المنسية. انتظر حتى يلوغ موعد تناولها وتناول فقط الجرعة الدوائية التالية. بعد ذلك استمر كما هو معتاد.

لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو المصيلي.

٤ الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال موتيلىوم قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أياً منها.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• حرّكات لا إرادية في الوجه، الذراعين والرجلين، رجفان زائد، تصلب رائد في العضلات أو تقلصات عضلية.

أعراض جانبية ذات شيوخ غير معروفة (أعراض شيووها لم يحدد بعد):

• اختلالات.

• نوع رد فعل الذي قد يحدث حالاً بعد التناول ويمكن تشخيصه من خلال ظهور حفيف في الجلد، حكة، ضيق في التنفس و/أو انتفاخ في الوجه.

• رد فعل تحسيسي مفرط شديد الذي قد يحدث حالاً بعد تناول الدواء وينتشر بشري (مرض جلدي)، حكة، تورّد، إفماء وصعوبات في التنفس كجزء من أعراض ممكنة إضافية.

• مشاكل في الجهاز القلبي الوعائي: تلُغ عن مشاكل في نظم القلب (نظم قلب سريع أو غير منتظم). إذا حدث هذا الأمر، عليك التوقف عن العلاج بشكل فوري. قد تكون لدى مصريين علاقة في زيادة الخطورة لحدث مشاكل في نظم القلب وسكنة قلبية. إحتمالية الزيادة في الخطورة قد تكون أكبر لدى من هم بعمر 60 سنة وما فوق أو لدى من يتناولون جرعات دوائية أكبر من 30 مل لليوم. يجب إستعمال الجرعة الدوائية الناجحة الأخفض من دومپيريدون.

توقف عن العلاج بموتيلىوم واتصل بالطبيب بشكل فوري إذا قاسيت من إحدى الأعراض الجانبية الموسومة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية تم الإبلاغ عنها عند إستعمال موتيلىوم مذكورة أدناه:

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• جفاف في الفم

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• قلق

• قلة الهدوء

• عصبية

• فقدان الإهتمام بالجنس أو إنخفاض الإهتمام به

• صداع

• الميل إلى النوم

• إسهال

• طفح

• حكة

• شرى (مرض جلدي)

• ألم أو حساسية في الثديين

• إفراز حليب من الثديين

• الشعور بضعف عام

• الشعور بدوار