

أتوميك 18، 25، 40، 60، 80، 100 أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي من أتوميك 18 على:

أتوموكستين (ك هيدروكلوريد) 18 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من أتوميك 25 على:

أتوموكستين (ك هيدروكلوريد) 25 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من أتوميك 40 على:

أتوموكستين (ك هيدروكلوريد) 40 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من أتوميك 60 على:

أتوموكستين (ك هيدروكلوريد) 60 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من أتوميك 80 على:

أتوموكستين (ك هيدروكلوريد) 80 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من أتوميك 100 على:

أتوموكستين (ك هيدروكلوريد) 100 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6: "معلومات إضافية" والفقرة 2: "قيل استعمال الدواء".

تفاصيل مهمة يجب عليك أن تعرفها بخصوص أتوميك

أظهرت الأبحاث السريرية التي أجريت على أتوميك ارتفاعا في شيوخ الأفكار الإبحارية ومحاولات الإنتحار لدى الأطفال والمراهقين. يجب إبلاغ الطبيب إذا كان طفلك (أو في حال وجود سابقة عالية):

1. يعاني من اضطراب ثنائي القطب.
2. يعاني من أفكار إنتحارية أو محاولات الإنتحار قبل بدء العلاج ب أتوميك.
إن خطورة ظهور أفكار إنتحارية أو محاولات الإنتحار تكون أكبر في بداية العلاج وعند تغيير المقدار الدوائي.

يعد العلاج ب أتوميك يجب مراقبة مزاج وسلوك طفلك بعناية. في حال ظهور واحد من الأعراض التالية، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب؛ قلق، عصبية، نوبة هلع، اضطرابات في النوم، فرط إفعال، عدائية، عدوانية، عدم التحكم بالدواغ، إندعام الراحة، هوس، إكتئاب، أفكار إنتحارية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك/لدى طفلك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

أتوميك مخصص للأطفال فوق عمر 6 سنوات، للمراهقين وللكبار.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟
أتوميك مخصص لعلاج اضطراب الإصغاء والتركيز وفرط النشاط (ADHD) لدى أطفال فوق عمر 6 سنوات. لدى المراهقين والكبار، يجب استعمال أتوميك كجزء من برنامج علاجي شامل الذي من شأنه أن يشمل إستشارة أو علاجات أخرى.

الفصيلة العلاجية: محفز للجملعة العصبية الودية للجهاز العصبي المركزي (centrally acting sympathomimetics).

يستخدم أتوميك لدى الكبار لعلاج اضطرابات الإصغاء، التركيز وفرط النشاط عندما تكون الأعراض مزجة وتؤثر على العمل وعلى حياتك الإجتماعية، وحين عانيت من أعراض المرض عندما كنت طفلا.

كيف يعمل الدواء أتوميك
يزيد أتوميك كمية النورأدرينالين في الدماغ. نورأدرينالين عبارة عن مادة كيميائية يتم إنتاجها بشكل طبيعي، وهي تزيد الإصغاء وتقلل الإندفاعية وفرط النشاط لدى المتعالجين الذين يعانون من اضطرابات في الإصغاء، التركيز وفرط النشاط. وصف هذا الدواء من أجل المساعدة في التحكم بأعراض اضطرابات الإصغاء، التركيز وفرط النشاط. هذا الدواء ليس منبهيا وبالتالي فإنه لا يؤدي إلى الإدمان. من الجائز أن تنفضي عدة أسابيع من بداية تناول الدواء وحتى حصول تحسن كامل في الأعراض.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز إستعمال أتوميك إذا كنت أنت أو طفلك:

- حساسا (الرجي) ل أتوموكستين، أو لكل واحد من المركبات التي يحتويها الدواء (المذكورة في الفقرة 6).

- تناولت خلال الأسبوعين الأخيرين دواء الذي يُعرف بأنه مثبط لـ مونوأمين أوكسيداز (MAOI)، مثل فينيلزين. تستعمل مثبطات مونوأمين أوكسيداز أحيانا لعلاج الإكتئاب واضطرابات نفسية أخرى. إن تناول أتوميك سوية مع مثبطات مونوأمين أوكسيداز قد يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة

أو قد تشكل خطرا على الحياة. بالإضافة لذلك، يجب الإنتظار 14 يوما على الأقل من لحظة التوقف عن تناول أتوميك وحتى البدء بتناول مثبط مونوأمين أوكسيداز.

- تعاني من مرض في العينين يُسمى جلوكوما ضيقة الزاوية (ارتفاع الضغط داخل العين).

- تعاني من مشاكل خطيرة في القلب التي قد تتأثر من ارتفاع في نظم القلب و/أو ضغط الدم، لأن هذه قد تكون أعراضا جانبية لـ أتوميك.

- تعاني من مشاكل خطيرة في الاوعية الدموية في الدماغ مثل: سكتة، إنتفاخ وضعف جزء من الاوعية الدموية (أم الدم) أو تضيق أو إنسداد الاوعية الدموية.

- تعاني من ورم في الغدة الكظرية (pheochromocytoma).
لا يجوز تناول أتوميك إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن أنت، وثاقا، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل تناول أتوميك. وذلك لأن أتوميك قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

يتوجب على الأطفال وكذلك على الكبار أن يكونوا متنبهين للتحذيرات ووسائل الحذر التالية:

قبل إستعمال أتوميك أخبر طبيبك إذا:

- وجدت لديك أفكار حول الإنتحار أو كانت لديك محاولات للإنتحار.
- كنت تعاني من مشاكل في القلب (بما في ذلك تشوهات قلبية) أو تسارع ضربات القلب، يمكن أن يزيد أتوميك من نظم القلب (النض). بلغ عن حدوث موت مفاجئ لدى مرضى لديهم تشوهات في القلب.

- كنت تعاني من تغيرات مفاجئة في ضغط الدم أو بنظم القلب.
- وجد لديك ضغط دم مرتفع. قد يرفع أتوميك من ضغط الدم.
- وجد لديك ضغط دم منخفض. قد يؤدي أتوميك إلى دوام أو إلى إغماء لدى أشخاص يعانون من إنخفاض ضغط الدم.

- كنت تعاني من تغيرات مفاجئة في ضغط الدم أو بنظم القلب.
- لديك مرض في القلب والأوعية الدموية أو سابقة طبية لحدوث سكتة.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد. من الجائز أن تحتاج إلى تناول مقدار دوائي أكثر إنخفاضا.

- لديك أعراض ذهانية تشمل الهلوسة (سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة)، الاعتقاد بأشياء غير صحيحة أو الشك.

- كنت تعاني من هوس (الشعور بمعنويات عالية أو فرط إفعال الذي يؤدي إلى سلوك شاذ) وعدم هدوء.

- تشعر بعدوانية.
- لديك مشاعر من الغضب والعدائية.

- لديك سابقة لصرع أو عانيت من نوبات لأي سبب كان. قد يؤدي أتوميك إلى ارتفاع وتيرة النوبات.

- وجدت مشاعر من المزاج أو كنت تشعر باشاء جداً.
- كنت تعاني من تشنجات متكررة، خارجة عن السيطرة في كل جزء من الجسم أو تكرر أصوات وكلمات.

قبل بدء العلاج، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. وذلك لأن أتوميك قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. سيقوم الطبيب بمعالجة كيفية تأثير الدواء عليك.

الفحوص التي سيجريها الطبيب قبل بدء تناول أتوميك
هذه الفحوص مخصصة لفحص فيما إذا كان أتوميك هو الدواء المناسب لك. سيقوم الطبيب بقياس:

- ضغط الدم ونظم القلب (النض) قبل وخلال تناول أتوميك.
- الطول والوزن خلال تناول أتوميك، إذا كنت طفلا أو مراهقا.
يتحدث طبيبك معك عن:

- أدوية إضافية أنت تتناولها.
- سابقة عائلية لموت مفاجئ وغير مشخص.
- مشاكل طبية إضافية (مثل مشاكل في القلب) موجودة لديك أو لدى عائلتك.

من الضروري أن تزود الطبيب بأكثر قدر ممكن من المعلومات. فهذا سيساعد الطبيب في إختيار القرار فيما إذا كان أتوميك هو الدواء المناسب لك. قد يقرر الطبيب بأن هناك حاجة لفحوصات طبية إضافية قبل البدء بتناول الدواء.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحتك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يقرر الطبيب فيما إذا كان بإمكانك تناول أتوميك مع الأدوية الأخرى الخاصة بك وفي حالات معينة من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى ملاءمة المقدار الدوائي أو إلى رفع المقدار الدوائي ببطء أكبر.

لا يجوز تناول أتوميك سوية مع أدوية تُسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) التي تستعمل لعلاج الإكتئاب. أنظر فقرة "لا يجوز إستعمال أتوميك".

إذا كنت تتناول أدوية أخرى، فإن أتوميك قد يؤثر على طريقة عملها أو قد يسبب أعراضا جانبية. إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية، إستوضح من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أتوميك:

- أدوية التي ترفع ضغط الدم أو التي تنظم ضغط الدم.
- أدوية مثل مضادات الإكتئاب، مثل: إيميبرامين، فينلأفكسين، ميرتازابين، فلوأوكستين وباروكستين.

- مستحضرات معينة للسمع والوزنك التي تحتوي على أدوية التي قد تؤثر على ضغط الدم. من المهم إستشارة الصيدلي إذا كنت تستعمل واحد أو أكثر من هذه المستحضرات.

- أدوية معينة التي تستعمل لعلاج حالات نفسية.
- أدوية التي تعرف بأنها تزيد من الخطورة لحدوث إختلاجات.
- أدوية معينة التي تسبب بقاء أتوميك في الدم لفترة أطول من المعتاد (مثل: كينيدين وتيريبينافين).

- ساليثامول (دواء لعلاج الربو) عندما يتم إستعماله عن طريق الفم أو بالحقن قد يؤدي إلى الشعور بتسارع نظم القلب، لكن لا يفانم ذلك الربو لديك.

الأدوية التالية قد ترفع من خطورة عدم سلامة نظم القلب عندما يتم تناولها سوية مع أتوميك:

- أدوية للسيطرة على نظم القلب.
- أدوية التي تغير من تركيز الأملاح في الدم.
- أدوية لمنع وعلاج الملاريا.

- مضادات حيوية معينة (مثل إيريثروميسين وموكسيفلوكساسين).
إذا لم تكن وثاقا فيما إذا كانت إحدى الأدوية التي تتناولها من ضمن القائمة أعلاه، إسال الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أتوميك.

إستعمال أتوميك والطعام
بالإمكان تناول أتوميك مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع
لا يعرف فيما إذا كان هذا الدواء يمكن أن يؤثر على الجنين أو ينتقل إلى حليب الأم. لا يجوز إستعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل، إلا إذا نصحك الطبيب بفعل ذلك.

- عليك الإمتناع عن تناول هذا الدواء إذا كنت مرضعة أو التوقف عن الإرضاع. إذا كنت:

- في فترة الحمل أو الإرضاع
- تعتقدن بانك قد تكوني حاملا أو تخططين للحمل
- تخططين لإرضاع رضيعك
- إستشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات
من الجائز أن تشعر بإرهاق، ميل للنوم أو دوام بعد تناول أتوميك. يجب توخي الحذر عند سياقة المركبة أو عند تشغيل ماكينات إلى أن تعلم كيف يؤثر عليك أتوميك. لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات إذا شعرت بإرهاق، ميل للنوم أو دوام.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال دائما حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن وثاقا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

- الإعطاء للأطفال هو من قبيل الكبار فقط.
- إذا كنت تتناول أتوميك مرة في اليوم وتعاني من إرهاق أو الشعور بوعكة، فمن الجائز أن تغير الطبيب أوقات تناول العلاج إلى مرتين في اليوم.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج بحددان من قبل الطبيب فقط. يتوفر أتوميك على شكل أقراص بعبوات دوائية مختلفة، من شأن طبيبك أن يغير المقدار الدوائي إلى أن يجد المقدار الدوائي المناسب لك/لطفلك.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة: مرة أو مرتين في اليوم. إن تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم سيساهم في تذكر أنت أو طفلك تناول الدواء.

- بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.
- يجب على الدواء مع الماء.

- عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات حول سحق أو مضغ القرص.





- من الجائز أن يوقف طبيب من حين لآخر العلاج بـ أتوميك لفترة معينة لفحص أعراض اضطرابات الإصغاء والتركيز.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

الفحوص والمتابعة

يجري الطبيب عدة فحوصات:

- قبل بدء العلاج - التأكد من أن أتوميك آمن وسيجلب الفائدة.

- بعد بدء العلاج - تتم على الأقل كل 6 أشهر، من الجائز أحياناً في أوقات مقاربة أكثر.

تُجرى الفحوص أيضاً عندما يتم تغيير المقدار الدوائي. هذه الفحوص تشمل:

- قياس الطول والوزن لدى الأطفال والشباب

- قياس ضغط الدم ونظم القلب

- فحص فيما إذا كنت تعاني من أية مشاكل أو إذا تفاقمت الأعراض الجانبية خلال العلاج بـ أتوميك

من الجائز التوقف عن العلاج بـ أتوميك إذا تم اكتشاف مشكلة خلال الفحوص الدورية.

إذا تناولت/تناول طفلك بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من المطلوب توخَّه فوراً إلى طبيب/طبيب طفلك، إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب أو لمركز التسليم وأحضر علبة الدواء معك. الأعراض الأكثر شيوعاً التي يُلغ عنها لإستعمال الفحص الدوائي مفرط هي أعراض في الجهاز الهضمي، ميل للنوم، دوام، إرتجاج وسلوك غير إعتيادي.

إذا نسيت/نسي طفلك تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، عليك تناول المقدار الدوائي فور تذكرك في ذلك اليوم. إذا فُوت مقداراً دوائياً في إحدى تلك الأيام، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً في اليوم التالي، بل يجب تقوية المقدار الدوائي الخاص باليوم المنسي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تمسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول أتوميك

إذا توقفت عن تناول أتوميك، فعلى الأغلب لا توجد أعراض جانبية، لكن من الجائز عودة أعراض اضطرابات الإصغاء، التركيز وفرط النشاط. يجب التوجُّه إلى الطبيب قبل توقفك عن العلاج.

علاج طويل الأمد

لا توجد حاجة لتناول أتوميك مدى الحياة. إذا كنت تتناول أتوميك لفترة تزيد عن سنة، يدرس الطبيب علاجك لكي يفحص فيما إذا هناك حاجة بعد لإستعمال الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أو لدى طفلك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أتوميك قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها. بعض الأعراض الجانبية قد تكون خطيرة.

يجب التوقف عن إستعمال أتوميك والتوجُّه مباشرة إلى الطبيب إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض التالية:

بول داكن؛ إصفار الجلد أو العينين؛ ألم في البطن عندما يكون هناك ألم بالضغط (حساسية) في الجزء الأيمن تحت الأضلاع؛ غثيان غير مُشخص؛ إرهاق؛ حكة؛ الشعور بأنك توشك على الإصابة بالإنفلونزا.

يجب التوجُّه إلى الطبيب فوراً إذا ظهر واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 100):

ضربات قلب سريعة جداً، عدم إنتظام نظم القلب؛ أفكار إنتحارية أو الرغبة في الإنتحار؛ الشعور بعودانية؛ مشاعر من العدائية والغضب؛ تقلبات في المزاج أو حالات مزاجية متغيرة؛ رد فعل تحسسي خفيف مع أعراض: إنتفاخ في الوجه وفي الحنجرة، صعوبات في التنفس، شرى (بقع صغيرة، بارزة وحاككة على الجلد)؛ إختلاجات؛ أعراض دهانية تشمل حلوسة (سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة)، الاعتقاد بأشياء غير صحيحة أو الشك.

الأطفال والشباب دون عمر 18 سنة معرضون لخطورة أكبر لظهور أعراض جانبية مثل:

أفكار إنتحارية أو الرغبة في الإنتحار (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 100)؛ تقلبات في المزاج أو حالات مزاجية متغيرة (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 10).

الكبار معرضون لخطورة أقل (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 1,000) لحبوب أضرار جانبية مثل:

إختلاجات؛ أعراض دهانية تشمل الهلوسة (سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة)، الاعتقاد بأشياء غير صحيحة أو الشك.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 1,000) تضمر الكبد.

أعراض جانبية إضافية التي يُلغ عنها تشمل الأعراض التالية. إذا تفاقت الأعراض الجانبية، إحدك للطبيب أو للصيدلي.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من متعالج واحد من بين 10)

الأطفال والشباب فوق عمر 6 سنوات

صداع؛ ألم في البطن؛ إنخفاض في الشهية للطعام؛ غثيان أو تقيؤ؛ ميل للنوم؛ فرط ضغط الدم؛ تسارع نظم (نبض) القلب.

الكبار

الشعور بغثيان؛ جفاف في الفم؛ صداع؛ إنخفاض في الشهية للطعام؛ صعوبة في البلوغ للنوم، والإستيقاظ باكراً؛ فرط ضغط الدم؛ تسارع نظم (نبض) القلب.

- من الجائز أن تخففي هذه الأعراض لدى غالبية الأشخاص بعد فترة من الزمن.

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 10) الأطفال والشباب فوق عمر 6 سنوات

الشعور بالغثيب والعصبية؛ مشاكل في النوم والإستيقاظ باكراً؛ الإكتئاب؛ الشعور بالحزن أو بفقدان الأمل؛ الشعور بقلق؛ خلجات؛ توسع الحدقتين (المركز الداكن في العين)؛ دوام؛ إمساح؛ قلة الشهية للطعام؛ مشاكل هضمية؛ إنتفاخ؛ إرتجاج؛ إحمار وحكة في الجلد؛ طفح؛ الشعور بكسل، إتهاك وميل للنوم؛ ألم في الصدر؛ إرهاق؛ إنخفاض في الوزن.

الكبار

الشعور بعصبية؛ إنخفاض في الرغبة الجنسية؛ اضطرابات في النوم؛ إكتئاب؛ الشعور بالحزن أو فقدان الأمل؛ الشعور بالقلق؛ دوام؛ الشعور بمذاق شاذ أو تغير غير زائل في المذاق؛ إرتجاج؛ وخز أو خدر في اليدين والقدمين؛ ميل للنوم، نعاس، الشعور بإرهاق؛ إمساح؛ ألم في البطن؛ مشاكل هضمية؛ إنتفاخ (غازات)؛ تقيؤ؛ هبات من الحر أو تورد؛ ضربات قلب سريعة أو الشعور بضربات قلب سريعة؛ إنتفاخ؛ إحمار وحكة في الجلد؛ تزايد التعرق؛ طفح؛ صعوبة في التبول، تكرار أو تردد في التبول، ألم أثناء التبول؛ إتهاب غدة البروستات (prostatitis)؛ آلام في منفرج الرجلين لدى الرجال؛ عدم القدرة على بلوغ إلتصاب العضو الذكري؛ تأخر الذذف؛ صعوبة في الحفاظ على إلتصاب العضو الذكري؛ الآم الدورة الشهرية؛ قلة الحيوية أو الطاقة؛ إرهاق؛ الشعور بالكسل، إتهاك وميل للنوم؛ قشعريرة؛ الشعور بسخس، تورث؛ الشعور بعطش؛ إنخفاض الوزن.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 100)

الأطفال والشباب فوق عمر 6 سنوات

إغماء؛ إرتجاج؛ شقيقة؛ طفوش الرؤية؛ مشاعر شاذة في الجلد، مثل حرق، نخز، حكة أو وخز؛ وخز أو خدر في اليدين والقدمين؛ إختلاجات (نوبات)؛ ضربات قلب سريعة أو الشعور بضربات قلب سريعة (إطالة مقطع QT)؛ ضيق في التنفس؛ تزايد التعرق؛ حكة في الجلد؛ قلة الحيوية أو الطاقة.

الكبار

قلة راحة؛ خلجات؛ إغماء؛ شقيقة؛ طفوش الرؤية؛ عدم سلامة نظم القلب (إطالة مقطع QT)؛ الشعور بالبرد في أصابع اليدين والقدمين؛ ألم في الصدر؛ ضيق في التنفس؛ طفح أحمر، بارز وحاك (شرى)؛ تقلصات عضلية؛ الرغبة في التبول؛ نشوة شاذة للجماع أو غياب نشوة الجماع؛ عدم إنتظام الطمث؛ عدم القدرة على بلوغ القذف.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى متعالج واحد من بين 1,000) الأطفال والشباب فوق عمر 6 سنوات

خلل في جريان الدم الذي يؤدي إلى خدر وشحوب في أصابع اليدين والقدمين (مرض رينو)؛ صعوبة في التبول، تكرار أو إنخفاض في التبول، ألم أثناء التبول؛ إلتصاب مطول ومؤلم؛ آلام في منفرج الرجلين لدى الذكور.

الكبار

خلل في جريان الدم الذي يؤدي إلى خدر وشحوب في أصابع اليدين والقدمين (مرض رينو)؛ إلتصاب مطول ومؤلم.

تأثيرات على النمو

هناك أطفال الذين يقاسون من تباطؤ في النمو (الوزن والطول) عندما يبدأون بتناول أتوميك. مع ذلك، في العلاج طويل الأمد، يبلغ الأطفال الوزن والطول الخاص بهمى أعمارهم. يراقب الطبيب طول ووزن طفلك على إمتداد فترة تناول العلاج. إذا كان طفلك لا ينمو أو لا يزداد وزنه كما هو متوقع، فمن الجائز أن يلائم الطبيب المقدار الدوائي الذي يتلقاه طفلك أو يقرر إيقاف العلاج بـ أتوميك بشكل مؤقت.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجّه إلى النموذج الميسر للتبليغ عن أعراض جانبية.

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة "يونيفارم م.ض".

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسشم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسشم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال بعد. إن إتحاذ هذ الوسائل يساعد في الحفاظ على جودة البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, Calcium hydrogen phosphate anhydrous, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Opadry OY 6503 blue, Opadry 02B220022 yellow.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

الدواء معبأ ضمن لوحات (بليسترات) ضمن علبة كرتون. بالنسبة لـ أتوميك تتوفر على أحجام 4، 7، 14، 15، 20، 28 و- 30 قرصاً. لا تسوق كافة أحجام العلبة.

أقراص أتوميك 18 هي مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، بلون أخضر مع خط للشطر من جانب واحد.

أقراص أتوميك 25، 40 هي مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أخضر مع خط للشطر من جانب واحد.

أقراص أتوميك 60 هي مطلية، مطولة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أخضر مع خط للشطر من جانب واحد.

أقراص أتوميك 100 هي مطلية، بيضوية، محدبة من كلا الجانبين، لونها أخضر مع خط للشطر من جانب واحد.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض، ص.ب. 21429، تل أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض، يارك الصناعة «مافو كرمل».

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

أتوميك 18 167 82 36233 00

أتوميك 25 160 12 35129 01

أتوميك 40 160 13 35130 01

أتوميك 60 160 14 35131 01

أتوميك 80 167 83 36234 00

أتوميك 100 167 84 36235 00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في آب 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.