

אגיסטון® קרם

חומר פעיל:

קלוטרימאזול Clotrimazole 1% W/W

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2

"מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא במידה ותסמיני המחלה (הסימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים אחרי 4 שבועות.

1. למה מיועדת התרופה?

אגיסטון קרם מיועד לטיפול בזיהומי עור ורקמות ריריות הנגרמים על ידי סוגים שונים של פטריות. מיועד גם לטיפול בקנדידה של הפות וקנדידה של הפין.

קבוצה תרפויטית: חומרים אנטי-פטרייתיים לשימוש מקומי מקבוצת האימידאזולים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, כולל צטוסטאריל אלכוהול (ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף").

• לטיפול בפטרת ציפורניים או על הקרקפת.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

כמו קרמים אחרים, אגיסטון קרם עלול להפחית את היעילות של אמצעי מניעה העשויים מגומי, כגון קונדום או דיאפרגמה. לכן, אם הנך משתמש באגיסטון קרם על הפות או הפין, יש להשתמש באמצעי מניעה חלופיים למשך לפחות חמישה ימים לאחר השימוש בתכשיר זה.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 4 שבועות, יש לפנות לרופא.

אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון, אם הנך מניקה או מנסה להרות, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתכשיר.

נהיגה ושימוש במכונית:

לאגיסטון קרם אין השפעה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונית או שהשפעתו זניחה בלבד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

אגיסטון קרם מכיל צטוסטאריל אלכוהול אשר יכול לגרום לגירוי מקומי בעור (פריחה, גרד או אודם).

אגיסטון קרם מכיל 10 מ"ג בנזיל אלכוהול בכל 1 גרם קרם אשר יכול לגרום לתגובה אלרגית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

במידה והתכשיר נרשם לך על-ידי הרופא עליך להישמע להוראותיו.

במידה ורכשת תכשיר זה ללא מרשם רופא, עליך להשתמש בתכשיר בהתאם להוראות בסעיף זה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: טיפול פעמיים עד 3 פעמים ביום.

אופן השימוש:

• הוראות פתיחה - על מנת לפתוח את השפופרת יש להפוך את הפקק ולדקור את החלק האטום את השפופרת באמצעות לחיצה של הפקק.

• לטיפול בפטרת כף הרגל: יש לשטוף את כפות הרגליים ולייבשן היטב, במיוחד בין האצבעות, לפני מריחת הקרם.

• יש למרוח שכבה דקה ואחידה על האזורים הנגועים פעמיים עד 3 פעמים ביום ולהחדיר את הקרם לתוך העור על-ידי עיסוי.

• בדרך-כלל תספיק כמות קטנה של ½ ס"מ קרם לטיפול באזור בגודל כף היד.

• משך הטיפול בזיהומי העור הפטרייתיים תלוי בסוג הזיהום. לרוב, משך הטיפול הינו לפחות שבועיים, למרות שיתכן שיידרשו עד 4 שבועות של טיפול.

• במידה והנך סובל מפטרת כף הרגל, מומלץ להשתמש גם באבקה אנטי פטרייתית. היוועץ ברופא או ברוקח.

• תסמיני הזיהום בעור, כגון גרד וכאב, צפויים להשתפר תוך מספר ימים מהתחלת הטיפול, אבל ייתכן שתסמינים כגון אדמומיות וקילוף העור עשויים להיעלם לאחר זמן רב יותר.

• אם לא חל שיפור במצבך תוך 4 שבועות, יש לפנות לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

לשימוש חיצוני בלבד.

אין להכניס את התרופה לפה או לבלוע אותה.

• אם בלעת בטעות את התכשיר, עליך לפנות מיד לרופא או לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב ביותר.

• יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים או הפה. במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף היטב עם מים ולפנות לרופא.

• **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר,** אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

• **אם שכחת למרוח את התכשיר בזמן הדרוש**

○ מרח מיד כשנזכרת והמשך את יתר הטיפול כרגיל.

• **כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?**

○ למרות שהאזור הנגוע מגרד, יש להימנע מגירוד האזור. הגירוד עלול לגרום לנזק לפני שטח העור וכך לגרום להתפשטות הזיהום.

○ שמור על האזורים הנגועים נקיים.

○ יש לייבש היטב את האזור אך להימנע משפשוף יתר.

○ אל תחלוק עם אנשים אחרים מגבות, שטיח אמבטיה וכדומה כיוון שהזיהום עלול לעבור אליהם.

○ הקפד לרחוץ את ידך לאחר כל טיפול בזיהום על-מנת למנוע את התפשטותו.

• אם הינך סובל מפטרת כף הרגל:

○ הקפד לייבש את העור בין האצבעות ביסודיות.

○ יש לכבס גרביים וגרביונים ביסודיות במים חמים כדי להסיר עור מקולף או נבגי פטריות.

○ החלף נעליים כל יום במידת האפשר.

• **אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

• **אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באגיסטון קרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

כמו בכל תרופה, ייתכן ויהיו מטופלים בעלי רגישות יתר (אלרגיים) לקרם זה. במידה והנך אלרגי, התגובה תתפתח בסמוך לאחר השימוש בתכשיר. **יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא או לפנות לחדר מיון בבית חולים הקרוב אליך ביותר אם מתפתחת תגובה אלרגית.** סימני תגובה אלרגית עשויים לכלול:

• פריחה

• בעיות בליעה או נשימה

• התנפחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון

• חולשה, סחרחורת או עילפון

• בחילה

לאחר השימוש בתרופה ייתכן ותחוש את אחד מהתסמינים הבאים: גרד, פריחה, שלפוחיות, בעירה, אי נוחות, התנפחות, גירוי, אודם או קילוף של העור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, יש לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה:

www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **תנאי איחסון:**

○ יש לאחסן במקום קריר מתחת ל-25°C.

○ לאחר הפתיחה הראשונה, ניתן להשתמש במשך 6 חודשים ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

• **נוסף על החומר הפעיל אגיסטון קרם מכיל גם:**

Octyldodecanol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, Sorbitan Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol, Purified Water

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

אגיסטון קרם הינו קרם בצבע לבן הארוז בשפופרת אלומיניום המכילה 30 גרם.

• **שם היצרן ובעל הרישום:** פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ. ת.ד. 16, ירוחם.

• נערך בספטמבר 2021 בהתאם להנחיות של משרד הבריאות.

• **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 130-70-30920

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

13.09.21