

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Препарат продается без рецепта врача

## Агистен Крем

**Активный ингредиент:**

**Клотримазол (Clotrimazole) 1% W/W**

Список неактивных и аллергенных компонентов смотрите в пункте 2 "Важная информация о некоторых компонентах препарата" и пункте 6 "Дополнительная информация".

**Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.** Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Вам следует принимать данный препарат в соответствии с указаниями пункта данной инструкции, описывающего дозировки. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усугубляются или не улучшаются через 4 недели.

### 1. Для чего предназначен препарат?

Крем Агистен предназначен для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых тканей, вызванных различными видами грибов. Препарат также предназначен для лечения кандидоза влагалища и кандидоза пениса.

**Терапевтическая группа:** противогрибковое средство для местного применения из группы имидазолов.

### 2. Перед применением препарата

**Не следует применять препарат, если:**

- У Вас есть повышенная чувствительность (аллергия) к действующему веществу или к любому другому из дополнительных компонентов лекарства, включая цетилстеариловый спирт (смотрите пункт 2 "Важная информация о некоторых компонентах препарата" и пункт 6 "Дополнительная информация").
- Для лечения грибковой инфекции ногтей или кожи головы.

**Особые предостережения, касающиеся применения препарата:**

Как и другие кремы, крем Агистен может снизить эффективность противозачаточных средств, изготовленных из резины, таких как презерватив или диафрагма. Поэтому, если крем Агистен назначен Вам для применения в области влагалища или пениса, следует использовать альтернативные противозачаточные средства в течение как минимум пяти дней после использования данного препарата.

Если в течение 4 недель Ваше состояние не улучшилось, обратитесь к врачу.

**Межлекарственные взаимодействия/реакции:**

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

**Беременность, кормление грудью и фертильность:**

Если вы беременны, кормите грудью или пытаетесь забеременеть, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием препарата.

**Вождение и управление механизмами:**

Крем Агистен не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами, либо его влияние незначительно.

**Важная информация о некоторых компонентах препарата**

Крем Агистен содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местное раздражение кожи (сыпь, зуд или покраснение).

Крем Агистен содержит 10 мг бензилового спирта на 1 грамм крема, что может вызвать аллергическую реакцию.

### 3. Как использовать препарат?

Если Вы не уверены в дозировке и методе лечения, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Если препарат Вам прописал врач, Вы должны следовать его указаниям.

Если Вы приобрели данный препарат без рецепта врача, Вам следует использовать его в соответствии с указаниями в данном разделе.

**Обычная рекомендованная дозировка, как правило, следующая:** проводить лечение до 2-3 раз в день.

**Способ применения:**

- Инструкции по открытию тюбика - чтобы открыть тюбик, переверните пробку и проткните часть, которая закрывает тюбик, нажав на пробку.
- Для лечения грибка ступней: перед нанесением крема следует хорошо вымыть и высушить ступни, особенно между пальцами ног.
- Наносите тонкий ровный слой на пораженные участки 2-3 раза в день и массирующими движениями слегка вотрите крем в кожу.
- Небольшого количества крема в ½ см обычно достаточно для обработки области размером с ладонь.
- Продолжительность лечения грибковых инфекций кожи зависит от типа инфекции. Обычно продолжительность лечения грибковых инфекций составляет не менее двух недель, хотя может потребоваться до 4 недель лечения.
- Если вы страдаете от грибковой инфекции стопы, рекомендуется также использовать противогрибковый порошок. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Ожидается, что симптомы кожной инфекции, такие как зуд и боль, облегчатся в течение нескольких дней после начала лечения, но такие симптомы, как покраснение и шелушение кожи, могут исчезнуть через более длительное время.
- Если Ваше состояние не улучшается в течение 4 недель, обратитесь к врачу.

**Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.**

Препарат предназначен только для наружного применения. Нельзя брать препарат в рот или глотать его.

• Если Вы случайно проглотили препарат, Вам следует немедленно обратиться к врачу или в приемный покой ближайшей больницы.

• Избегайте попадания препарата в глаза или в рот. В случае попадания препарата в глаза, тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.

• Если Вы допустили передозировку или, если ребенок по ошибке проглотил этот препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата.

• Если Вы забыли нанести препарат вовремя

- Нанесите препарат сразу, как только вспомните, и в дальнейшем продолжайте лечение, как обычно.

• Как Вы можете способствовать успеху лечения?

- Несмотря на то, что пораженный участок вызывает зуд, следует избегать расчесывания. Расчесывание может вызвать повреждение поверхности кожи и, таким образом, привести к распространению инфекции.
- Содержите пораженные участки в чистоте.
- Необходимо хорошо просушивать пораженный участок, но избегайте чрезмерного трения.
- Не пользуйтесь общими с другими людьми полотенцами, ковриками для ванной и т. д., так как инфекция может передаваться через них.
- Обязательно мойте руки после каждого нанесения препарата на пораженный участок, чтобы предотвратить распространение инфекции.

• Если у вас грибковая инфекция стопы:

- Обязательно тщательно высушите кожу между пальцами.
- Носки и колготки следует тщательно стирать в горячей воде, чтобы удалить отшелушивающуюся кожу или споры грибка.
- По возможности меняйте обувь каждый день.

• Не принимайте лекарства в темноте! При каждом приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

• При возникновении дополнительных вопросов, относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### 4. Побочные эффекты

Как и при приеме любого препарата, использование крема Агистен может привести к побочным эффектам у части потребителей. Не следует пугаться при прочтении списка побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни от одного из них.

Как и в случае с любым лекарством, у некоторых потребителей может проявиться гиперчувствительность (аллергия) к данному крему. Если у Вас есть аллергия, реакция разовьется вскоре после нанесения препарата. В случае, если у Вас возникла аллергическая реакция, **прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой ближайшей больницы.** Признаки аллергической реакции могут включать:

- Сыпь
- Проблемы с глотанием или дыханием
- Отек губ, лица, горла или языка
- Слабость, головокружение или обмороки
- Тошноту

**После нанесения препарата у Вас может возникнуть один из следующих симптомов:** зуд, сыпь, волдыри, жжение, дискомфорт, отек, раздражение, покраснение или шелушение кожи.

Если у Вас появился побочный эффект, если один из побочных эффектов обострился или если Вы страдаете от побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения через онлайн-форму "Сообщение о побочных эффектах, вызванных приемом лекарств", находящуюся на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) или перейдя по ссылке:

<http://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, необходимо сообщить о побочном эффекте в компанию Падагис по следующему адресу: [www.perrigo-pharma.co.il](http://www.perrigo-pharma.co.il)

### 5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту, не получив на это четких указаний врача,

• Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Условия хранения:

- Хранить в прохладном месте при температуре ниже 25°C.
- После первого вскрытия тюбика им можно пользоваться в течение 6 месяцев, но не позднее срока годности, указанного на упаковке.

### 6. Дополнительная информация:

• В дополнении к действующему веществу, крем Агистен также содержит:

Ocetyl dodecanol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, Sorbitan Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol, Purified Water

• Как выглядит лекарство и что включает упаковка:

Крем Агистен - представляет собой крем белого цвета, упакованный в алюминиевый тюбик содержащий 30 грамм.

• Производитель и владелец лицензии: Падагис Израиль Фармацевтика Лтд., п/я 16, Иерусхам.

• Отредактировано в сентябре 2021 г. в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.

• Регистрационный номер лекарства в государственном реестре Министерства здравоохранения: 130-70-30920.