

## كوماچیس کریم

كل 100 غرام من كوماچیس کریم تحتوي على:

1 غرام بيفونازول (Bifonazole)

0.05 غرام فلووسینونید (Fluocinonide)

المادة غير الفعالة والمستشارجة في المستحضر. انظر

للبند 6 "معلومات إضافية" وللبند 2 "معلومات مهمة"

عن جزء من المركبات في الدواء".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا الاستعمال بموجب تعليمات الطبيب.  
عليك التتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكتاً.  
الجرعة وطريقة العلاج تحدّدان من قبل الطبيب فقط.  
تعليمات الاستعمال:

- قبل استعمال الدواء يجب ثقب ختم الأنبوة عن طريق قلب الغطاء، وضغطه عبر حافة الأنبوة.
- قبل دهن الكريم، يجب شطف وتجفيف المنطقة المصابة جيداً، خاصة بين أصابع القدم، في حالة العدوى في كفتي القدمين.
- يجب دهن طبقة رقيقة ومتجانسة من الكريم على المنطقة المصابة مرة في اليوم، يفضل أن يكون ذلك في الليل قبل النوم، والتداлиك بلطف نحو داخل الجلد.
- مدة العلاج تحدّد من قبل الطبيب.
- في حالة العدوى بكف القدم، من المفيد أيضاً استعمال مسحوق مضاد للفطريات. استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على توصية بشأن مسحوق معين.

أعراض العدوى في الجلد، مثل الحكة أو الألم، يفترض أن تتحسن في غضون عدة أيام من العلاج. ومع ذلك، قد تختفي علامات مثل الاحمرار وتتشير الجلد بعد فترة أطول. إذا لم تتحسن الأعراض في غضون 7 أيام، توجه للاستشارة مع الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

للاستعمال الخارجي فقط.  
لا يجوز إدخال الكريم إلى الفم أو بلعه. إذا تلامس الدواء عن طريق الخطأ مع الفم أو العينين، يجب شطفه فوراً بالماء والتوجه إلى الطبيب.

إذا بلع طفل أو أي شخص آخر عن طريق الخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت دهن الدواء في الوقت المطلوب، ادهن الدواء في أقرب وقت ممكن واستمر بالعلاج كالمعتاد.  
يجب المداومة على العلاج بموجب ما أوصى به من قبل الطبيب.

#### كيف يمكنك المساهمة لنجاح العلاج؟

على الرغم من أن المنطقة المصابة سوف تثير الحكة، حاول الامتناع عن حكها. سوف يسبب الحك ضرراً لسطح الجلد وبالتالي سوف يسبب انتشار العدوى بدرجة أكبر.

حافظ على المناطق المصابة نظيفة.  
الرطوبة تشجع نمو الفطريات. لذا يجب الحفاظ على الجفاف في المكان المصاب.

يجب غسل المنطقة المصابة قبل كل دهن للدواء.  
بين علاج وعلاج - يمكن استعمال مسحوق مضاد للفطريات لتجفيف المكان.

يجب دائمًا غسل اليدين بعد العلاج بالدواء وذلك لمنع انتشارها.

لا تشارك مع آشخاص آخرين المنشاف، حسائر حوض الاستحمام وما إلى ذلك حيث قد تنتقل العدوى إليهم.

إذا كان العلاج في الق弥ن - يجي الحرصن على الإغتسال بشكل جوهرى والتجميف خاصة بين أصابع القدم. لكن ينبغي تجنب الإفراط في الفرك. من المستحسن استعمال جوارب قطنية. يجب الامتناع عن ارتداء جوارب من الصوف أو من مواد أصطناعية.

اقرأ النشرة بأمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الصيدلي.  
أو إلى الصيدلي.  
هذا الدواء وصف للعلاج من أجلك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

كوماچیس کریم يخفف من حالات التهاب المصحوبة ببعوى فطرية والتي تستجيب لعلاج كورتيكوتونيدي.

**الفصيلة العلاجية:** مضاد التهاب + مضاد فطريات.

### 2. قبل استعمال الدواء

#### لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أرجح) للمواد الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- لعلاج طفح الحفاضات. إذا كان يوجد لدى طفلك طفح حفاضات، توجه إلى الطبيب لتلقى علاج ملائم.
- لعلاج العدوى في الأظافر أو في فروة الرأس.
- لعلاج تلوثات المهبل.
- على مساحات واسعة من الجسم أو لفترة زمنية طويلة.

#### تحذيرات خاصة فيما يتعلق باستعمال الدواء

- لا يجوز السماح للدواء بلامسة العينين.
- لا يجوز تضميم، تغطية أو تغليف منطقة العلاج بحيث يتم تشكيل ضماد إبطاقي، إلا بتوجيه من الطبيب.

#### قبل العلاج بكوماچیس کریم أخبر الطبيب إذا

- اختبرت ذات مرة رد فعل تحسسي لمادة مضادة للفطريات أي كانت.

#### التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ وارفارين (مضاد تخثر).

#### الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إلا بتوصية الطبيب فقط.

#### الاستعمال لدى الأطفال والرضع

لا يجوز استعمال حفاضات ضيقية أو سراويل بلاستيكية لدى الأطفال المعالجين في منطقة الحفاض، لأن هذه الملابس تشكيل ضماد إبطاقي.

قد يمتص الأطفال بشكل نسبي كميات أكبر من الكورتيكوتونيدات الموضعية وبالتالي قد يكونوا أكثر تحسساً للتسمم جهازي. إذا تطور تهيج يجب التوقف عن العلاج.

- من المستحسن استبدالها عدة مرات في اليوم (وفقاً لكمية التعرق).
  - اغسل الجوارب جيداً، جوارب النيلون والجوارب الطويلة بماء ساخن لإزالة كافة الجلد المتقدّر أو أي وعاء الفطريات.
  - بذل حذاك يومياً بقدر الإمكان.
  - في المواسم المناسبة ينصح بانتهال صنادل بدون جوارب.
- لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال كوماچيس كريم أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي علامة لعرض جانبى موضعي، على وجه الخصوص تحت ضماد إطباقى.

كما في جميع الأدوية، قد يكون هناك بعض الأشخاص حساسين للدواء. إذا كنت حساساً، فسيتطور رد الفعل فوراً بعد بدء الاستعمال. فيما لو كنت تختبر رد فعل تحسسي توقف عن الاستعمال وتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة طوارئ المستشفى القريب. العلامات لرد فعل تحسسي قد تشمل:

- طفح.
- مشاكل بالبلع أو بالتنفس.
- تورم الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان.
- وهن، نُوّار أو إغماء.
- غثيان.

بعد دهن الكريم من المحتمل أن تشعر بأحد الأعراض التالية:

- تهيج حفيظ أو حرقه.
- احمرار الجلد.
- تفشل (بيلنج).

إذا كانت الأعراض لا تطاق، توقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

#### 6. معلومات إضافية

- إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Cetostearyl alcohol,  
2-octyldodecanol, cetyl esters  
wax, sorbitan monostearate,  
polysorbate 60, benzyl alcohol,  
purified water.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: أنبوية الومبوم التي تحتوي على 7 أو 15 غرام كريم بلون أبيض.
- اسم المصنعت وصاحب التسجيل: بريجو إسرائيل، مستحضرات دوائية م.ض، ص. ب. 16، يرو حام.
- تم التتفيق في آيار 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 063.04.26742
- للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

25.05.2021

يمكن أن يسبب الدواء تهيجه موضعياً في الجلد الذي يشبه إلى حد كبير أعراض العدوى. إذا تفاقم أحد الأعراض، توقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

هذه الأعراض قد تشمل:

- حرقة، ألم أو حكة.
- طفح، احمرار، جفاف.
- ظهور رخو أو رطب للبشرة.
- تورم، شرى (آفات حمراء، بارزة ومثيرة للحكة)، حويصلات.

يتم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في أوقات متباude أثناء الاستعمال بكورتيكosteroides موضعية، لكنها قد تحدث بشكل أكثر توافراً أثناء الاستعمال بضماد إطباقى:

حرقة، حكة، تهيجه، جفاف، التهاب بصلة الشعرة، فرط نمو الشعر لدى النساء (من أصل غير هرموني)، اضطرابات في الجلد مماثلة لحب الشباب (acneiform eruptions)، نقص التصبغ (hypopigmentation)، التهاب الجلد حول الفم، التهاب الجلد التماسي التحسسي (allergic contact dermatitis)، تلدين