

أرثربيل جو أكياس
مسحوق تحضير محلول للشرب

المادة الفعالة:
1884 ملغم من الجلوكوزامين سلفات البليوري (المكون من 1500 ملغم من الجلوكوزامين سلفات و 384 ملغم من كلوريد الصوديوم).

Crystalline Glucosamine Sulfate 1884 mg (equivalent to glucosamine sulfate 1500 mg, sodium chloride 384 mg).

العلمية قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6.

وانتظر أيضاً معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء في البند 2.

اقرأ النشرة بامكانك حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء.

تتضمن هذه النشرة معلومات ملخصة عن الدواء، وإذا توفرت لديك أسلحة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

ويتوخج عليك استخدام الدواء بما تغاير التعليمات الواردة في بند التخريح في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

ويتوخج عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت الأعراض أو إذا لم يحصل تحسن بعد 30 يوماً.

1. لأيِّ غرضٍ خصصَ هذَا الدُّوَاء؟

أرثربيل جو مخصص لتخفيف أعراض التهاب المفصل التئجيبي المطبق إلى المتوسط في الركبة.
الفصيلة العلاجية: الأدوية المصابة لروماتيزم غير الستيرويدية.

2. قبل استخدام هذَا الدُّوَاء
يمكن استخدام هذَا الدُّوَاء إذا:

- كنت حساساً (كانت لديك أرجنة) لل المادة الفعالة (الجلوكوزامين) أو لأيٍّ واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (المكونة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6).
- كنت حساساً (كانت لديك أرجنة) للماكولات البحرية.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:
قبل العلاج بأرثربيل جو (خلاله)، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من السكري أو من عدم تحمل الجلوكوز، وقد ظهر الحاجة إلى متابعة مستويات السكر في الدم واستهلاك الإنسان في أحيان أكثر تقريباً (إذا أطريق الحال) في بداية العلاج وبشكل دوري خلاله.
- كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفي بداية العلاج بالدواء، قد تتفاقم أعراض الريبو.
- كنت تعاني من مشكلة خطيرة في الكبد أو الكليتين.
- كانت لديك مستويات كوكسيات مرفقة في الدم.
- كان لديك دم تحمل سكريات معينة.
- كنت تتبع حمية غذائية قليلة الصوديوم.

التحذيرات الأخرى:

- وجب استبعاد وجود مرض آخر في المفاصل يستلزم علاجاً مختلفاً.
- في حال شئت أعراض أخرى أو إذا تغيرت الأعراض الموجودة لديك، فيجب استشارة الطبيب حال الأطفال والمرأهقون: إذا الدواء غير مخصوص للأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاماً لاته وقد يتهدى أمانه وفعاليته في هذه الفئة العمرية.

الفوصل والمتابعة: قد يصبح من الضروري متابعة الحالة الطبية لدى بعض الملتقطين للعلاج.

إذا كنت تتناول موخرداً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المصرفية بدون وصفة

طبيب والإضافات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. و يجب على وجه التحديد أخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية (ويذكر الذكر أن القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية). وفي حال كنت غير متذكرة قد تطرأ الحاجة إلى متابعة العلاج وتحذيفه فروا إلى الطبيب، يجب التوجه إلى الطبيب.

فأرجاه إشارة الطبيب أو الصيدلي):

- أدوية معينة مصنعة لتخدير الدم من صناعة الكورميدينات (مثل وارفارين، ديكومارول، فينيروكومون، أسيتيوكومارول، فلوريدين) - ذلك لأن تأثيرها قد يكون أقوى إذا تم استخدامها بالتزامن بأرثربيل جو، وفي هذه الحالة العلاج بأرثربيل جو و عند الانتهاء منه قد تطرأ الحاجة إلى متابعة العلاج وتحذيفه في الأدوية. وفي حال كنت غير متذكرة قد تطرأ الحاجة إلى متابعة العلاج وتحذيفه فروا إلى الطبيب، يجب التوجه إلى الطبيب.
- المضادات الحيوانية لفصيلة الستريكينات - ذلك لأن أرثربيل جو قد يزيد من مدى امتصاصها.

استخدام الدواء والغذاء: يفضل تتناول الدواء مع الوجبة.

الحمل والإرضاع: يمنع استخدام هذا الدواء إذا كنت حاملة أو مرضعاً.

قيادة السيارة واستخدام الماكينات: إذا شعرت بالصداع، الميل إلى النوم، التعب، الدوار، أو إذا عانيت من اضطرابات الرؤية، فلا تقد السيارة أو تشغل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- يحتوي كل كبس من أرثربيل جو على 2.5 ملغم بسيترات، الذي يشكل مصدراً للفينيل الألينين وقد يضر بالأشخاص الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتوين.
- يحتوي أرثربيل جو على سوروبينول (نوع من السكري)، وإذا كانت تعاني من عدم التحمل لسكريات معينة، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء (يحتوي كل كبس على ما يقارب غرامين من سوروبينول).
- يحتوي الدواء على 151 ملغم من الصوديوم في كل كبس. وتساوي هذه الكمية 7.5% من كمية الصوديوم المقصوص البوتاسيوم المعروض بها بالنسبة للبالغين (غرامين). ويجب استشارة الطبيب إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة الصوديوم.

3. كيف تستخدم هذا الدواء؟
يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متذكرة من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالآلام، إنما تناوله يعتمد على المرض الذي يعاني منه.

الجرعة والوانة المئوية وطريقة العلاج الاعتيادية هما كالتالي:
يجب إدراك حقيقة كبس واحد في كأس من الماء والشرب بعد التحضير مباشرةً مرتين واحدة في اليوم، ويفضل القيام بذلك من وجبة واحدة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء مخصوص لاستخدامه فقط بعد إذابة المسحوق في كأس من الماء كاملاً.
ولا يجوز تناول المسحوق قبل ذوبانه في كأس الماء.

هذا الدواء غير مخصوص لعلاج أعراض الآلام الحادة، وقد لا يحصل تخفيف الأعراض (وخاصة تكثيف الألم) بعد إدخاله.

في حال لم يحصل تخفيف الأعراض بعد فتره علاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر، يجب استشارة الطبيب والتفكير مجدداً في موصولة العلاج بأرثربيل جو.

في حال تفاقمت المسكن للألم الناتج من أرثربيل جو فظ يبعد أسبوع أو اثنين، وإذا عانيت من آلام أثناء الملاهي، وتحذيفه في أيامه، فيمكن استخدام مضادات الالتهاب/مسككات الآلام غير الستيرويدية (NSAIDs) بشكل متزامن.

الاستخدام لدى متذكرة العلاج الذين يعانون من خلل في وظيفة الكليتين وأو الكبد: بما أنه لم تجر دراسات على هذه المجموعات فإنه لا يمكن تحديد جرعة دوائية موصى بها.

إذا تناولت خللاً جرعة دوائية أعلى، بما في ذلك الأدوية المصرفية بدون وصفة

الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية (ويذكر الذكر أن القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية). وفي حال كنت غير متذكرة قد تطرأ الحاجة إلى متابعة العلاج وتحذيفه فروا إلى الطبيب، يجب التوجه إلى الطبيب.

فالرجاء إشارة الطبيب أو الصيدلي):

- أدوية معينة مصنعة لتخدير الدم من صناعة الكورميدينات (مثل وارفارين، ديكومارول، فينيروكومون، أسيتيوكومارول، فلوريدين) - ذلك لأن تأثيرها قد يكون أقوى إذا تم استخدامها بالتزامن بأرثربيل جو، وفي هذه الحالة العلاج بأرثربيل جو و عند الانتهاء منه قد تطرأ الحاجة إلى متابعة العلاج وتحذيفه في الأدوية. وفي حال كنت غير متذكرة قد تطرأ الحاجة إلى متابعة العلاج وتحذيفه فروا إلى الطبيب، يجب التوجه إلى الطبيب.
- المضادات الحيوانية لفصيلة الستريكينات - ذلك لأن أرثربيل جو قد يزيد من مدى امتصاصها.

استخدام الدواء والغذاء: يفضل تناول الدواء مع الوجبة.

الحمل والإرضاع: يمنع استخدام هذا الدواء إذا كنت حاملة أو مرضعاً.

قيادة السيارة واستخدام الماكينات: إذا شعرت بالصداع، الميل إلى النوم، التعب، الدوار، أو إذا عانيت من اضطرابات الرؤية، فلا تقد السيارة أو تشغل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- يحتوي كل كبس من أرثربيل جو على 2.5 ملغم بسيترات، الذي يشكل مصدراً للفينيل الألينين وقد يضر بالأشخاص الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتوين.
- يحتوي أرثربيل جو على سوروبينول (نوع من السكري)، وإذا كانت تعاني من عدم التحمل لسكريات معينة، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء (يحتوي كل كبس على ما يقارب غرامين من سوروبينول).

يحتوي الدواء على 151 ملغم من الصوديوم في كل كبس. وتساوي هذه الكمية 7.5% من كمية الصوديوم المقصوص البوتاسيوم المعروض بها بالنسبة للبالغين (غرامين). ويجب استشارة الطبيب

إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة الصوديوم.

4. الأعراض الجانبية
مثل أي دواء، قد يؤدي استخدام أرثربيل جو إلى الشعور بأعراض جانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية لأنك قد لا تعاني من أي منها.
يجب إيقاف العلاج والتروح إلى الطبيب فروا إلى الحالات التالية:
إذا شئت أعراض رود الفعل الخطيرة لدى بعض المرضى.
إذا شئت أعراض جانبية غير الشائعة (ظهور لدى 10-1% من المستخدمين من أصل 100 مستخدم):

الأعراض الجانبية الشائعة (ظهور لدى 10-1% من المستخدمين من أصل 1000 مستخدم):

احمرار العين، تورّد الوجه، الحكة، التهاب الجلد (المتناثل في الطفح الجدلي أو الحكة).
الأعراض الجانبية التي مدد تبيّنها غير معروفة غير محددة لدى المرضى.

ردة فعل التحسّن، الدوار، اضطرابات الرؤية، صعوبات النوم (مثل الصعوبات في النّهود إلى النوم أو في البقاء نائماً)، دقات القلب غير المنتظمة أو تغييرات في نظم القلب، نقص السيطرة على