



פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ
רח' שנקר 9, ת.ד. 12133
הרצליה פיתוח, ישראל 46725
טל: 972-9-9700500 פקס: 972-9-9700501

אוקטובר 2021

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

ברצוננו להודיעך על עדכון בעלונים לרופא ולצרכן של **RAPAMUNE® SOLUTION** ו- **RAPAMUNE® 1 MG TABLETS**

חוזק:

Each mL of solution contains 1 mg of sirolimus.
Each Tablet contains 1mg of sirolimus.

התוויה:

Rapamune is indicated for the prophylaxis of organ rejection in adult patients at low to moderate immunological risk receiving a renal transplant.
It is recommended that Rapamune be used initially in combination with cyclosporine microemulsion and corticosteroids for 2 to 3 months. Rapamune may be continued as maintenance therapy with corticosteroids only if cyclosporine can be progressively discontinued.

להלן העדכון העיקרי בעלון לרופא:

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Other possible interactions

Inhibitors of CYP3A4 may decrease the metabolism of sirolimus and increase sirolimus blood levels. Such inhibitors include certain antifungals (e.g. clotrimazole, fluconazole, itraconazole, voriconazole), certain antibiotics (e.g. troleandomycin, telithromycin, clarithromycin), certain protease inhibitors (e.g. ritonavir, indinavir, boceprevir, and telaprevir), nifedipine, bromocriptine, cimetidine, danazol and **letermovir**.

להלן העדכון העיקרי בעלון לצרכן:

לפני שימוש בתרופה

אינטראקציות בין תרופתיות

• ...
• **לטרמוביר (תרופה אנטי-ויראלית למניעת מחלה הנגרמת מנגיף הציטומגלו (CMV))**

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים חמרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים חמרה.

העלונים לרופא ולצרכן עבור כל תכשיר נשלחו למשרד הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

לחילופין, לקבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
רח' שנקר 9, ת.ד. 12133
הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,
גילי קבשה
רוקחת ממונה