

רילוטק 50 מ"ג טבליות מצופות

SANOFI ↗

Riluzole 50 mg

חומר פעיל: רילוזול 50 מ"ג
חוֹמָרִים בְּלִתי פֻּלִּים וְלְאַגְּנִים בְּתַכְשֵׁיר: רָאה סְעִיף 6
"מִידָּע נָסָף" וְסְעִיף 2 "מִידָּע חָשׁוב עַל חָלֵק מִהְמְרַכְּבִים
שֶׁל הַתוֹּרָהָה".

קרא בעין את העלון עד סוף בטראם תשמש

שמור על עלוֹן זה, ייתכן וצטריך לקרוא בו שוב.
עלון זה מכיל מידע תמצתי על התוֹרָהָה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל
הרוקחת.

תוֹרָהָה זו נרשמה בעברך. אל תעביר אותה לאחרים.
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם
הרופא דומה.

התקשר מיועד לטיפול במוגרים, החל מגיל 18
שנים.

1. למה מייעצת התוֹרָהָה?

טיפול ב- ALS (AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS) - מחלת
הנוֹרָוָה המוטורית.

ALS היא סוג של מחלת עצביות, שפוגעת בהעברת
מידע מהעצבים לשירים, דבר שמוביל לחולשה, פגעה
בשרירים ושיטוק.

קבוצה רפואיית: החומר פועל על מערכת העצבים
המרכזיים.

2. לפניה השימוש בתוֹרָהָה

אין להשתמש בתוֹרָהָה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד
מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התוֹרָהָה (ראה
סעיף 6 "מִידָּע נָסָף").
הן סובל **מחלה כבד** או מעלייה באיברים הקשורים
לפעילות הגוף (טרנסאמינזות).
הן בהריון או מניקה.

ażhorot miyadot ha-negevot le-shimush bat-torofah
אין להשתמש בתוֹרָהָה מכל להוועס ברופא לפני התחלת
הטיפול:

• אם הנך סובל מבעיות בכבד: הצהבה של העור או
החלק הלבן בעיניים (צחבת), גירוד בכל הגוף, בחילות או
או הקאות.

• אם הכליות שלך לא מתפקדות היטב.
• אם יש לך חום: יכול לבבוע מסיפה נרוכה של תא
דם ובכיסים, שיכולה לגרום לעלייה הסיכון שלהם.

ילים ומוגברים

אם גילך נמוך מ- 18 שנים, השימוש ברילוטק אין מומלץ
זהות ולא קיים מידע באוכלוסייה זו.

בדיקות ומיעקב

בתקופת הטיפול בתוֹרָהָה זו יש לערוך בדיקות תפוקוד
כבד.

אם במהלך ליקחת התוֹרָהָה הנך סובל ממחלת המליה
בחום יש לוודע על כך מיד לרופא.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות

אם אתה לוקת, או אם לך כתפת לאחרונה, תרופות
אחרות כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי
תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקחת. במיוחד אם
אתה לוקת:

מעכבי איבום 2CYP1A2 כגון: קפאן, דיקלופנק, דיאזפאם,
ינקרולין, קלומיפרומין, אימפרומין, פלבוקסמין, פנאצטין,
טיואפולין, אמיטרופיטולין וקוינולונים.

מודרי איבום 2CYP2CGG כגון: עישון סיגריות, מון שנבללה
על האש, ריפמיצין, אומפהול.

הירון והנקה

אין להשתמש בתוֹרָהָה אם הנך בהריון, חושבת שהנקה
ב беременн או מוקהה.

אם את מתוכננת להனיק, התיעצי עם הרופא לפני תחילת
השימוש ברילוטק.

גהיגיה ושימוש במוגנות

אהה יכול להזיז או להשתמש במוגנות אלא אם אתה
חש סחרורות אחריו ליקחת התוֹרָהָה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוֹרָהָה

רילוטק מכיל נתרן. התוֹרָהָה זו מכילה פחות מ- 1
מלילול נתרן (23 מ"ג) לטבילה, כמוור היא לא מעשנה
נטולות נתרן.

3. כיצד תשמש בתוֹרָהָה?

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.
עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בטוח בטעות
למיון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון התקובל בדרך כלל הוא טבlia אחת, פעמיים
ביום (כל 12 שעות).

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין לעלוס! יש לבלוֹן את התוֹרָהָה עם מים.
לצורך אין מידע בנושא אפשרות לחזות, לרוקק או לכתחוש
את הטבליות.

מומלץ ליטול את התוֹרָהָה שעה לפני הארוחה או שעתים
לאחר הארוחה.

**אם נמלת בטבעות מינון גבוה יותר או אם בטבעות בלע
ילד מן התוֹרָהָה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית
חולם והבא אריזת התוֹרָהָה איתך.**

אם שכחת ליטול את התוֹרָהָה
אם שכחת ליטול התוֹרָהָה זו בזמנן נכון המנה הבאה בדמנה.
שנשכחנה ורק את המנה הבאה בדמנה.

אוון רקחת מנה כפולה כפוי על מנת נשכחנה.
יש להתמיד בטיפול כפוי שהומלץ על-ידי הרופא. גם אם
חל שיפור במצב בריאותך, אוון הפסק הטיפול בתוֹרָהָה
לאוֹת התיעוֹצָות עם הרופא.

אין ליטול תוֹרָהָה בחושך! בדוק התוֹוֹת ווֹמָנוֹת בְּכָל
עמַפְטָה נוֹטֵל תוֹרָהָה. הרוכב מְשֻׁקְפִּים אֵם הַנְּ

דָּקָק לְהַמָּ
הוֹיְוָעָץ בְּרוֹפֵא אֲוֹרָקָת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תוֹרָהָה, השימוש ברילוטק עלול לגרום לתופעות
לוֹא-וָיְוָא בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למסקרה ישירה תופעות הלואוֹי. יתכן ולא
תஸבול מכך אף אחת מהן.

חשיבות

פָּנָה לְרוֹפֵא מִידָּע

- אם יש לך חום, כיוון שרילוטק יכול לגרום לירידה
בספרית הדם הבוגרת. יתכן שהרופא ישלח אותך
לבדיקות דם כדי לבדוק את מספר תא הדם הבלתי
בדמך, שחשובי למילומה ביהוֹם.
- בהופעת התופעות הבאות: הצהבה של העור או החלק
הלבן בעיניים (צחבת), גירוד בכל הגוף, בחילות או
הקלות, אולי יכולם להיות סימנים **למחלת CBD**. יתכן
שהרופא ישלח אותך לדיקות דם באופן שגרתי במהלך
נטילת התוֹרָהָה.
- אם אתה סובל משיעול או קשיי נשימה - יתכן שאתה
מהוועס סימני למחלת ריאת.

תופעות לוואי אחרות

תופעות שכחות ביוֹת (יכולות להשפיע על יותר מאדם
אחד מתוך שעשרה):

עיפויות, בחילה, עלייה ברמת אנדמי כבד.

תופעות שכחות ביוֹת (יכולות להשפיע על עד 1 מטופר
10 בין אדם):

סחרחות, ישנונות, כאב ראש, הפרעות תחושה/עכצוץ
בפה, דופק מהיר, כאב בטן, הקאה, שלשול, כאב.

תופעות שאין שכחות (יכולות להשפיע על עד 1
מטופר 100 בין אדם):

אנמיה, תגבומות אלרגיות, דלקת של הלבלב.

**אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה מתחומות הלואוֹי
מחמירה או כאשר אתה צובל מטופעת לוואי שלא
צויינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא:**

ניתן להזין על תופעות לוואי למשדר הריריות באמצעות
לחיזעה על הקישור "ד"יזו"ות על תופעות לוואי עיקרי טיפול
תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות לתיוֹצָה (www.health.gov.il)
טופעות לוואי, או עי"א כנסה לקשרו:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התוֹרָהָה?

מנע הירלה! תזווהה זו וכל תוֹרָהָה אחרת וshelf
במקומות סגור מחוץ לחישג יד וטווח ראייתם של ילדים
או/ו תינוקות ועל-ידי קר תמן הערלה. אל תזרום להקאה
לאוֹת הוראה מפורשת מהרופא.

אין גנוי אחסון מיוחדים אך מומלץ לאחסן במקום
קריר ויבש.

אחסן באזוזה המקורית.

6. מידע נוסף על המרכיב הפעיל התוֹרָהָה מכילה גם:

Anhydrous dibasic calcium phosphate, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Hydroxypropylmethylcellulose (Hypromellose), Magnesium stearate, Colloidal silica anhydrous, Polyethylene glycol 6000 (macrogol 6000), Titanium dioxide.

כיצד נוראית התוֹרָהָה ומה תוכנן האריזה:

אריזה של 56 טבליות לבנות עליה מוטבע RPR. עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך
שאלה כלשהיא או איך בטוח בדבר מה אנא פנה לרופא.
בעל הרישום והביאוֹת וכותבתו: סאנופי-אונטנסיס ישראל
בע"מ, בני גאון 10, נתניה 4250499.

נעורך בפברואר 2021 בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

מספק רישום התוֹרָהָה בפנקס התוֹרָהָה הממלכתי
במשרד הבריאות: 106-26-29046. לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה מוטב בשונן זכר.
על אף זאת, התוֹרָהָה מייעצת לבני שני המינים.