

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة  
**(مستحضرات) - 1986**  
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

## إتودولاك تيقيع 400 ملغ

أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على:  
Etodolac 400 mg  
إتودولاك 400 ملغ

معلومات عن المركبات غير الفعالة وموارد  
الحساسية أنظر الفقرة 2 - «معلومات هامة عن  
بعض مركبات الدواء» والفقرة 6 - «معلومات  
إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك  
للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة  
عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع  
الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين.  
 فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه  
لمرضك. هذا الدواء غير موصى به للأطفال والرضع.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

مستحضر لا ستيروئيدي مضاد للالتهاب مُسكن للآلام  
المزمنة أو الحادة، خاصة آلام المفاصل (التهاب عظمي  
فصيلي، إلتهاب المفاصل الرثائي).

الفصيلة العلاجية:

من مضادات الإلتهاب الستيروئيدية (NSAIDs).

### 2) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (إتودولاك)  
أو لأحد مركبات الدواء الأخرى (المفصلة في  
الفقرة 6 - «معلومات إضافية»).

• كنت حساساً لأدوية أخرى مسكنة للآلام من  
فصيلة مضادات الإلتهاب الستيروئيدية مثل  
أسيپيرين أو إيبوبروفن.

• كنت في الثلث الأخير من الحمل.  
فاسيت في الماضي من ضيق في التنفس، إلتهاب  
في الأنف (إنسداد الأنف أو رشح) أو شرى  
(رد فعل تحسسي جلدي) بعد تناول أسيپيرين،  
إيبوبروفن أو دواء آخر من فصيلة مضادات  
الإلتهاب الستيروئيدية.

• كنت تعاني من قرحة هضمية (قرحة في المعدة  
أو الإثنى عشرى) أو حدثت لديك حالتان أو أكثر  
لقرحة هضمية، نزف أو إنثقاب في المعدة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• قد تزيد الأدوية من فصيلة مضادات الإلتهاب  
الستيروئيدية بقليل من خطورة حدوث نوبة  
قبيلية أو سكتة. تكون الخطورة أكبر في الجرعات  
الدوائية المرتفعة وبعد علاج لفترة طويلة. لا يجوز  
تجاوز الجرعة الدوائية أو فترة العلاج الموصى  
بها.

• إذا وجدت لديك مشاكل في القلب، عانيت في  
الماضي من سكتة أو كنت تعتقد بأنك قد تكون  
معروضاً لخطرة حدوث هذه الحالات (مثلاً إذا  
كنت تعاني من ارتفاع في ضغط دم، من مرض  
السكري أو من إرتفاع في الكوليسترول أو إذا كنت  
من المدخنين) - عليك مناقشة الطبيب بخصوص  
العلاج.

• إحك للطبيب، وخاصة إذا كنت مسنًا إذا كانت  
لديك شكاوى غير اعتيادية في الجهاز الهضمي  
في المراحل المبكرة من العلاج، خاصة نقىء دم،  
براز دموي أو أسود اللون.

قبل العلاج بـ إتودولاك تيقيع إحك للطبيب إذا:

• وجدت لديك مشاكل في القلب، في الكبد أو في  
الكلى أو كنت تعاني من إضطراب في الدم  
• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الربو أو من  
صعوبات في التنفس

• كنت تعاني من إحتباس السوائل (انتفاخ الرجلين،  
الكاحلين وراحتي القدمين)

• كنت تعاني من قصور في القلب أو من ضغط دم  
مرتفع

• وجد لديك مرض النسيج الضام المختلط مثل الذئبة  
• وجد لديك مرض يؤثر على الهضم مثل إلتهاب  
القولون التقرحي أو مرض كرون

• كنت تجذز علاجاً طويلاً بدواء آخر، لأن  
الطبيب سوف يرغيب بإجراءفحوص منتظمة،  
خاصة إذا كنت بالغاً

• كنت تتناول أدوية مدرة للبول  
• وجدت لديك أية علامات لنزف في الجهاز الهضمي  
• كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء

الأطفال والمرأهقون:

لا يوصى بإستعمال إتودولاك تيقيع لدى الأطفال.

الفحوص والمتابعة:

من الجائز أن يقرر طبيب إجراء عدة فحوص دم،  
وظائف الكلى والكبد خلال فترة العلاج بالدواء.

التداخلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا كنت تناولت مؤخراً، أدوية  
أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية  
وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن  
ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

• أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

• أدوية ممیعة للدم مثل وارفارين

• أدوية المسماة چليکوزيدات القلب مثل دیچوکسین  
(العلاج مشاكل في القلب)

• سیکلولسپورین أو تاکرولیموس (المستعملان بعد  
عمليات زراعة أعضاء)

• میتوتریکسات (العلاج إلتهاب المفاصل الرثائي  
أو الصدفية)

• لیتیوم (العلاج الأمراض النفسية)

• میفپریستون (إيقاف الحمل)

• مضادات إلتهاب لاستيروئيدية أخرى مثل أسيپيرين،  
إيبوبروفن

• کورتیکوستیروئیدات مثل پریدنیزولون

• مضادات حيوية من فصيلة الكوينولونات  
(مثل، سیپروفلوکساسین، لیقوفلوكساسین،  
أوفلوكساسین)

• مضادات إكتئاب من فصيلة المثبطات الإنقائية  
لإعادة إمتصاص السيروتونين (SSRI)

• أدوية مضادة لتكيس الصفيحات الدموية لمنع تختثر  
الدم (مثلاً، أسيپيرين، دیپریدامول، کلوبیدوجريل)

• أدوية مدرة للبول

• زیدوڤودین (العلاج HIV)

إستعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام أو بعدها.

الحمل والإرضاع:

• إذا كنت في فترة الحمل، تعتدين بأنك حامل،  
تحاولين أن تصبحي حاملاً أو في فترة الرضاعة  
- توجهي للطبيب قبل إستعمال الدواء.

• إن إستعمال الدواء من شأنه أن يصعب حصول  
الحمل. يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تخاطرين أو  
تجدين صعوبة لحصول الحمل.

• لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت في الثلث الأخير  
من الحمل.

• لا يجوز إستعمال الدواء في الثلثين الأولين من  
الحمل إلا إذا أصدر لك الطبيب تعليمات مغایرة  
لذلك.

• يتوفّر لهذا المستحضر عرض جانبي محتمل للتصرّر  
الكلّى لدى الجنين وقلة السائل السلوكي إبتداء من  
الأسبوع الـ 20 للحمل. يوصى بالإمتناع عن  
إستعمال مستحضرات من فصيلة الـ NSAIDs

إبتداء من الأسبوع الـ 20 للحمل وإستشارة فرد  
من الطاقم الطبي إذا دعت الحاجة.

• لم تثبت سلامة إستعمال الدواء لدى النساء  
المرضعات. إذا كنت في فترة الرضاعة - راجعي  
الطبيب.

السيادة وإستعمال الماكولات:

قد يسبب إتودولاك تيقيع النعاس، الإرهاق، الدوار  
وإضطرابات في الرؤية. إذا شعرت بهذه الأعراض  
فلا يجوز السيادة أو تشغيل الماكولات الخطرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على لكتوز. إذا قيل لك في الماضي من  
قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة،  
توجه لطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم  
في القرص وبالتالي يعتبر خال من الصوديوم.

يحتوي الدواء على المادة الملونة، Allura Red AC،  
التي قد تؤدي إلى ردود فعل تحسّبية.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات  
الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي  
إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة  
العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل  
الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي:

مضاد الرثى: علاج إبتدائي قدره 1200-800 ملغ  
لليوم مقسم إلى 4-2 جرعات دوائية ومن ثم علاج  
داعم بجرعة دوائية قدرها 1200-600 ملغ لليوم

مقسمة إلى 4-2 جرعات دوائية.

يتبع

## تنمية

تسكين الآلام: علاج إبتدائي قدره 400 ملخ لليوم ومن ثم 400-200 ملخ كل 6-8 ساعات أو 600 ملخ مرتين في اليوم ومن ثم 600 ملخ مرة - مرتين في اليوم، حسب الحاجة.

**لا يجوز تجاوز جرعة دوائية إجمالية قدرها 1200 ملخ لليوم!**

إذا كنت مسنًا، يتأكد الطبيب من أنك تتناول الجرعة الدوائية الأكثر إنخفاضاً وللفترة الزمنية الأقصر، بسبب خطورة حدوث أعراض جانبية خطيرة.

**لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.**

- يجب بلع الدواء بشكله الكامل مع كأس من الماء.
- بالإمكان شطر الأقراص.
- لا توفر معلومات بخصوص المضخ/السحق/الهرس.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك. أعراض فرط الجرعة الدوائية هي: صداع، غثيان وتقيء، ألم في أعلى البطن (فوق السرة)، تقيؤ الدم، توهان، إثارة، سبات، نعاس، دوار، طنين في الأذنين (tinnitus)، إغماء وأحياناً إختلالات.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول جرعة دوائية حالاً عند تذكرك بذلك إلا إذا اقترب موعد تناول الجرعة الدوائية التالية. لا يجوز تناول جرعتين دوائيتين معاً للتعويض عن الجرعة الدوائية المناسبة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالة الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

**(4) الأعراض الجانبية:**

كما بكل دواء، إن إستعمال إتودولاك تيقيع قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أي منها.

**يجب التوقف عن إستعمال الدواء ومراجعة الطبيب حالاً في حال:**

- قاسيت من فساد المعدة أو الحرقان
- ظهور ألم في الجزء العلوي من البطن، كنت تتقىأ دم، ظهور دم في البراز، تزف من فتحة الشرج، إلتهاب في المعي، تقرحات في الفم
- كنت تعاني من ردود فعل تحسسية مثل طفح، حكة، حويصلات في الجلد، فقدان اللون (شحوب)، إنتفاخ، صفير أو ضيق في التنفس
- ظهور إلتهاب السحايا العقيم (تصلب في الرقبة، صداع، غثيان أو تقيء، سخونة، توهان)، بلغ خاصة لدى مرضى يعانون من الذئبة أو من مرض آخر في النسيج الضام المختلط
- ظهور متلازمة ستيفنس - جونسون (نادرًا جدًا) إلتهاب أو حويصلات في الجلد، في الفم أو في اللسان و/أو إلتهاب في العينين مترافق بحساسية زائدة للضوء حيث يمكن أن تكون هذه الأعراض شديدة وتترافق بشعور عام غير جيد.

**أعراض جانبية إضافية:**

• غثيان أو تقيء، إسهال، نفحة، إمساك، تفاقم إلتهاب المعي (colitis) أو مرض كرون

• إلتهاب المعدة

• إلتهاب البنكرياس (نادرًا جدًا)

• إنتفاخ، ضغط دم مرتفع وقصور في القلب

• سخونة، ضعف عام، الشعور بوعكة، ضيق في التنفس، رؤية غير سلية، صداع، شعور غير اعتيادي مثل، حرق أو وحza في اليدين أو في راحتي القدمين، إكتئاب، إرتباك، هذيان، طنين في الأذنين (tinnitus)، دوار (بما في ذلك فيرتيغو)، إرهاق، رحقة، صعوبات في النوم (أرق)، نعاس

• فقر الدم، ألم في الحنجرة، سخونة، نزف غير متوقع

• إصفرار الجلد أو بياض العين

• زيادة الحاجة للتبول، صعوبة في التبول أو فقدان لون البول

• تغيرات في وظائف الكبد وتغيرات في الدم

• يمكن الكشف عنها فقط بواسطة فحوص الدم

• إلتهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)

• الشعور بضربات قلب سريعة (palpitations)

• زيادة طفيفة في الخطورة لحدوث نوبة قلبية أو سكتة

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

**التبيغ عن أعراض جانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابةهم بالتسمم. لا تسبب التقىء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامات.

• إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

**6) معلومات إضافية**

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضًا:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, povidone, hydroxypropylmethylcellulose,

magnesium stearate, titanium dioxide, colloidal silicon dioxide,

polyethylene glycol 6000, Macrogol, FD&C red #40/Allura Red AC

aluminum lake, polysorbate 80, FD&C blue #2 aluminium lake, D&C yellow #10 aluminium lake.

يحتوي كل قرص على 142 ملخ لكتوز مونوهيدرات

و- 0.67 ملخ حتى 1 ملخ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

قرص على شكل كبسولة، مطلي بلون وردي، مع خط للشطر في جانب واحد للقرص وبدون طباعة في الجانب الثاني.

تحتوي كل علبة على 30 قرصاً.

**اسم المنتج وصاحب الإمكانيات وعنوانه:**

تبليغ إسرائيل م.ض، شارع دفوره هنتفيه 124، تل أبيب 6944020.

تم إعداد هذه النشرة في تموز 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

131.63.30998

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه

النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن

الدواء مخصص لكلا الجنسين.

ETOD TAB PL SH 090821