

أدوية لعلاج الإكتئاب والأدوية التي تجبر على الفعل (مثل: أدوية للنوم، للنهدة ومسكنت الألام القوية). من شأن تأثيرها المهدئ أن يتزايد عند الإعطاء المتزامن مع ستونارون.

إستعمال الدواء والطعام

يجب بلع القرص بعد الأكل مع أي مشروب.

إستعمال الدواء واستهلاك الكحول

المشاركة بين ستونارون والكحول يزيد من التأثير المخدر لكل واحد منها، لذلك لا تشرب الكحول أثناء تناول ستونارون.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حاملاً قد تكون حاملاً أو تحاولين الحمل، يجب استشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.

يجب إستعمال ستونارون أثناء الحمل فقط بتعليمات صريحة من الطبيب، إذا كنت مرضعة، لا يجوز إستعمال الدواء.

نظراً لأنه من غير المعروف ما إذا كان ستونارون يُطرح في حليب الأم، فلا يجوز إستعمال هذا الدواء في فترة الإرضاع.

السيادة واستعمال الماكولات:

قد يؤدي إستعمال هذا الدواء، خاصة في بداية العلاج إلى النعاس وبالتالي يضعف من قدرة رد الفعل وبالتالي يتطلب الحذر عندقيادة المركبة، وتشغيل الماكولات الخطرة وأي نشاط يتطلب الانتباه، بالنسبة للأطفال يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي الأقراص على سكروز وفاكتور، إذا قال لك طبيبك أنك تعانى من عدم تحمل لسكراتيات معينة، استشير الطبيب قبل البدء باستعمال الدواء، يحتوى كل قرص على: 158.8 ملг لكتوز مونوهيدرات و 15 ملг سكروز، الأمر الذي يجب أنذه في الحسبان لدى مرضى السكري.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب، عليه الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوزتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

شكلتناول - يجب بلع القرص بعد الأكل مع أي مشروب.

لا تغير المقدار الدوائي الذي وصف لك من تلقاء نفسك، إذا كنت تعتقد أن تأثير الدواء ضعيف جداً أو قوي جداً، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي، بإمكانك شطر القرص لتسهيلتناوله، لكن ليس من أجلتناول جرعة دوائية جزئية، يُرجى إستعمال مهار لشطر الأقراص من أجل شطر القرص، لا تتوفر معلومات حول السحق/المضخ.

إذا تناولت بالخطأً مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأً من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

قد تتمثل جرعة أكبر مما ينبعي من ستونارون أقراص بالعلامات والأعراض التالية: تغييرات في الوعي التي تتراوح من النعاس وحتى فقدان الوعي وغيبوبة، تقيؤات، ضعف العضلات أو عدم تناسق وإختلالات، ضغط دم منخفض، تم التبليغ عن وفاة فيما يتعلق بفترط الجرعة الدوائية لـ ستوناريزين (Cinnarizine). توجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تشك أنك تناولت جرعة دوائية مفرطة.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

مستحضرات - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

اسم الدواء شكله وعياره

ستونارون™ أقراص، 25 ملخ

سيناريزين 25 ملخ

ال المادة الفعالة وكميتها في كل قرص: Cinnarizine 25 mg

• المواد غير الفعالة وموادات الحساسية: أنيز البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستخدم ستونارون لعلاج:

• أعراض الغثيان والدوار الناجمان من مرض مينيير (Ménière's disease) وإضطرابات أخرى تتعلق ببعض التوانر في الأذن الداخلية وبداء السffer.

• التهيج وإضطرابات الدوران في الأذن الداخلية (طنين في الأذنين، دوار، حرکات سريعة لا إرادية للعينين وغثيان، تعرق يترافق بتقيؤ).

• بمرض مينيير (Ménière's disease). كذلك يُستخدم ستونارون أيضاً للوقاية من داء السffer.

الفصيلة العلاجية: مضاد للدوار (فيزيجو)

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• لدى متعالجين يعانون من الإكتئاب ولدي متعالجين يعانون أو عانوا في الماضي من مرض باركينسون.

• تكت حساساً (أثيرجي) لل المادة الفعالة أو وكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المقصولة في الفقرة 6 "معلومات إضافية".

• أصبح مؤخراً بذئبة قلبية.

• الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 5 سنوات.

• يجوز الإستعمال المتواصل فقط تحت إشراف طبي.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ ستونارون إحكام للطبيب إذا:

• كنت تعانى من مرض باركينسون، يجب إعطاء ستونارون فقط في حال

فاقت الفاشدة الخطورة المحتملة عند تفاقم المرض.

• يجب إبلاغ الطبيب والصيدلي عن أي مرض آخر أو حساسية.

الأطفال والمراهقون:

الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 5 سنوات.

التدخلات / التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية

بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأشخاص إذا كنت تتناول:

٥ كيفية تخزين الدواء؟

تحجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و مجال رؤية الأطفال وأو الرضيع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقنية بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب تخزين دون 25 درجة مئوية.

٦ معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch, sucrose, talc, cottonseed oil hydrogenated, polyvidone K90

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة -

قرص أبيض، مدوّن، محذّب من كلا جانبيه، ذو خط للشطر، مع الكتابة S/25 في جانب واحد و JANSSEN في الجانب الآخر.

الأقراص معبأة ضمن لوحيات (بليستر). في كل علبة 25 قرصاً.

المستورد وصاحب الإمتياز وعنوانه: جيبي - سي هيلث كير م.ضن،
كيبوت شفافيم 6099000. إسرائيل.

تم إعدادها في شباط 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 312621879.

من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء منخص لكل الجنسين.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب الموااظنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إذن استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالة الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء،

استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤ الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ستونارون قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعانى أي منها.

الأعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

رد فعل تحسسي يتجلّى بإلتفاخ الوجه أو الحنجرة، شرى، تهيج، إحمرار أو حويصلات على الجلد. يجب التوجّه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن.

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• نعاس

• زيادة في الوزن

• غثيان

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

• نوم في الليل أطول من المعتاد

• تقيّدات

• فرط التعرق

• إرهاق

• ظهور آفات مدورّة حمراء وحادة أو طفح حاك على الجلد أو ظهور نقاط بلون رمادي-أبيض داخل الفم.

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000

• ألم في أعلى البطن، عسر هضم

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) – أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000

• مشاكل في الحركة، مثل حرّكات انتفاضية، تصلب العضلات، إرتجاف - تُعرف هذه الأعراض كأعراض خارج الهرمي.

• مشاكل في الكبد التي تسبّب إصفرار الجلد أو العينين (يرقان).

• ظهور آفات حمراء ومدورّة على سطح الجلد أو طفح يظهر على مناطق الجلد التي تعرضت للشمس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بإمكان النتائج عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للنتائج عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>