

كوروسان 75 ملغ أقراص

المادة الفعالة:

كل قرص يحتوي على 75 ملغ من ديبيريديمول (Dipyridamole).

لفاتمة المواد الخبز فعالة - أنظر البند 6، "معلومات إضافية" في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصِف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الصحية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- كإضافة لمضادات تخثر فموية لمنع إصمام خثاري (thromboembolism) المتعلق بصمامات قلب اصطناعية.

- كبديل لإختبار الإجهاد عند تصوير القلب بواسطة التالسيوم، خاصة لدى المرضى الذين لا يستطيعون القيام بمجهود بدني أو مرضى الذين تم منعهم من القيام بمجهود بدني.

الفصيلة العلاجية:

متبطلات تراكم الصفائح الدموية باستثناء هيبارين.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة dipyridamole أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (أنظر البند 6، "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من مشاكل جسيمة في القلب (نوبة قلبية حادة).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

أخبر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كوروسان.

يجب توخي الحذر عند تناول كوروسان إذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض (انخفاض ضغط الدم)، وذلك لأن جرعات عالية يمكنها أن تسبب توسع الشرايين الصغيرة والأوردة (توسع الأوعية الدموية الطرفية)، الذي يؤدي لانخفاض حاد في ضغط الدم.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. خاصة إذا كنت تستعمل كوروسان سوية مع أدوية أخرى التي تستعمل لمنع التخثر، في هذه الحالة يفضل إجراء فحص دم لفحص وظائف التخثر.

استعمال الدواء مع الطعام

يجب تناول الدواء على معدة فارغة، قبل ساعة من الوجبة.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تتقدين انه من الممكن أن تكوني حاملاً أو تخططين للحمل، استشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

لا توجد في المراجع أي معلومات تتعلق بتأثير سُمِّي على الأم والجنين عند استعمال النساء الحوامل لـ dipyridamole.

السياقة واستعمال الماكينات:

لا يؤثر كوروسان على القدرة على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة حول قسم من مركبات الدواء:

كوروسان يحتوي على لاكتوز أحادي الهيدرات - لاكتوز هو سكر. إذا أخبرك الطبيب أنه يوجد لديك نقص في تحمل سكريات معينة، قم باستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو 4-6 أقراص يوميًا، بجرعات منفردة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به**فترة العلاج -** سوف يقوم طبيبك بإرشادك حول مدة العلاج.**طريقة الاستعمال -** يجب تناول الدواء عن طريق الفم مع الماء، على معدة فارغة، ساعة قبل الوجبة. من أجل تسهيل البلع، يمكن، عند الحاجة، شطر القرص للاستعمال الفوري. يجب بلع التصفين سوية فوراً بعد الشطر.**إذا تناولت جرعة مفرطة بالخطأ**

قد تعاني من اضطرابات المعدة أو الأمعاء (الجهاز الهضمي) والصداع، والتي ستختفي بسرعة. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع لطف الدواء عن طريق الخطأ، توجه للطبيب حالاً أو لخدمة طوارئ المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة دوالية مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد واستشر الطبيب. إذا لم تكن متأكدًا بخصوص استخدام الدواء، توجه للطبيب أو الصيدلي.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

حتى وإن طرا تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب.

لا تتناول الأدوية في الغمّة! يجب تشخيص طابع الدواء والمقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظرات الطبية إذا احتجت لها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال كوروسان 75 ملغ قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. فمن الممكن ألا تعاني أياً منها. الأعراض الجانبية التالية محتملة وتم ترتيبها حسب شيوعها:

شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 متعالجين)
الآم الرأس، دوخة، اسهال، غثيان.

شائعة (قد يؤثر على حتى 1 من كل 10 متعالجين)

ذبحة صدرية (الآم في الصدر)، تقيؤ، طفح (عندما تظهر نقاط أو جروح بأنواع مختلفة على سطح الجلد)، ميلجيا (الآم العضلات).

شيوع غير معروف (لا يمكن تقدير شيوعها بناءً على المعلومات الموجودة)

قلة الصفائح (انخفاض عدد الصفائح الدموية)، حساسية مفرطة (الأرجية)، وذمة وعائية (حالة تشبه أرتيكاريا مصحوبة بانتفاخ في الجلد وبالاعضية المخاطية)، تاخيكارديا (تسارع نبضات القلب)، انخفاض ضغط الدم (ضغط دم منخفض)، تورّد، التهاب القصبات (تضيق الشعب الهوائية التي تؤدي لصعوبة شديدة في التنفس نتيجة لانخفاض تدفق الهواء)، الشرى، نزيف حاد خلال جراحة أو بعدها. ظهرت حالات تفاقم في أعراض مرض الشرايين التاجية وظهور ديبيريديمول في حصى المرارة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يدرج في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>**5. كيفية تخزين الدواء؟**

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأل الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس شهر.
- يجب التخزين تحت 25°C.
- يمنع إلقاء هذا الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لست بحاجة لها. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Maize starch, lactose monohydrate, talc, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

كوروسان يأتي على شكل أقراص 75 ملغ.

يحتوي كل علبة على 30 قرص داخل لويحة (بليستر) (3 لويحات ذات 10 أقراص).

المنتج:

ليورتوربو فارماكولوجيكو ميلانس اس.ار.ال، فيا مونتروسو، كرونو بروتوسلا، إيطاليا.

صاحب الإمتياز:

راز روكوت م.رض، شارع همتيخت 6، كاديما، إسرائيل.

رقم التسجيل: 167-53-35927-00

تمت المصادقة عليها في حزيران 2021

RAZP3698-00