

РЕЛАКСИН

Таблетки, Покрытые Оболочкой

Активное вещество в каждой таблетке, покрытой оболочкой:

Valerian dry extract 500 mg

Валериана (сухой экстракт корня растения) 500 мг

Вспомогательные ингредиенты в препарате - см. раздел 6 "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Препарат не предназначен детям до 12 лет. Правильно применяйте препарат. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

Препарат применяется как успокоительное при состояниях напряжения, нервозности и бессонницы.

Фармакологическая группа: Успокоительное средство, на растительной основе.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

❑ Не применяйте данный препарат:

- Если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к активному веществу (валериане) или к одному из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.
- Если Вы страдаете непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или дефицитом фермента sucrase-isomaltase.
- Детям до 12 лет.

Особые предупреждения, касающиеся применения данного препарата

- Не применяйте данный препарат часто или в течение продолжительного срока без консультации с врачом.
- Если Вы чувствительны к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам, сообщите об этом врачу до начала приема препарата.
- **Перед лечением Релаксином сообщите врачу, если Вы страдаете бессонницей очень продолжительный период времени.**

❑ Если Вы принимаете или недавно принимали другие препараты включая препараты, отпускаемые без рецепта, или пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. В особенности следует поставить в известность врача или фармацевта, если Вы принимаете: дополнительные снотворные препараты, препараты для лечения тревожных состояний, наркотические анальгетики, дополнительные успокаивающие препараты.

❑ Применение препарата и пища

Следует принимать препарат с едой или до еды.

❑ Применение препарата и употребление алкоголя

Во время лечения препаратом **не пейте вино** или алкогольные напитки.

❑ Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед приемом препарата, поскольку нет достаточной информации о безопасности препарата при этих состояниях.

❑ Вождение транспортных средств и управление механизмами

Релаксин может повлиять на Вашу способность водить транспортное средство или управлять механизмами, и может вызвать сонливость в течение дня. Если это происходит, не водите транспортное средство и не управляйте механизмами.

❑ Важная информация о части ингредиентов препарата

Препарат содержит глюкозу и лактозу.

Если врач сообщил Вам, что Вы страдаете повышенной чувствительностью к определенным сахарам, следует посоветоваться с врачом перед приемом препарата.

3. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ?

Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены относительно способа применения.

Принятая дозировка:

У взрослых и детей старше 12 лет: 1 или 2 таблетки примерно за полчаса до сна. Максимум - 2 таблетки в день.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Данный препарат не предназначен для детей младше 12 лет.

Нельзя толочь/делить/разжевывать таблетку, поскольку она покрыта оболочкой. Нужно проглатывать препарат, запивая его водой.

Проверки и наблюдения: При длительном приеме препарата требуются периодические врачебные проверки и наблюдения.

Если Вы по ошибке превысили дозу или ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Не применяйте препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу **каждый раз** перед приемом препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу использования данного препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым другим лекарством, применение Релаксина может вызывать побочные явления у части пациентов.

Если Вы страдаете от побочного явления, посоветуйтесь с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или, зайдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не пользуйтесь препаратом по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке/блистерной упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре ниже 25°C.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В дополнение к активному веществу, препарат также содержит: Microcrystalline cellulose, hypromellose, talc, lactose, glucose, titanium dioxide, glycerol, magnesium stearate, colloidal silicone dioxide. Каждая таблетка содержит 75 мг глюкозы и 150 мг лактозы.
- **Как выглядит препарат и наково содержимое упаковки?** Каждая упаковка содержит 15 или 30 белых таблеток, покрытых оболочкой.
- Владелец лицензии и его адрес: Трима, Израильские Фармацевтические Продукты Маабарот Лтд., Маабарот 4023000, Израиль.
- **Производитель:** Laboratoires Pharmaceutiques Trenker SA, 32, Avenue Thomas Edison, 1402 Thines, Belgium
- Откорректировано в Апреле 2021, в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения.
- Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 115.58.29788.00