

פיגליטזון אינובמד 15

טבליות

פיגליטזון אינובמד 30

טבליות

פיגליטזון אינובמד 45

טבליות

כל טבליה של פיגליטזון אינובמד 15 מכילה:

פיגליטזון הידרכולוריד 15 mg "מ"ג

כל טבליה של פיגליטזון אינובמד 30 מכילה:

פיגליטזון הידרכולוריד 30 mg "מ"ג

כל טבליה של פיגליטזון אינובמד 45 מכילה:

פיגליטזון הידרכולוריד 45 mg "מ"ג

לשימוש החומרם הבaltı פעילים והאלרגנים בתכשיר, ראה " מידע נסף"

בסעיף 6. כמו כן, ראה " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוופה"

בסעיף 2 של עلون זה.

קרא בעון את העлон עד סופו בטרם תשתחש בתוופה.

עלון מה מכך מידע מסווג על התוופה. אם יש לך שאלות נוספות נספור, פנה

אל הרופא או אל הרוקח.

תוופה זו נרשות לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה

להזיק להם אפילו אם וואה לך כי מצבם הרפואי דומה.

התוופה אינה מיועדת לילדיים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

1. מה מיועדת התוופה?

התוופה מיועדת לטיפול בסוכרת מסוג 2 (לא תלות באינסולין) בחולים

שרמת הסוכר שלהם בדם לא ניתן לאיזון באמצעות טיפול עם מטפורמין

לבדו.

פיגליטזון אינובמד יונבם בדם לא ניתן לאיזון באמצעות דיאטה או פעילות

ושרמת הסוכר שלהם בדם נרשות לטיפול עם תרופות אחרות גופנית. כמו כן, פיגליטזון אינובמד ניתן גם בשילוב עם מטפורמין (ג'גון מטפורמי, סולפונילאוריאה או אינסולין) כשלא

השיגו שליטה מסקפת ברמת הסוכר בדם על ידי שיפור תגבורת

פיגליטזון אינובמד עוזר לאיזון את רמת הסוכר בדם על ידי שיפור תגבורת

תאי הגוף לאינסולין המיצר בגוף.

קבוצה תרופיתית:

התוופה שייכת לקבוצת התיואolidינודינום לטיפול בסוכרת.

2. לפניה השימוש בתוופה:**אין להשתמש בתוופה אם:**

• דיוועה רגשותת לפיגליטזון או לאחד ממרכיבי התוופה (ראה סעיף 6).

" מידע נסף" וסעיף 2 " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוופה".

• אתה סובל או סובל בעבר מאי ספיקת לב.

• אתה סובל מחלת לב.

• אתה סובל מחלת כבד.

• אתה סובל מחלת כבד, בחליה או הקאה.

• אתה סובל מחלת כבד או לב. לפני תחילת הטיפול עם פיגליטזון

איונבם, יש לרער בדיקות דם להערכת חפקודו הבד. ייתכן והירה צורן

לחזור על הבדיקות במהלך הטיפול. באנשים מסוימים שבסבלו מוסכרים

לאירועים משל עצמם, לרבות מחלת כבד או מחלת כבד. יש לדוח לרופא

איונבם ואינסולין, התפתחה אי ספיקת לב. יש לדוח לרופא נסימנה

בבלתי רגיל או עליה חרדה במשקל הגוף או בעקבות מקומית (נעיפות).

اذהרונות מיחוזדות הנוגעות לשימוש בתוופה:**פני הטיפול בפיגליטזון אינובמד, ספר לרופא אם:**

• אתה סובל מבעיות לבן או מבעיות לבן קרטינה. ב迈向ה והחדרת מכיל לכתה.

• אתה סובל מחלת כבד, ב迈向ה או מחלת כבד. ב迈向ה והחדרת מכיל לכתה.

• אתה סובל מחלת כבד, ב迈向ה או מחלת כבד. ב迈向ה והחדרת מכיל לכתה.

• אתה סובל מחלת כבד או לב. לפני תחילת הטיפול עם פיגליטזון

איונבם, יש לרער בדיקות דם להערכת חפקודו הבד. ייתכן והירה צורן

לחזור על הבדיקות במהלך הטיפול. באנשים מסוימים שבסבלו מוסכרים

לאירועים משל עצמם, לרבות מחלת כבד או מחלת כבד. יש לדוח לרופא

איונבם ואינסולין, התפתחה אי ספיקת לב. יש לדוח לרופא נסימנה

בבלתי רגיל או עליה חרדה במשקל הגוף או בעקבות מקומית (נעיפות).

اذהרונות בתרופה ונזון:

• ב迈向ה ואתה נוטל תרופות נוספות לסוכרת, יש לנתקט באמצעות סוכרת.

למיינית התפקידו מצב של סוכרת מוגברת דם (היפוגליקמיה).

• יש לרער בדיקות דם בבדיקות שתיקבע על ידי הרופא המטפל מאחר

ועלולה להיות ירידת הסוכר דם (אנמיה).

• בחולים המטופלים בתוופה זו, ב迈向ה ונוטל תרופות וגdotות דלקת העולות גם

הן לגורום לאציגות נזולים ולבסוף מותם ברופא.

• אתה סובל מחלת עיניים האופיינית לסוכרתים, הנקרתת Macular edema

• את סובל מחלת עיניים האופיינית לסוכרתים, הנקרתת Macular edema

• עלול לזרום לביצוע ולהעלוות לאיכות היכנס להרין. על מנת להימנע מהרין ב迈向ה מותן, מומלץ להשתמש בתכשירים למונעת הרין.

• אתה סובל מחלת כבד או לב. לפני תחילת הטיפול עם פיגליטזון

איונבם, יש לרער בדיקות דם להערכת חפקודו הבד. ייתכן והירה צורן

לחזור על הבדיקות במהלך הטיפול. באנשים מסוימים שבסבלו מוסכרים

לאירועים משל עצמם, לרבות מחלת כבד או מחלת כבד. יש לדוח לרופא

איונבם ואינסולין, התפתחה אי ספיקת לב. יש לדוח לרופא נסימנה

בבלתי רגיל או עליה חרדה במשקל הגוף או בעקבות מקומית (נעיפות).

3. כיצד השתמש בתוופה?

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתחאת להוראות הרופא.

עליך לבדוק אם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע בשינויים או אופן הטיפול

בתכשיר.

יש להשתמש בתוופה זו בזומנים קבועים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

минון

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אופן השימוש המקובל בדרך כלל הוא כדלקמן:

טבליה אחת של פיגליטזון אינובמד 15 או פיגליטזון אינובמד 30 מ"ג

בימיים חמוץ הרופא יעלה את המינון עד למקסימום של 45 מ"ג

עם ביום.

• ב迈向ה ופיוג'יליטזון אינובמד נלקח בשילוב עם תרופות אחרות מתחילה לטיפול

במושגים (ג'גון איסולין, קליפוראמיד, גליקלאלמיד, טולבוטאמיד), הרופא יקבע אם נדרש טיפול ייעילות פיגליטזון

איונבם 3 עד 6 חודשים לאחר תחילת הטיפול.

• ב迈向ה ואתה נמצא תחת דראטה מיחודה לסוכרתים, יש להתמודד בה

לאורן נטילת פיגליטזון אינובמד.

• יש לרער בדיקות דם שగורתיות ב迈向ן השימוש עם פיגליטזון אינובמד

על מנת לעקוב אחר תקינות תפקודו הבד.

• יש לעקוב אחר משקל הגוף ובתדירות קבועה. ב迈向ה ויישנה עליה במשקל

הגוף יש להיוועץ ברופא.

אין לעובר על המונה המומלצת:**כתייה/חציה/לייסת**

אין לחזות את הטבליות בהיעדר קו ח齊יה, אין מידע לגבי כתיה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטוח בוגע בשינויים בראייה בזמן הטיפול.

לזהירות ב迈向ה ואתה חשב לילקוריום בראייה בזמן הטיפול.

במיחוזה אם אתה לוקח:

• גמפרברוזיל (הזרתת כולסטרול)

• ריפאמפיצין (טיפול בשחתת חייזרים נספים)

ב迈向ה ואתה נטל את מהטורופת היללו, יש לבדוק את רמת הסוכר בדם

על מנת להעיר את המינון המתאים של פיגליטזון אינובמד.

שימוש בתוופה ונזון:

ניתן ליטול פיגליטזון אינובמד עם מזון או בלעדיו. יש לבלווע עם כוס מים.

הריון והנקה:

אם את בהריון, חוותת שאת בהריון או מתכנתה הריון, מניקה או מתכנתה

להנקי, ספרי על גישות לנקה, מאחר והחדרת מכיל לכתה.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לך לחתת להרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות

ללא מרשם רופא ותוסף תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיחוזה אם אתה לוקח:

• גמפרברוזיל (הזרתת כולסטרול)

• ריפאמפיצין (טיפול בשחתת חייזרים נספים)

ב迈向ה ואתה נטל את מהטורופת היללו, יש לבדוק את רמת הסוכר בדם

על מנת להעיר את המינון המתאים של פיגליטזון אינובמד.

שימוש בתוופה ונזון:

ניתן ליטול פיגליטזון אינובמד עם מזון או בלעדיו. יש לבלווע עם כוס מים.

הריון והנקה:

אם את בהריון, חוותת שאת בהריון או מתכנתה הריון, מניקה או מתכנתה

להנקי, ספרי על גישות לנקה, מאחר והחדרת מכיל לכתה.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לך לחתת להרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות

ללא מרשם רופא ותוסף תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיחוזה אם אתה לוקח:

• גמפרברוזיל (הזרתת כולסטרול)

• ריפאמפיצין (טיפול בשחתת חייזרים נספים)

ב迈向ה ואתה נטל את מהטורופת היללו, יש לבדוק את רמת הסוכר בדם

על מנת להעיר את המינון המתאים של פיגליטזון אינובמד.

שימוש בתוופה ונזון:

ניתן ליטול פיגליטזון אינובמד עם מזון או בלעדיו. יש לבלווע עם כוס מים.

הריון והנקה:

אם את בהריון, חוותת שאת בהריון או מתכנתה הריון, מניקה או מתכנתה

להנקי, ספרי על גישות לנקה, מאחר והחדרת מכיל לכתה.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לך לחתת להרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות

ללא מרשם רופא ותוסף תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיחוזה אם אתה לוקח:

• גמפרברוזיל (הזרתת כולסטרול)

• ריפאמפיצין (טיפול בשחתת חייזרים נספים)

ב迈向ה ואתה נטל את מהטורופת היללו, יש לבדוק את רמת הסוכר בדם

על מנת להעיר את המינון המתאים של פיגליטזון אינובמד.

שימוש בתוופה ונזון:

ניתן ליטול פיגליטזון אינובמד עם מזון או בלעדיו. יש לבלווע עם כוס מים.

הריון והנקה:

אם את בהריון, חוותת שאת בהריון או מתכנתה הריון, מניקה או מתכנתה

להנקי, ספרי על גישות לנקה, מאחר והחדרת מכיל לכתה.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לך לחתת להרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות