

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسَوِّق الدواء بدون وصفة طبيب

## كومبودكس، حبسو لآت

كل حبة صوية تحتوي على:

پاراسيتامول 500 mg

إيبوبروفين 150 ملغ

مواد غير فعالة ومبيات الحساسية (مستأجرة) في الدواء –
انظر للبند 2 "معلومات إضافية" في بند 2 "كيفية استعمال"
عن قسم من مبيعات الدواء".

أقرأ النشرة وبركان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات منمخصة عن الدواء. إذا
كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
عليك تناول الدواء وفقاً للتعليمات في البند 3 "كيفية استعمال
الدواء" في هذه النشرة.
استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.
عليك التوجه للطبيب إذا اشتت أعراض المرض أو لم تحسن
بعد 3 أيام.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

**كوميوكس** مخصص لتسكين الألم مثل: ألم الرأس، ألم الرأس
المرتبط بالتهبئية، ألم الرأس الناتج عن التوتر، ألم الجيوب
الأنفية، ألم الأسنان، ألم الظهر، ألم الحلق، ألم دورة شهرية، ألم
عضلات، الألم الروماتيزمي، الألم المرتبطة مع عمليات الإبراع.
بالتهاب المفصالي، يهدف لأعب لتسكين الألم المرتبطة مع
البرش والالتهاف، مخصص لتخفيف الحزارة.

**الفيصلة العلاجية:** يحتوي **كوميوكس** على پاراسيتامول
وإيبوروفين. پاراسيتامول هو مسكن للألم يخافض الحرارة.
ينتمي إيبوروفين لفصيلة أدوية التي تدعى مضادات التهاب
غير ستيرويدية (NSAIDs)، وهو مسكن للآلام ويقلل
الالتهاب(التضخم، احمرار أو ألم).

### 2. كيف استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

<p>• كنت حساساً (أرجي) للمادة/المواد الفعالة، لـ NSAIDs أخرى أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي تحتوي على الدواء (انظر البند 6).</p> <p>• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من نزيف في المستقبل (انظر البند 6).</p> <p>• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قرحة مضمية (قرحة) في الجهاز الهضمي.</p> <p>• كنت تتناول أدوية أخرى التي تحتوي على پاراسيتامول أو إيبوروفين.</p> <p>• كنت تعاني من فشل وظيفي أو مسكن للألم الكبد أو الكلى.</p> <p>• كنت تعاني من نزيف بوجية الدم في الدماغ أو نزيف نشط أخر.</p> <p>• كنت تعاني من مشاكل بإنتاج خلايا الدم.</p> <p>• عانيت من الربو، الشرى أو من ردود فعل أجنبية بعد تناول أسبيرين/حمض الأسيتيلساليسيليك أو NSAIDs أخرى.</p> <p>• كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.</p>
--

**تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء**

استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول **كوميوكس**.
معلومات الأمانات ومسكبات الألم مثل إيبوروفين قد تكون
مرتبطة بأعراض طفيف لاخطار لإجسامة بنوية قلبية أو سكتة

• قد يشوش تناول الدواء تنتج فحص البول لـ
5-hydroxydoileoacetic acid (5HIAA)، ويسبب
نتائج إيجابية خافتة. من أجل منع نتائج خاطئة لا تتناول
**كوميوكس** أو مستحضرات أخرى التي تحتوي على
پاراسيتامول قبل عدة ساعات أو أثناء جمع عينة البول.

**الأطفال والمراهقون:**

الدواء مخصص للبنين والأطفال فوق حبل 12 سنة.

**العاملات قبل الأدوية:**

إذا كنت تأخذ، إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أو إذا كان
المتكمن أن تأخذ أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة
**طبيب وإضافات تغذية:** أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
خصوصاً إذا كنت تأخذ:

• أدوية تؤدي مع تحطيم الدم (تسييع الدم/التنعيم مثل
أسبيرين/)

• حمض الأسيتيلساليسيليك، وارفارين، تيكلوتنوم،
أدوية لعلاج السرع أو الاختلاجات مثل فينيطوين.

• كلورامفينكول (مضاد حيوي) لعلاج حالات عدوى
الأنبين والعينين)؛

• بيريبيديس، دواء لعلاج الصداع؛

• أسبيرين/حمض الأسيتيلساليسيليك، وسيليبات أو أدوية أخرى
من عائلة NSAIDs.

• أدوية لتخفيف ضغط الدم المرتفع (مقبط مثل ACE مثل
كينوليفين، حاجيات بيثا مثل أتينولول، حاجيات مستقبلية
الأنجيوتنسين II مثل لوسارتان)

• أدوية لعلاج مشاكل قلب أو مثل نيتروجليسين.

• مدرات بول.

• بوليبيوت، دواء المستعمل لعلاج أنواع معينة من الاكتئاب.

• دواء تروبيكومات، دواء المستعمل لعلاج التهاب المفصالي
وأنواع معينة من الربو.

• كورتيكوستيرويدات مثل بريدنيزون، كورتيزون.

• ميثوكلوبراميد، بروبيثالين.

• تاكروليموس أو سيكلوسبورين، أدوية لتثبيط جهاز المناعة.

• المستعملة/معدرة/أدوية الأعضاء.

• سوليفين، يوريا، دواء لعلاج السكري.

• مضادات حيوية معينة (مثل مضادات حيوية من فصيلة
الكوينولونات)

• قد تتأثر هذه الأدوية من قبل **كوميوكس** أو أنها قد تؤثر على

**فعاية كوميوكس**

من الممكن أن تضطر لتناول جرعات مختلفة من أونيتهك، أو

لا تضطر لتناول أدوية أخرى.

من الممكن أن تؤخذ أدوية إضافية أو لا تتأثر من قبل استعمال
**كوميوكس**، لكن يجب دائماً استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل
بدء العلاج ب**كوميوكس** مع أدوية إضافية.

سبكون أدوية طبيبك أو الصيدلي معلومات إضافية بخصوص
ذلك وأيضا بخصوص أدوية إضافية التي يجب توخي الحذر
باستعمالها أو الامتناع عن تناولها أثناء استعمال هذا الدواء.

**الزواج والطمع**

يجب بلع الدواء مع كأس ماء، متلنى، مع أو بدون الطعام.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**

لا يجوز استهلاك مشروبات كحولية أثناء تناول الدواء.
دمج الكحول مع **كوميوكس** قد يؤدي لأضرار في الكبد.

**الحمل، الإبراع والحساسية:**

• إذا كنت حاملاً أو حامل مرصعة، تطيق أنك قد تتعنين حاملاً أو
تخططين للنحول في حمل. استشرى الطبيب أو الصيدلي قبل
بدء استعمال الدواء.

لا يجوز استعمال الدواء في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.
يجب الحذر إذا كنت في الأشهر السنة الأولى من الحمل.

لماذا المستحضر يوجد عرض جانبي محتمل كحرق كلوي
في الجنين ونقص السائل الأمنيوسي ابتداء من الأسبوع الـ
20 من الحمل، يوصى بتجنب استعمال المستحضرات من

عائلة ال- NSAIDs ابتداء من الأسبوع الـ 20 من الحمل

واستشارة شخص من الطاقم الطبي إذا لزم الأمر.

هذا الدواء قد يضر بالخاصية عند النساء اللذين هم مرضى
بهى لدى النساء اللواتي يحملون الدخول في حمل.

**السباحة واستعمال الآلات:**

يجب الحذر عند قيادة السيارة أو عند تشغيل آلات حتى تعرف
كيف يؤثر الدواء عليك.

بخصوص الأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة
الوالية أو من ألعاب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

**معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء**

تزيد من فعلة الشرج، براز أسود، قوي أو إسهال مومي.

• نزيف من الفم، الشفتين أو السنن التي قد يؤدي لصعوبات بما في
تنفس.

• ريو، صغبر، حصى تنفس.

• قد تم التبليغ عن حالات نادرة أو جزاء حدوث فعل جلدية وخيمة بما
في ذلك تلك فجائية أو

• وخيمة، طفح جلدي، ثرى.

• حوصصات وخيمة، وتوريف في الشفتين، في العينين، في الفم، في
الأفم وفي الأعضاء التناسلية (ملاحظة من ستيفنس جونسون)

• رد فعل جلدي وخيم عدوى فطرية الحساسية الجهازية (DRESS)،

• أعراض تشتمل: طفح جلدي، حتى، انتفاخ اللغظ، التهاب، وارتفاع في
اليورينوات (نوع

من خلايا الدم البيضاء).

• حتى، شعور عام غير جيد، غثيان، ألم في المعدة، الرأس وريقة متصلة.

**أعراض جانبية شائعة:** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100)

• احتباس السوائل، انتفاخ

• رنين في الأذنين (طنين)

• غثيان أو قيء

• مشاكل قلبية أو أمراض الموصى بها

• قرحة أو ألم في الجزء العلوي من البطن

• إسهال

• طفح في الجلد

• ألم الرأس

• دوخة

• تغيرات في وظيفة الكبد أو الكلى (بمقي تحديدها في فحوصات الدم)

• عصبية

**أعراض جانبية غير شائعة:** (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000)

• انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء، حالات من النزيف مثل نزيف من الأنف، نزيف

• انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء، ارتفاع في عدد خلايا الدم،

• مشاكل في العينين مثل تنوش أو انخفاض الرؤية، تغيرات في روية الألوان

• ارتفاع في الكلى، ارتفاع في نسبة

• ارتفاع في الحساسية لردود الفعل التحسسية، وزمة وعائية(الأعراض قد تشمل تغير في

• نزيف غير طبيعي، قرحة في الكلى وفي الكلى الذي يسببها في سبب ضئرا

• وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة

• أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• أعراض علامات نجاح عدم أو تسبب

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا

• وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة

• أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• إذا تناول جرعة مفرطة من **كوميوكس** قد يسهب ضئرا
وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة
أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية:

كلن أي دواء، قد يسبب استعمال **كوميوكس** أعراضا جانبية لدى جزء من
المستخدمين. لا تتفرع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني

من أي واحد منها.

قد تظهر أعراض جانبي أيا كان. أخبر الطبيب أو الصيدلي.

**يجب إيقاف استعمال والتوجه فوراً إلى الأعراض الجانبية الوارئة في**
**المستحضرة في حال ظهور واحد أو أكثر من العلامات التالية:**

• قيء، شعورى أو مع جزئيات التي تبدو كترسبات القيوة.

• نزيف من فم، الشفتين أو السنن التي قد يؤدي لصعوبات بما في
تنفس.

• ريو، صغبر، حصى تنفس.

• قد تم التبليغ عن حالات نادرة أو جزاء حدوث فعل جلدية وخيمة بما
في ذلك تلك فجائية أو

• وخيمة، طفح جلدي، ثرى.

• حوصصات وخيمة، وتوريف في الشفتين، في العينين، في الفم، في
الأفم وفي الأعضاء التناسلية (ملاحظة من ستيفنس جونسون)

• رد فعل جلدي وخيم عدوى فطرية الحساسية الجهازية (DRESS)،

• أعراض تشتمل: طفح جلدي، حتى، انتفاخ اللغظ، التهاب، وارتفاع في
اليورينوات (نوع

من خلايا الدم البيضاء).

• حتى، شعور عام غير جيد، غثيان، ألم في المعدة، الرأس وريقة متصلة.

**أعراض جانبية شائعة:** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100)

• احتباس السوائل، انتفاخ

• رنين في الأذنين (طنين)

• غثيان أو قيء

• مشاكل قلبية أو أمراض الموصى بها

• قرحة أو ألم في الجزء العلوي من البطن

• إسهال

• طفح في الجلد

• ألم الرأس

• دوخة

• تغيرات في وظيفة الكبد أو الكلى (بمقي تحديدها في فحوصات الدم)

• عصبية

**أعراض جانبية غير شائعة:** (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000)

• انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء، حالات من النزيف مثل نزيف من الأنف، نزيف

• انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء، ارتفاع في عدد خلايا الدم،

• مشاكل في العينين مثل تنوش أو انخفاض الرؤية، تغيرات في روية الألوان

• ارتفاع في الكلى، ارتفاع في نسبة

• ارتفاع في الحساسية لردود الفعل التحسسية، وزمة وعائية(الأعراض قد تشمل تغير في

• نزيف غير طبيعي، قرحة في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب ضئرا

• وخيفا في الكبد وفي الكلى الذي يسببها في سبب متأخرة

• أكثر، قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

• اصفرار الجلد، أو العينين (يرقان).

• ارتفاع شدة في وزن الجسم، انتفاخ الكلىحون أو الرجليين.

• انخفاض في كمية البول.

• حركات عضلية لا واردة/تنتج، رعاش وانتفاجات، بطة في ردود الفعل الجانبية
والعاطفية.

• فقدان مؤقت للريوية في حركات العينين.

• أعراض عروق شمسى (مثل احمرار، حكة، انتفاخ، حوصصات) التي قد تظهر
منزى من المعتاد.

• مرض سريع أو غير منتظم (خفقان).

• فرط التعرق.

• أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض لا يتم بتقدير شيوعها بعد):

• طفح جلدي، متشنج، احمرار، مع توبات تحت الجلد وحوصصات المتواجدة
بشغل رئيسي في طباط الجلد، الجذع (الجزء العلوي من الجسم) والأطراف

• الطفيل، المصوب بحصى في بداية العلاج (acute generalised exanthematous pustulosis).

• أوقف العلاج ب**كوميوكس** إذا طورت هذه الأعراض وتوجه فوراً لعلاج طبي. انظر أيضا البند 2.

القائمة التي تظهر أعلاه تشتمل أعراض جانبية وخيمة التي قد تتطلب علاج طبي.
أعراض جانبية وخيمة هي نادرة في جرعات منخفضة من هذا الدواء وباستعمال
لفترة زمنية قصيرة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تتفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من
عرض جانبي لم تذكر في النشرة، استشر الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط
"دعونا نوثقوا لراضا بكم" **تحت إشراف** الموجود في الصفحة
الرئيسية لمرجع وزارة الصحة ([www.health.gov.au](http://www.health.gov.au))
الموجهة للاستشارة
الإنترنيتية للأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au>

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التعرض بيب حفظ هذا الدواء وكل دواخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول
أيدي الأطفال وأوالرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسيب البقايا بقدر
تستطيع.

• تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء) الذي يظهر
على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• **شروط التخزين:** لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. خزن
في العبوة الأصلية من أجل الحماية من الضوء.

• لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو سلة النفايات المنزلية. لسأل الصيدلي
على كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. سوف تساعد هذه الوسائل
في حماية البيئة.

### 6. معلومات إضافية