

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משוקת ללא מרשם רופא

קומבודקס®, קפלוית

כר קפלוית **מכילה:**

Paracetamol 500 מ"ג
איבופרופן 150 מ"ג
Ibuprofen 150 mg

חמרים בלתי פעילים ואלרגניים התרופה - ראה המרכיבים
"מידע נוסף" בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים" התרופה"

קרא בעיון את העלון על סופו ברטם תשמש בתרופה.
עלון זה מילן מידע המצטיי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

על"ך ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה.

היווע בקרוק אם אתה זקוק למד.
על"ך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמרים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

קומבודקס מיועד לשיכוך כאבים כגון: כאב ראש, כאב ראש הקשור לשינה, כאב ראש הנוגב ממח, כאב סינוס, כאב שיניים, כאב גב, כאב גרון, כאב מחזור, כאב שרירים, כאבים רואטמיים, כאבים הקשורים לפצדורזות נטוליות, דלקת מפרקים, למרק טנסיל, לשיכוך כאבים הקשורים להצטנות ולשפעת. מיועד גם להורדת חום.

קבועה תרפויטית:
קומבודקס מכיל פראצטמול ואיבופרופן, פראצטמול הוא משכך כאבים ומוציא חום. איבופרופן ישן לקבוצת התרופות הקנקרות נוגדי דלקות שאינם סטרואידים (NSAIDs) והוא משכך כאבים ומפחית דלקות (נפיחות, אדמומיות או כאב).

2. לפני השימוש בתרופה

אל תשתמש בתרופה אם:

<ul style="list-style-type: none">אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים, ל-NSAIDs אחרים או לכל אחד מהמרכיבים הנספחים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). אתה סובל או סבלת בעבר מדימום מהרקטום (פי הטבעת), צואה שחורה ודובקה או שלושלד מי. אתה סובל או סבלת בעבר מכיב פפטי (כיב במערכת העיכול). אתה נוטל תרופות אחרות המכילות פראצטמול או איבופרופן. אתה נוהג לשתות כמויות גדולות של אלכוהול. אתה סובל מאי ספיקה חמורה של הלב, הכבד או הכליה. אתה סובל מדימום בכלי הדם במוח או מדימום פעיל אחר. אתה סובל מבעיות בייצור דם די. נטילת מאסמה, חרלת או מחגובות אלרגיה לאחר סבילות אספירין/חומצה אצטילסאליצילית או NSAIDs אחרים. את בלשלת חודשי ההיריון האחרונים.
--

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

היווע בקרוק או ברוקח לפני נטילת **קומבודקס**.

קשורים לעלייה קטנה בסיכון להתקף לב או לשבץ מוחי, בעיקר בבטילת מינונים גבוהים. אין לעבור על המנה או משך הטיפול המומלצים.

תגובות עוריות

הגובות עוריות חמורות דווחו בהקשר של טיפול **קומבודקס**. על"ך הפסיק את נטילת **קומבודקס** ולפנות מייד לטיפול רפואי במידה שאתה מפתח פריחה עורית מסוג כלשהו, נגיעים בלגמות ריריות, שלפוחית או סימנים אחרים של אלרגיה מאחר שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים של תגובה עורית חמורה מאוד. ראה סעיף 4.

על"ך השייט בקומבודקס ספר לרופא או לרוקח אם:

אתה סובל מבעיות לב כולל אי ספיקת לב, אגנינה פתקרוסית (תעקת חזה), או אם עברת התקף לב, ניתוח מעטפים, מחלת ליז' דם רגליים (בעיה ברומת דם ברגליים) או בכפות רגליים עקב היצרות או חסימת עורקים, או מכל סוג של בעיה בחוץ (כולל "ליבו שבע" או התקף איסכמי חף OIA).

- אתה סובל מילחץ דם גבוה, סוכרת, גלוקטרוזל גבוה, יש לך היסטריה משפחתית של מחלת לב או שבע מוחי, או אם אתה מעשן.
- אתה סובל מלמחלת לב, דלקת כבד (הפטטיס), מחלת כליה או מקושי במתן שתן.
- אתה תשתמש בסמים או מרבה לשתות אלכוהול.
- אתה חבירון או ממחנת להיכנס ליריון.
- את מניקה או ממחנת להניק.
- אתה סובל מזיהום.

נטילת קומבודקס עלולה למסך סימנים של זיהום, כגון חום ואובדן. על כן נטילת **קומבודקס** עלולה לגרום לעיכוב בקבלת טיפול מתאים. התופעה נצפתה להוביל לסיכון מוגבר לסיבוכים. התופעה נצפתה בדלקת ריאות שנגרמה על ידי חיידק זיהוינומי עור חיידקיים הקשורים באבעבות רוח. אם אתה נוטל את התרופה שכאתה סובל מזיהום ותסמיני הזיהום נמשכים או מחמרים, ריבוע ברופא בהקדם אפשרי.

אתה אמור לעבור ניתוח.
אתה מעל גיל 65.
אתה סובל או סבלת בעבר ממצעים רפואיים אחרים, כולל:
קושי עיכול, כיב קיבה או בעיות אחרות בקיבה.

הקאה זמית או דימום מפי טבעת.
אסמה.
בעיות ריאה.
נטייה לדימום או בעיות אחרות במערכת הדם.
קבולות במעיים כגון דלקת כיתית של המעי הגס (קוליטיס) או מחלת קרוהן.

נפיחות בקרסוליים או בכפות הרגליים.
שלשול.

מחלה תורשתית נגטיית או בכרשת של אנזימים מסוימים המתבטאת בסביבונים ניורולוגיים אחרים.
או בבעיות בעור, או לעיתים בשניהם, כלומר פורפיריה.

○ אבעבועות שחורות.

○ מחלה אוטואימונית כגון זאבת אדמונית.

○ התרופה דרופקט או איבופרופן אשר שייך לקבוצת תרופות

(NSAIDs) שעלולות לפגום בפוריות בנשים. אפקט זה הפך בהפסקת הטיפול.

נטילת התרופה יכולה הפריעה לתוצאת בדיקת שתן 5-hydroxyindoleacetic acid (5HIAA), ולגרום לתוצאות חיוביות שגויות. בכדי להימנע מתוצאות שגויות לבי טיטול **קומבודקס** או לשיטורים אחרים המכילים פראצטמול מספר שעות לפני או במהלך אצטמול.

ילדים ומתבגרים:

התרופה מיועדת למתבגרים וילדים מעל גיל 12.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקה, אם לקחת לאחרונה, או אם אתה עשוי לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ביחד עם אתה לוקה:
תרופת נדג קרית
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
גד קרית
דיל (דיל) לנמית
קרישה
לזחמה אספירין/חומצה אצטילסאליצילית, אורפרין, אוקריוזין.
תרופות לטיפול באפילפסיה או פרכוסים כגון פניטויין, גלוראמפמיקול (אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול בזיהומי אוזניים ועיניים).

פרובנציד, תרופה לטיפול בשיגדון.

דזידובידן, תרופה לטיפול ב-HIV (וירוס גשורם למחלת האיידס).

תרופות לטיפול בשחפת כגון איזוניאיד.
אספירין/חומצה אצטילסאליצילית, לציטליטס או תרופות אחרות משפחת NSAIDs.

תרופות להורדת לחץ דם גבוה (מכבי ACE כגון קפטופריל, חוסמי בטא כגון אטנולול, חוסמי רצפטור אנגיוטנסין II כמו לורסרטן).

תרופות לטיפול בבעיות לב אחרות כגון דיגוקסין.
משנתנים.

ליתיום, תרופה המשמשת לטיפול בסוגים מסוימים של דיכאון.
מתורגרטט, תרופה המשמשת לטיפול בדלקת מפרקים וסוגים מסוימים של סרטן.
אנטיביוטסטרואידים כגון פרדניסון, קורטיזון.
מקולורלראמיד, פרופנולין.
סקרוילומס או ציקלופפרון.
תרופות לדיכוי מערכת החיסון המשמשות לאחר השתלת איברים.
אופטיקולאריאה, תרופה לטיפול בסוכרת.

לסאניקוטסאלימט (כגון אדאזינופילוקט מקבוצת הקווינולונים).

הקאה זמית או דימום מפי טבעת.
אסמה.
בעיות ריאה.
נטייה לדימום או בעיות אחרות במערכת הדם.
קבולות במעיים כגון דלקת כיתית של המעי הגס (קוליטיס) או מחלת קרוהן.

נפיחות בקרסוליים או בכפות הרגליים.
שלשול.
מחלה תורשתית נגטיית או בכרשת של אנזימים מסוימים המתבטאת בסביבונים ניורולוגיים אחרים.
או בבעיות בעור, או לעיתים בשניהם, כלומר פורפיריה.

○ אבעבועות שחורות.

○ מחלה אוטואימונית כגון זאבת אדמונית.

○ התרופה דרופקט או איבופרופן אשר שייך לקבוצת תרופות

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך לקבלת ייעוץ לגבי הסיכון והאמצעים שיש לנקוט. עשה זאת עם אלב הפועו סימנים של אי נוחות או הרעלה.

נטילת מיון יתר של **קומבודקס** יכולה לגרום לנזק חמור בכבד ובכליות שיופע בשלב מאוחר יותר. ייתכן שתצטרך טיפול רפואי מיידי.

התסמינים יכולים לכלול בחילה, כאב בטן, הקאה (עולה להיות דמית), כאב ראש, צלצולים באוזניים, גלבוז ונוגעות עין ועודת. במנות גבוהות, נגמם, כאב חזה, פקליטציות (הלמות לב), איבוד הכרה, פרכוסים (שלפיק בידים), חולשת וסחרחורת, דם בשתן, תחשת קור בגוף ובעיות שימיה דוחוז.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מידי שכחרכת, אלא אם כן נגן נטילת המנה הבאה קרוב; דלג על המנה ששכחתה וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל.
ליתוי מנה כפולה על מנת לפצות על מנה ששכחתה.
אם אינך בטוח אם יש לדלג על מנה, היוועץ ברופא או ברוקח.

הניגה ושימוש במכונות:
יש להיזהר בהנהיג ברבכ או בהפעלת מכונות עד שתדע כיצד התרופה מפעינה על"ך.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיביו על אופניים או משחקים בקרבת הכביש ודומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

קומבודקס מכיל לקטוז. אם נאמר לך על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מ"גלימול נתון (23 מ"ג) לקפלויה, כלומר היא למעשה "נטולת נתח".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

על"ך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בעניין נטילת הטיפול בתרופה.
הנינון המקובל בדרך כלל במבוגרים ובילדים מגיל 12 שנים הוא:
1-2 קפלוית ל 6 שעות, במידת הצורך.
אין ליטול יותר מ-8 קפלויות ב-24 שעות.
יש ליטול את המנה השנימה ביותר ולזמן הקצר ביותר להשגת מטרת השימוש.
פנה לרופא אם התסמינים מחמרים או אינם משתפרים, או אם יש צורך ליטול את התרופה למשך יותר מ-3 ימים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם רופאך רשם לך מינון שונה, יש לעקוב אחר הוראות הרופא.

צורת הנטילה:
יש לבלוע את התרופה עם כוס מים מלאה עם או ללא מזון.

על מנת להקל על הבליעה, ניתן במידת הצורך, לחצות את הקפלויה לשימוש מיידי. יש לבלוע את השתאים יחד מייד לאחר הצהיה.

אסור לתת או ללעוץ את הקפלויות על מנת להימנע מטענה אחר של התרופה.

•בחילה או הקאה
•איבוד תיאבון
•צלצול
•מחלת בטן
•שלשול
•פריחות בעור
•כאב ראש
•סחרחורת
•שינויים בתפקוד הכבד או הכליות (קבעים בבדיקות דם)

•אבעבובת

תופעות לוואי שאינן שיכחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
ירידה במספר כדוריות הדם הדמומות, מקרים של דימום כגון דימומים מהאף, דימומים חריגים או ממושכים בזמן הווסת, עלייה במספר טטיות הדם בעיות עיניים כגון שטטשו או ירידה בריאהי, שינויים במראה צבעים

גלזים וצעיזות
ליתוי גירשות/תגובות אלרגיה, אגיואדמה(התסמינים יכולים לכלול עיניים מרדדות, אדמונת כאובת)
השתפחוץ שדיים (בגברים)
רמת סוכר נמוכה באופן לבי תקין (היפוגליקמיה)
שינויים במצב החוץ, למשל דיכאון, גלבוז, תגובות רגשיות מוגזמות

שינויים ברצון לישון (ששנויות או נדודי שינה)
קושי במתן שתן
עיבוי הפפרשות של מערכת הנשימה (רר)

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):
היוועץ בקרוק או ברוקח.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

1. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקומבודקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

התופעות נובעות לואי כלשהי, ספר לרופא או לרוקח.
אם להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא או לרוקח
אם אתה חש
לדבר מיון של בית חולים
התופעות אתה או יותר
תופעות הלוואי החמורות הבאות:
הקאה
דמית
עם חלקיקים נראים
משקע קפה, דימום מפי הטבעת, צואה שחורה ודובקה או שלשול דמי,
נפיחות פגיעה או נשימה,
לקושי בליעה או נשימה.
אסמה,
צדופים,
קוצר נשימה.
דוחוז מקרים דירים
מאוד של תגובות עוריות חמורות
הכוללות גרד תפוחות או חמור, פריחה עורית, חרלת.
שלפוחיות ומחורות דימום שפתיים, בעיניים, כפה, כאב ונאיברי המין (סמנתוס סטיבנס-ג'ונסון).
הגובה עורית חמורה הדוחה
עומת סמנתוס רגשית
נדר, גיטטימית (DRESS), התסמינים כוללים:
פריחה עורית, חום, נפיחות קרסוליות למפה ועליה באאוזינופילים (סוג של תאי דם לבנים).

•חום, חום נאשור כלילית או טובה, בחילה, כאב בקיבה, כאב ראש חמור בקשה.
תופעות לוואי נוספות:
תופעות לוואי שיכחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 100):
אצירת נוזלים,
נפיחות
•צלצולים (גיטונן)

בקומבודקס אם אתה מפתח תסמינים אלה ופנה מייד לטיפול רפואי. ראה גם סעיף 2.

הרשימה המופיעה מעלה כוללת תופעות לוואי חמורות אשר עשויות לדרוש טיפול רפואי. תופעות לוואי חמורות הן נדירות במינונים נמוכים של תרופה זו ובשימוש למשך זמן קצר.

אם הפועיה תופעות לוואי, או אם אתה מתופעות הלוואי המחירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שזיהויות בעלות ערך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי. שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס ההקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:
<http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך ליחסן את התרופה?

שמור
הרעלה!
התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום בטוח מחוץ להישג ידם וטוח אריחים של ילדים ו/או חסרי תודעה.
אין יך תמנע הרעלה.
אל תגרום להקאה ללא הרשמה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחר תהיך התגובה המופיע על עבי האציה.
איתר
התגובה התיארוטית ליום האחרון של אותו חודש.

•מחני אחסון:
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.
אחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.
אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי.
שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד.
אמנעים אלא יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:
Maize Starch, Pregelatinised Maize Starch, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Talc, Hydroxypropyl Methylcellulose, Magnesium Stearate, Lactose Monohydrate, Titanium Dioxide (E171), Polyethylene Glycol 4000, Sodium Citrate Dihydrate (E331)

כיצד נראית התרופה מנה נתון האריזה:
קפלויה
לבנה עם קו חלוקה בצד אחד.
גדלי אריזה מאושרים:
8, 10, 16, 20, 24, 30 קפלויות.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות משוקים.

נעקר ביולי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר גישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
00-344200-156

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום:
דסקו® בע"מ
רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל