

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات - 1986)

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

اسم الدواء، شكله وعياره

داكتاكورت™ كريم

المواد الفعالة وتركيزها

Miconazole nitrate 20 mg/g (2% w/w);
hydrocortisone 10 mg/g (1% w/w)

ميكونازول نيترات 20 ملغم/غرام (2% w/w).
هيدروكورتيزون 10 ملغم/غرام (1% w/w)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 2
“معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء” والفقرة 6 “معلومات إضافية”.

اقرأ النشرة بتمعن حتى تهيئتها قبل إستعمالك للدواء. إذا توفرت لديك أسطلة إضافية،
النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسطلة إضافية،
راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء للعلاج من أمراض الجلد. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم
حتى ولو بدا لك أن حالته الطبية مشابهة لحالتك.

١ لأي غرض مخصص الدواء؟

داكتاكورت كريم هو كريم لمعالجة التلوثات على سطح الجلد الناتجة عن
فطريات بما في ذلك الخمائر. داكتاكورت كريم مخصص بشكل خاص
لمعالجة التلوثات المترافقية بإيجاز بارز ومحكم.

الفصيلة العلاجية:

ميكونازول نيترات - مضاد للفطريات من فصيلة الإيميدازول، حيث يعمل
بواسطة إتلاف الفطريات التي تتسبّب تلوثاً وبعض الجراثيم المرافقة.
هيدروكورتيزون - ستيرoidal مضاد للالتهاب منخفض الشدة، للاستعمال
الخارجي، حيث يخفف من الإلتهاب، الإنفاس، الإحمرار، الاحتشاد والحكة في الجلد.

٢ قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) للمواد الفعالة، لكل واحد من المركبات الإضافية
التي يحتويها الدواء أو لأدوية أخرى مشابهة مضادة للفطريات. لقائمة
المركبات الإضافية أنظر الفقرة 6 “معلومات إضافية”.

• وجدت لديك مشاكل جلدية أخرى مثل قروح البرد، الهرس، جدرى
الماء وعقولة المنطقة. إستعمل المستحضر فقط المشكلة الجلدية
التي أريتها للطبيب.

لا تستعمل المستحضر إذا كانت أحدي تلك الحالات تخصك. إذا لم تكن
وأنا، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل بدء إستعمال داكتاكورت كريم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل بدء العلاج بـ داكتاكورت احمد للطبيب إذا:

• كانت المنطقة المصابة هي في وجهك. لا يجوز إستعمال داكتاكورت
كريم على منطقة الوجه، إلا إذا أوصاك الطبيب بذلك.

• كنت تستعمل وسائل منع الحمل مصنوعة من المطاط (لاتكس): يجب تجنّب
الاتصال ما بين وسائل منع الحمل المصنوعة من المطاط (لاتكس)، مثل
الكوندورم والدایراغما، وبين داكتاكورت كريم. إن داكتاكورت كريم قد
يضر بالمطاط (لاتكس) ويضعف من نجاعته. يجب إرشارة الطبيب
بخصوص إستعمال وسيلة منع حمل من نوع آخر خلال فترة إستعمال
الدواء.

• اتصل بالطبيب إذا قاسيت من رؤية ضبابية أو من اضطرابات أخرى في
الرؤبة.

يجب الامتناع عن التماس مع العينين، إذا دخل كريم في العينين، يجب
شفقهما فوراً بشكل جيد بالماء وإبقاء العينين مفتوحتين أثناء الشطف.

الأطفال:

لا يوصى بإستعمال الكريم لدى الأطفال الصغار لفتره زمنية مطلقة (مثلاً
كل يوم لمدة سنة أسيبيغ) لا يجوز إستعمال الكريم على مساحات واسعة
من جسم الطفل أو من تحت الحفاض إلا بتعليمات من الطبيب. عندما
تختفي أعراض الالتهاب (احمرار وتهيج)، بالإمكان موافقة العلاج بكم
ميكونازول الذي يحتوي فقط على المركب المضاد للفطريات (miconazole)
بدلاً من داكتاكورت كريم.

المسنون:

إن أدوية مثل داكتاكورت كريم قد تسبب ترققاً في الجلد بشكل أكثر وذلل
عند إستعمالها لفتره زمنية طويلة، دون توقف. نظرً لأن ترقق الجلد يحدث
 بشكل طببي في سن مبكرة، يجب إستعمال القليل من الدواء لفتره لا تزيد
عن عدّة أسيبيغ لدى المراهقين والمسنون. يجب الإستعمال فقط لفتره
الزمنية التي حدها الطبيب.

الاتصالات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية
بيون وصفة طبية وأضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن
ذلك، بالأخص إذا كنت تتناول:
أدوية ممتعة للدم التي يتم تناولها عن طريق الفم (مضادات التخثر) مثل
وارفارين، من الجائز أن يرغب الطبيب في التأكيد من أن الدواء المضاد
للتخثر يعمل كما يجب.

الحمل، الإرضاع والخصوصية:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، من شأنك أن تصبحي حاملاً أو تخططين للحمل،
إشتري بديل الطبيب قبل إستعمال الدواء.

السيادة واستعمال الماكولات:

من غير المفترض أن تؤثر داكتاكورت كريم على قدرتك على السيادة أو
تشغيل الماكولات الخطرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

• ٣٠ ميليفارام حمض البنزويك في كل أسيبيغ التي تحتوي على 15 غرام
كريم، حيث تساوى بالقيقة ١-٢ ميليفارام/غرام من الكريم.
• قد يزيد حمض البنزويك من البرقان لدى حديثي الولادة (حتى عمر ٤
أسيبيغ).

• قد يسبب حمض البنزويك (E210) تهيجاً موضعاً.
قد يؤدي حمض البنزويك (E320) إلى رد فعل جلدي
موصفي (Butylated hydroxyanisole) أو إلى تبيّح العينين والأنسجة المخاطية.

٣ كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي

الاعتدادي هو عادةً بعد داكتاكورت على الجلد مرة أو مرتين في اليوم.
لا يجوزتجاوز المقدار الدوائي الموصى به

للاستعمال الخارجي فقط. يجب الامتناع عن التماس مع العينين.
تعليمات الفتح: كل أسيبيغ من داكتاكورت كريم محمكة الإغلاق. يجب

إستعمال الغطاء من أجل تقبّل الجزء الذي يسد الأنفية.

طريقة الإستعمال:

- إغسل وجه الجلد المصاب جيداً.
- لكون الكثير من التلوثات الجلدية تتسبّب العدوى، فعليك الاحتفاظ بمنشفة منفردة لإستعمالك الشخصي، وذلك لتجنب عدوى الآخرين.
- قد يدمن كمية قليلة من داكتاكورت كريم على الجلد المصاب وذلك الكريم بلطف إلى داخل الجلد، حتى اختفائه.
- إغسل يديك جيداً، بعد دهن الكريم، عدا الحالات التي يكون فيها العلاج مخصصاً للبنين، وذلك لتجنب نقل التلوث من الجلد المصاب إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لأشخاص آخرين. إن الملابس التي تكون على تamas مياش مع المنطقة المصابة، يجب غسلها وتنظيفها بوربة عالية. إذا كانت ملابس الداخلية قد تلامس داكتاكورت كريم، فمن المفضل إرتداء ملابس داخلية مصنوعة من القطن، لأن داكتاكورت كريم قد يلحقضرر بماء تركيبة مميتة.
- إذا نسيت إستعمال الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز إستعمال مقداراًدواوياً مضاعفاً. إستعمل المقدار الدوائي التالي في الوقت العادي واستشر الطبيب.

- إذا بليت أنت أو طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.
- يجب المواطنة على العلاج سبب توصية الطبيب.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بسبب إستشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواصفات الفعالة أيضاً على:

Macrogol 6-32 and Glycol stearate; Peglicol 5 oleate; Liquid paraffin; Benzoic acid; Disodium edetate; Butylated hydroxyanisole; Purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تحتوي العلبة على أنبوبة ذات 15 غرام من الكريم. لون الكريم هو أبيض. المستوردة وصاحب الإمكانيات وعنوانه: جي - سي هيلث كير. م.ض..، كبيوس شفافيم، 6099000، إسرائيل.

تم إعدادها في 03.2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
066292361600

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

4 الأعراض الجانبية

- كما بكل دواء، إن إستعمال داكتاكورت كريم قد يسبب أمراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعانى أي منها.
- يجب التوقف عن إستعمال داكتاكورت وإبلاغ الطبيب فوراً إذا لاحظت إحدى الحالات التالية، من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي:

 - إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة، صعوبات في البلع أو صعوبات في التنفس.
 - شرى، تهيج خطير أو إحمرار الجلد في مكان الدهن أو علامات أخرى حساسية خطيرة.

بلغ عن الأعراض التالية عند إستعمال داكتاكورت كريم:

- أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10%
مستعملين من بين 1,000:
 - تهيج في الجلد
 - الشعور بحرقة
 - حكة في الجلد
 - حساسية الجلد

أعراض جانبية شيعوها غير معروفة (أعراض شيعوها لم يحدد بعد)

- لون فاتح لأجزاء من الجلد
- رد فعل تحسسي مفرط (مثل طفح) في مكان الدهن، إتهاب الجلد التماسي (Contact Dermatitis) إذا ظهرت إحدى تلك الأعراض، فيجب التوقف عن العلاج.
- ضبابية الرؤية