نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوّق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

ويلبوترين XR 150 ملغ أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:

بوپروپيون هيدروكلوريد (bupropion hydrochloride) 150 ملغ

ويلبوترين XR 300 ملغ أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:

بوپروپيون هيدروكلوريد (bupropion hydrochloride) 300 ملغ

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ويلبوترين XR هو دواء مخصص لعلاج الإكتئاب. يتفاعل مع مركبات كيميائية في الدماغ تسمى *نورأدرينالين ودوپامين*.

الفصيلة العلاجية

مثبط إنتقائي لإعادة إستيعاب نورأدرينالين ودوپامين.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- **كنت حساساً (أليرجي)** لبوپروپيون أو لكل واحد من المركبات الإضافية لهذا الدواء (مفصلة في الفقرة 6)
- **كنت تتناول أدوية أخرى أياً كانت تحتوي على بوپروپيون**
- **تم تشخيصك على أنك تعاني من الصرع أو لديك سابقة لإختلاجات**
- **كان لديك إضطراب في الأكل** أو كان لديك (مثلاً، الشره (bulimia) أو القهم العصبي (anorexia nervosa))
- **كان لديك ورم في الدماغ**
- **كنت تشرب عادة المشروبات الروحية بشكل مفرط** وقد توقفت للتو أو أنك على وشك التوقف عن شربها
- **كانت لديك مشاكل كبدية خطيرة**
- **كنت قد توقفت مؤخراً عن تناول أدوية مهدئة،** أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها في الوقت الذي تتناول ويلبوترين XR
- **كنت تتناول أو قد تناولت أدوية أخرى للإكتئاب** أو لداء الپاركينسون تسمى *مثبطات مونوأمين أوكسيداز* (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة.

إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث فوراً مع طبيبك، **بدون تناول ويلبوترين XR.**

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل إستعمال ويلبوترين XR.

الأطفال والمراهقون

ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.
هناك خطورة زائدة لسلوكيات ولأفكار إنتحارية عندما يُعالَج الأطفال دون عمر 18 سنة بمضادات الإكتئاب.

الكبار

يجب أن يعرف طبيبك قبل أن تتناول ويلبوترين XR إذا:

- **كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم**
- **كان لديك سكري** الذي لأجله تستعمل إنسولين أو أقراص
- **كان لديك إصابة خطيرة في الرأس أو سابقة لرضة في الرأس.**

تبين أن ويلبوترين XR يسبب نوبات (إختلاجات) لدى ما يقارب 1 من بين 1,000 شخص. يرجح أكثر أن يحدث هذا العرض الجانبي لدى أشخاص من المجموعات المذكورة أعلاه. إذا كان لديك نوبة خلال العلاج فعليك التوقف عن تناول ويلبوترين XR. **لا تتناول المزيد وتوجه إلى طبيبك.**

- **كنت تعاني من إضطراب ثنائي القطب** (تغيرات قصوى في المزاج)، لأن ويلبوترين XR قد يؤدي إلى عوارض لهذا المرض
- **إذا كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب،** فإن إستعمال هذه الأدوية سوية مع ويلبوترين XR يمكن أن يؤدي لمتلازمة السيروتونين، حالة بإمكانها أن تشكل خطراً على الحياة (أنظر "ويلبوترين XR وأدوية أخرى" في هذه الفقرة)
- **كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى،** قد يكون لديك إحتمال أكبر للمعاناة من أعراض جانبية.

إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث ثانية مع طبيبك قبل تناول ويلبوترين XR. قد يرغب بأن يكرس إهتماماً خاصاً لعلاجك، أو أن يوصي بعلاج آخر.

أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب لديك

إذا كنت مكتئباً، قد تراودك أحياناً أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو الإنتحار. قد تزداد هذه مع تناول مضادات الإكتئاب لأول مرة، حيث أن كافة هذه الأدوية تستغرق وقتاً كي تبدأ بالتأثير، على الأغلب نحو أسبوعين بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان.

من الجائز أن يكون الإحتمال أكبر بأن تفكر على هذا النحو إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكار إنتحارية أو لإلحاق الأذى بنفسك.
- كنت شاباً يافعاً. أظهرت المعلومات من التجارب السريرية وجود خطورة زائدة لسلوك إنتحاري لدى كبار دون عمر 25 سنة الذين يعانون من حالات نفسية والذين عولجوا بمضاد للإكتئاب.

إذا كانت لديك أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو الإنتحار في أي وقت كان، **إتصل بطبيبك أو توجه إلى المستشفى فوراً.**

قد تجد أنه من المفيد أن تحكي لأحد أقربائك أو لصديق قريب بأنك تعاني من الإكتئاب، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يبلغوك إذا كانوا يعتقدون أن الإكتئاب لديك يتفاقم، أو إذا كانوا قلقين بخصوص تغيرات في سلوكك.

ويلبوترين XR وأدوية أخرى

إذا كنت تتناول، أو تناولت أدوية أخرى للإكتئاب أو لمرض باركينسون **التي تسمى *مثبطات مونوأمين أوكسيداز*** (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة، **إحك لطبيبك بدون تناول ويلبوترين XR** (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2).

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يغير لك جرعة الـ ويلبوترين XR، أو يقترح تغيير بأدويتك الأخرى.

لا تندمج أدوية معينة مع ويلبوترين XR. قد يزيد بعضها من إحتمال حدوث نوبات أو إختلاجات.

قد تزيد أدوية أخرى من خطورة حدوث أعراض جانبية أخرى. فيما يلي تفصيل لبعض الأمثلة، لكن هذه ليست قائمة كاملة.

قد يكون هناك إحتمال أكبر من المعتاد لحدوث إختلاجات إذا:

- **كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب أو لأمراض نفسية أخرى**
- **كنت تتناول تيئوفيلين** للربو أو لمرض رئوي
- **كنت تتناول ترامادول،** مسكن قوي للآلام
- **تناولت أدوية مهدئة،** أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها بينما ما زلت تتناول ويلبوترين XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2)
- **كنت تتناول أدوية ضد الملاريا** (مثل ميفلوكوين أو كلوروكوين)
- **كنت تتناول منشطات أو أدوية أخرى للسيطرة على الوزن أو الشهية للطعام لديك**
- **كنت تتناول ستيروئيدات (عن طريق الفم أو بالحقن)**
- **كنت تتناول مضادات حيوية تسمى كوينولونات**
- **كنت تتناول أنواع معينة من مضادات الهيستامين التي قد تسبب الميل إلى النوم**
- **كنت تتناول أدوية للسكري.**

إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع طبيبك فوراً، قبل تناول ويلبوترين XR. يدرس طبيبك الفوائد والمخاطر من أجلك عند تناول ويلبوترين XR.

قد يكون هناك إحتمال أكبر من المعتاد لحدوث أعراض جانبية أخرى إذا:

- **كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب** (مثل أميتريبتيلين، فلوأوكسيتين، پاروكسيتين، سيتالوپرام، إسيتالوپرام، ڤينلافاكسين، دوسوليپين، ديسيپرامين أو إيميپرامين) أو لأمراض نفسية أخرى (مثل كلوزاپين، ريسپيريدون، تيوريدازين أو أولانزاپين).

  من شأن ويلبوترين XR أن يتفاعل مع أدوية معينة تُستعمل لعلاج الإكتئاب وقد تقاسي من تغييرات في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، إرتفاع نظم القلب، عدم إستقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال).
- **كنت تتناول أدوية لداء الپاركينسون** (ليڤودوپا، أمانتادين أو أورفينادرين)
- **كنت تتناول أدوية تؤثر على قدرة جسمك على تفكيك ويلبوترين XR** (كاربامازيپين، فينيتوئين، ڤالپروات)
- **كنت تتناول أدوية معينة تستعمل لعلاج السرطان** (مثل سيكلوفوسفاميد، إيفوسفاميد)
- **كنت تتناول كلوپيدوچريل الذي يستعمل بشكل خاص لمنع حدوث سكتة**
- **كنت تتناول حاجبات بيتا معينة** (مثل ميتوپرولول)
- **كنت تتناول أدوية معينة لعدم إنتظام نظم القلب** (پروپافينون أو فليكاينيد)
- **كنت تستعمل لصقات نيكوتين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.**

إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع طبيبك فوراً، قبل تناول ويلبوترين XR.

قد يكون ويلبوترين XR أقل نجاعة

- **إذا كنت تتناول ريتونافير أو إيفافيرينز،** أدوية لعلاج تلوث HIV.

إذا إنطبق هذا عليك، إحك لطبيبك. سوف يفحص طبيبك مدى نجاعة ويلبوترين XR بالنسبة لك. قد يكون من الضروري رفع جرعتك الدوائية أو تغيير علاج الإكتئاب لديك إلى علاج آخر. **لا ترفع** جرعة ويلبوترين XR خاصتك بدون إستشارة طبيبك، حيث أن هذا الأمر قد يزيد من خطورة حصول أعراض جانبية لديك، يشمل إختلاجات.

قد يقلل ويلبوترين XR من نجاعة أدوية أخرى

- **إذا كنت تتناول تاموكسيفن الذي يستعمل لعلاج سرطان الثدي.**

إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع طبيبك. قد تكون هناك حاجة لتغيير العلاج بعلاج آخر للإكتئاب لديك.

- **إذا كنت تتناول ديچوكسين لقلبك.**

إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع طبيبك. قد يدرس طبيبك ملاءمة المقدار الدوائي لديچوكسين.

إستعمال ويلبوترين XR والكحول

يمكن للكحول أن يؤثر على طريقة عمل ويلبوترين XR وعندما يؤخذان سوية، يمكنهما في حالات نادرة، أن يؤثرا على أعصابك أو على حالتك النفسية. بعض الأشخاص يجدون أنهم أكثر حساسية للكحول عندما يتناولون ويلبوترين XR. قد يوصيك طبيبك بعدم شرب الكحول (بيرة، نبيذ أو مشروبات روحية) عندما تتناول ويلبوترين XR، أو أن تحاول أن تقلل جداً من الشرب. لكن إذا كنت تشرب الكثير حالياً، فلا تتوقف بشكل مفاجئ: قد يجعلك هذا معرضاً لخطورة حدوث إختلاجات.

تحدث مع طبيبك بخصوص شرب الكحول قبل أن تبدأ بتناول ويلبوترين XR.

التأثير على فحوص البول

قد يشوّش ويلبوترين XR على فحوص بول معينة لتشخيص أدوية أخرى. إذا توجب عليك الخضوع لفحص بول، إحك لطبيبك أو المستشفى بأنك تتناول ويلبوترين XR.

الحمل والإرضاع

لا تتناولي ويلبوترين XR إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إلا إذا أوصى طبيبك بذلك. إستشيري الصيدلي أو طبيبك قبل تناول هذا الدواء. بعض الأبحاث، لكن ليس جميعها، أشارت إلى إرتفاع خطورة حدوث تشوهات خلقية، خاصة تشوهات قلبية، لدى رُضع تناولت أمهاتهم ويلبوترين XR. من غير المعروف فيما إذا كان ذلك في أعقاب إستعمال ويلبوترين XR.

يمكن لمركبات ويلبوترين XR أن تنتقل إلى حليب الأم. إستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول ويلبوترين XR.

السياقة وإستعمال الماكنات

إذا كان ويلبوترين XR يسبب لك الدوار أو الشعور بأنك توشك على الإغماء، لا تقد أو تشغل أية أدوات أو ماكنات.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

قد يستغرق فترة من الزمن حتى تبدأ الشعور بتحسن. يستغرق فترة من الزمن حتى يتم الحصول على تأثير كامل للدواء، في بعض الأحيان أسابيع أو أشهر. عندما يبدأ شعورك بالتحسن، قد يوصيك طبيبك بالإستمرار بتناول ويلبوترين XR لمنع عودة الإكتئاب.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية للكبار فقط هي قرص **واحد** من عيار 150 ملغ مرة في اليوم.

قد يزيد طبيبك جرعتك الدوائية إلى 300 ملغ مرة في اليوم إذا لم يتحسن الإكتئاب لديك بعد عدة أسابيع.

خذ جرعة أقراص ويلبوترين XR خاصتك في الصباح. لا يجوز تناول ويلبوترين XR أكثر من مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

القرص مطلي بقشرة التي تحرر الدواء ببطء داخل جسمك. قد تلاحظ شيئاً في البراز لديك يبدو مثل قرص. إنها القشرة الفارغة التي تخرج من جسمك.

إبلع أقراصك بشكلها الكامل. لا يجوز مضغها، سحقها أو شطرها – إذا قمت بذلك، هناك خطورة بأن تأخذ مقدار دوائي مفرط، حيث أن الدواء سيتحرر إلى داخل جسمك بشكل أسرع. سوف يزيد ذلك من إمكانية حدوث أعراض جانبية لديك، يشمل نوبات (إختلاجات).

بعض الأشخاص يستمرون بتناول قرص واحد من عيار 150 ملغ في كل يوم خلال كامل فترة علاجهم. قد يصف لك طبيبك ذلك إذا كانت لديك مشاكل كبدية أو كلوية.

كم من الوقت عليك أن تتناول الدواء

فقط أنت وطبيبك يمكنكما أن تقررا كم من الوقت عليك تناول ويلبوترين XR. قد يستغرق أسابيع أو أشهر من العلاج حتى تلاحظ تحسن أياً كان. تحدث عن أعراضك مع طبيبك بشكل دائم ليتم التقرير كم من الوقت عليك تناوله. عندما تبدأ بالشعور بتحسن، قد يوصيك طبيبك بالإستمرار بتناول ويلبوترين XR لمنع عودة الإكتئاب.

القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال:

تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل وفي نفس الوقت التدوير لليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة).

تعليمات الإغلاق: يجب وضع الغطاء على الطرف المفتوح للقنينة والتدوير بإتجاه اليمين (في إتجاه عقارب الساعة) حتى يُغلق تماماً.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا كنت تتناول أقراصاً أكثر من اللازم، قد تزيد من خطورة حدوث نوبات أو إختلاجات.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارىء في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، **لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة.**

تناوَل الجرعة التالية في الوقت المعتاد وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول ويلبوترين XR أو تقليل جرعتك الدوائية بدون إستشارة الطبيب قبل التوقف، حتى ولو طرأ تحسن على صحتك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ويلبوترين XR قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة

نوبات أو إختلاجات

نحو 1 من كل 1,000 شخص الذين يتناولون ويلبوترين XR معرض لخطورة حدوث نوبة (إختلاج أو تشنج). يزيد إحتمال حدوث ذلك إذا كنت تتناول ويلبوترين XR أكثر من اللازم، إذا كنت تتناول أدوية معينة، أو إذا كنت معرضاً لخطورة أعلى من المعتاد لحدوث نوبات. إذا كنت قلقاً، تحدث مع طبيبك.

إذا كانت لديك نوبة، إحك لطبيبك بعد أن تتعافى. **لا تتناول أقراصاً إضافية.**

ردود فعل تحسسية

قد يصاب بعض الأشخاص بردود فعل تحسسية تجاه ويلبوترين XR. تشمل هذه:

- جلد أحمر أو طفح (يشبه الشرى)، حويصلات أو درنات حاكة (شرى) على الجلد. إن بعض أنواع الطفح الجلدي هذه قد توجب علاجاً في المستشفى، خاصة إذا كنت تعاني أيضاً من آلام في الفم أو في العينين.
- صفير غير إعتيادي أو صعوبات في التنفس
- إنتفاخ في الجفنين، الشفتين أو اللسان

- آلام في العضلات أو المفاصل
- إنهيار أو فقدان الوعي.

إذا كانت لديك أية علامات لرد فعل تحسسي إتصل بطبيبك حالاً. **لا تتناول أقراصاً إضافية.**

قد تستمر ردود الفعل التحسسية لفترة طويلة. إذا وصف لك طبيبك شيئاً ليساعدك بخصوص أعراض الحساسية، تأكد من إنهائك للعلاج.

طفح جلدي لـ لوپوس (ذئبة) أو تفاقم أعراض الـ لوپوس

غير معروف – لا يمكن تقييم الشيوع من المعلومات المتوفرة لدى أشخاص يتناولون ويلبوترين XR.

يعتبر الـ لوپوس إضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤثر على الجلد وأعضاء أخرى.

← **إذا قاسيت من إحتدامات لـ لوپوس، طفح جلدي أو آفات (خاصة في المناطق المعرضة للشمس) خلال تناول ويلبوترين XR، إتصل بالطبيب فوراً، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن العلاج.**

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً: تظهر **لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10**

- صعوبات في النوم. تأكد من تناولك ويلبوترين XR في الصباح.
- صداع
- جفاف في الفم
- شعور بغثيان، تقيؤ.

أعراض جانبية شائعة: تظهر لدى حتى مستعمل **واحد من بين 10**

- سخونة، دوار، حكة، تعرق وطفح جلدي (في بعض الأحيان بسبب رد فعل تحسسي)
- رجفان، ضعف، إرهاق، آلام في الصدر
- شعور بالقلق أو العصبية
- ألم أو إضطرابات أخرى في البطن (إمساك)، تغيرات في مذاق الطعام، فقدان الشهية للطعام (anorexia)
- إرتفاع ضغط الدم يكون خطيراً أحياناً، تورد
- طنين في الأذنين، إضطرابات في الرؤية.

أعراض جانبية غير شائعة: تظهر لدى حتى مستعمل **واحد من بين 100**

- شعور بالإكتئاب (أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"، تحت "أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب لديك")
- شعور بإرتباك
- صعوبة في التركيز
- نظم قلب متسارع
- إنخفاض في الوزن.

أعراض جانبية نادرة: تظهر لدى حتى مستعمل **واحد من بين 1,000**

- إختلاجات.

أعراض جانبية نادرة جداً: تظهر لدى حتى مستعمل **واحد من بين 10,000**

- خفقان القلب، إغماء
- تشنجات، تصلب العضلات، حركات خارجة عن السيطرة، مشاكل في المشي أو في التناسق
- شعور بقلة الراحة، عدم الهدوء، عدائية، عدوانية، أحلام غريبة، شعور بالوخز أو قلة الإحساس، فقدان الذاكرة
- إصفرار الجلد أو بياض عينيك (*يرقان*) الذي قد يحدث بسبب إرتفاع إنزيمات الكبد، إلتهاب الكبد (hepatitis)

- ردود فعل تحسسية شديدة؛ طفح سوية مع آلام في المفاصل والعضلات
- تغيرات في نسب السكر في الدم
- تبول زائد أو أقل من المعتاد
- عدم السيطرة على التبول (تبول لا إرادي، تسرُّب بول)
- طفح شديد في الجلد قد يظهر في الفم وفي أجزاء أخرى من الجسم وقد يشكل خطراً على الحياة
- تفاقم الصدفية (بقع ثخينة من جلد أحمر)
- شعور بالإنفصال عن الواقع أو شعور غريب (*تبدد الشخصية*)؛ رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (*هلوسة*)؛ الشعور أو الإعتقاد بأشياء غير صحيحة (*أوهام*)؛ الشك بشكل شديد (*ذهان خيلائي*).

شيوع غير معروف

ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص لكن شيوعها الدقيق غير معروف:

- أفكار عن إلحاق الأذى بالنفس أو أفكار إنتحارية خلال تناول ويلبوترين XR أو مباشرة بعد التوقف عن العلاج (أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء"). إذا كان لديك مثل هذه الأفكار، **إتصل بطبيبك أو توجه إلى المستشفى بشكل فوري.**
- فقدان العلاقة بالواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم على الأمور بذهن صافي (*ذهان*)، أعراض أخرى يمكن أن تشمل هلوسة و/أو أوهام.
- تأتأة.
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia) وإنخفاض في عدد الصفيحات الدموية (thrombocytopenia).
- إنخفاض بنسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia).
- تغيير في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، إرتفاع نظم القلب، عدم إستقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال)، أثناء تناول ويلبوترين XR سوية مع أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل باروكسيتين، سيتالوبرام، إسيتالوبرام، فلوأوكسيتين وڤينلافاكسين).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة والضوء.

للإستعمال خلال 30 يوماً من الفتح.

تحتوي القنينة على وعاء صغير محكم الإغلاق يحتوي على فحم وجل سيليكا للحفاظ على الأقراص جافة. إترك الوعاء في القنينة. لا تبلعه.

6) معلومات إضافية

- **يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:**

يحتوي القرص على:

Polyvinyl alcohol, glyceryl dibehenate.

يحتوي طلاء القرص على:

Ethylcellulose, povidone K-90, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer dispersion (Eudragit L30 D-55), macrogol 1450, silicon dioxide, triethyl citrate.

حبر للطباعة:

Shellac glaze, iron oxide black (E172), ammonium hydroxide.

- **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة**

أقراص ويلبوترين XR 150 ملغ هي أقراص مدوّرة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS5FV" بحبر أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقناني پولي إيتيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.

أقراص ويلبوترين XR 300 ملغ هي أقراص مدوّرة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS5YZ" بحبر أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقناني پولي إيتيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

- **المنتج:** بوش هيلث كومپانيس .INC، مانيتوبا، كندا.
- **صاحب الإمتياز:** چلاكسوسميثكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، پيتح تكڤا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

  ويلبوترين XR 150 ملغ: 140-05-31653

  ويلبوترين XR 300 ملغ: 140-06-31654
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في تشرين الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.

©2021 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Wel PT v12