

## شالوش B أقراص التركيبيَّة:

يحتوي كل قرص على:

ثiamine ديروكارب (فيتامين بي-1) 100 ملг

Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) 100 mg

بيريدوكسين ديروكارب (فيتامين بي-6) 250 ملг

Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) 250 mg

سيانوكوبالمين (فيتامين بي-12) 0.25 ملг

Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0.25 mg

اللإطلاع على قائمة المواد غير الفعالة انظر البند 2 -

"معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" والبند 6 -

"معلومات إضافية".

اقرأ النشرة يامعنى حتى تهليلها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفر لديك

أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للأخرين. قد

يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

الدواء غير مخصص للأولاد الذين عمرهم أقل من 6 أعوام.

استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

### ١. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لإضافة فيتامينات من المجموعة B.

علاج الآلام العصبية والاضطرابات الاستقلالية وفقاً لوصية

الصيدلي.

الفصيلة العالجية: مزيج من الفيتامينات من المجموعة B

(B1, B6, B12).

### ٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كانت لديك حساسية (أرجية) للمواد الفعالة أو لأي من

المرکبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند

6 - "معلومات إضافية").

كنت تعاني من داء ليبير (ضمور وراثي للعصب

البصري).

## ٣. تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء على فترات متقاربة أو لفترة

متواصلة دون استشارة الطبيب.

إذا كانت لديك حساسية لغذاء ما أو دواء ما، فعليك إعلام الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.

قد يؤدي استعمال جرعة دوائية مفرطة إلى أضرار في الجهاز العصبي.

قبل العلاج بالدواء أخبر الطبيب إذا كنت حاملاً أو مريضاً.

قد يظهر اعتلال عصبي محبطي بعد استعمال مستحضرات

تحتوي على فيتامين B6 بجرعة دوائية عالية وأو لفترة

متواصلة. يجب التوقف عن استعمال المستحضر إذا ظهرت أعراض مثل التقليل، الوخز والإحساس بالحرق

عادي في راحتي اليدين والقدمين، مما قد يشير إلى اعتلال عصبي، واستشارة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن.

### ٤. التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً دوائية أخرى بما

في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة يجب إعلام الطبيب أو

### ٥. الصيدلي إذا كنت تستعمل:

لينثودوبا (الپاركينسون).

### ٦. الحمل، الآلام والخصوصية

إذا كنت حاملاً أو مريضاً فعليك استشارة الطبيب قبل استعمال

الدواء.

معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملг من الصوديوم في الفرق

ولذلك يعتبر خاليًا من الصوديوم.

### ٧. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دواماً وفق تعليمات الطبيب. عليك

استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة

الدوائية ومن كيفية العلاج.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الدوائية المتبقية عادة هي: 1-2 أقراص في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية التناول - يجب ابتلاع الدواء مع القليل من الماء.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• ظروف التخزين: جزءه في العبوة الأصلية في درجة حرارة أقل من 25°C.

### ٦. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد المغالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Microcrystalline Cellulose (MCC),  
Maltodextrin, Povidone K-25, Opadry White (Hypromellose, Titanium Dioxide, Macrogol), Magnesium Stearate, Sodium Citrate Dihydrate, Citric Acid, FD&C Red No.40.

الهرس/الشطر/المضخة في حالة وجود صعوبات في البلع يمكن هرس/سحق القرص وبلعه على الفور.

عند عدم وجود خط للشطر، لا يجوز شطر القرص.

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر من اللازم إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال شالوش B إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقى عند فراغة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعانى من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهر تهيج أو طفح جلدي.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعانى من عرض جانبى لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

### ٥. التلقيح عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التلقيح عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

المتعلقة للتلقيح عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### ٥. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم.

