

**توبيتريم 25 ملغ، 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ** أفراص

كل قرص يحتوي على: توبيتريمات 25 ملغ، 50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ،  
Topiramate: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

تقائمة المواد غير الفعالة والمثبتة للحساسية: انظر الفصل 2، البند "معلومات عن بعض مكونات الدواء"، والفصل 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. صنف هذا الدواء من أجبك. لا تعطه للأطفال. يفيد بضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال دون عمر سنتين ولا كإحدى الأدوية المنفرد لمن هو دون عمر 7 سنوات.

### 1. كلاً من مرضى مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لـ:  
• علاج الاختلاج. الاستعمال بالاشتراك مع أدوية أخرى لدى كبار وطال من عمر سنتين وما فوق. أو كملاخ بوائي منفرد لمرضى كبار وأطفال من عمر 7 سنوات وما فوق.  
• منع من أجل الرأس الصدفي (ميوجرينا) لدى الكبار. المستحضر غير مخصص لسكنين الألم أثناء نوبة ألم الرأس الصدفي – ميوجرينا.

### الفصلية العلاجية: أدوية مضادة للصرع

### 2. قبل استعمال الدواء

#### لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، والمثبتة في البند 6.
- من أجل منع من الرأس الصدفي (ميوجرينا) إذا كنت في فترة الحمل أو تظنين أنك حامل أو إذا كنت بين الحوصرية ولا تستعملين وسائل منع حمل ناجعة.

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني من:  
مشاكل في الكلى، خاصة حصى في الكلى أو إذا كنت مرضياً يخضع للعلاج بالديالزة. سابقية لمشاكل تتعلق بسوائل الدم والجسم (حمض استقلابي metabolic acidosis)، مشاكل في الكبد، مشاكل في العينين (حوصلة إذا كنت تعاني من جلوكوما).
- مشاكل في النمو.
- إذا كنت تتبع حمية خفيفة للكيتون (حمية قليلة بالكربوهيدرات وغنية بالدهم).
- كنت في فترة الحمل أو في سن الإخصاب، (انظري البند الحمل والإرضاع لمعلومات إضافية).

إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث مع الطبيب قبل استعمال الدواء. من المهم أن تتوقف عن تناول الدواء بدون استشارة الطبيب أولاً.

لا يجوز تناول أي دواء آخر يحتوي توبيترامات، الذي يعطى لك كبديل لهذا الدواء، بدون استشارة الطبيب مسبقاً.

من الجائز أن تفقد من وزنك خلال فترة استعمال توبيتريم. عليك أن تزن نفسك بشكل دائم أثناء العلاج بد توبيتريم. في حال فقدان الكثير من الوزن أو أن الطفل المصاب بد توبيتريم لا يزيد ما وزنه بشكل ذاتي، يجب استشارة الطبيب.  
لدى عدد قليل من المرضى الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل توبيتريم، بلغ عن أفكار انتحارية أو تصرف انتحاري. في حال ظهور أفكار انتحارية يجب مراجعة الطبيب فوراً!

- قد يؤدي توبيتريم إلى أعراض جانبية جلدية خطيرة. أخبر الطبيب فوراً إذا تطور لديك طفح وأو بثورات جلدية.
- في حالات نادرة، يمكن أن يسبب توبيتريم ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم (يظهر ذلك في فحوص الدم) ما يؤدي إلى تغيير في أداء الدماغ، خصوصاً أثناء تناول توبيتريم مع حمض الفالوريك أو الفلوروات الصوديوم. بما أن الرضع قد يكون خطيراً، يجب التوجه إلى الطبيب إذا حدثت الأعراض التالية:
  - صعوبة في التفكير، تذكر المعلومات أو حل المشاكل
  - شعور بانخفاض اليقظة/التأهب
  - شعور بالغثاس ونقص الطاقة

لدى تناول جرعات مرتفعة من توبيتريم يمكن أن يزداد خطر حدوث هذه الأعراض.

### الأطفال والمراهقين:

الأطفال الجانبية لدى الأطفال شبيهة بشكل عام بتلك لدى لدى البالغين. لكن الأعراض

الجانبية المذكورة في فصل الأعراض الجانبية لدى الأطفال يمكن أن تكون أكثر انتشاراً لدى الأطفال مما هي لدى البالغين.

### الحواجز والمتابعة:

يجب إجراء فحص للحمّل قبل بدء العلاج بتوبيتريم.

### التفاعلات الدوائية مع الفلج بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، عليك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يمكن أن يؤثر توبيتريم وأدوية أخرى أدهما على الأخرى. سيقرر الطبيب إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل جرعات توبيتريم أو الأدوية الأخرى التي تتناولها.

بشكل خاص، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى التي تؤثر أو تقلل من مستوى التفكير لديك، التركيز أو التنسيق بين الصلوات (مثلاً: مثبّطات الجهاز العصبي المركزي مثل المرحبات العضلية والأدوية للتهدئة والنوم).
- أفراص منع الحمل. قد يضعف توبيتريم من نجاعة أفراص منع الحمل. تحدثي مع طبيبك حول وسيلة منع الحمل الأكثر ملاءمة لاستخدامها أثناء العلاج بتوبيتريم. بلغي الطبيب إذا كنت تقاسمين تغيرات في الدورة الشهرية خلال فترة استعمال وسائل منع الحمل وتوبيتريم.

حضر قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها وأر هذه القائمة للطبيب أو الصيدلي كلّ مرة قبل البدء بتناول دواء جديد.

يجب الحثث مع الطبيب أو الصيدلي أيضاً حول تناول الالعاقب التالية:

- أدوية أخرى مضادة للصرع.
- ريسبيديول (العلاج للصرع).
- ليتيوم (لعلاج الهوس الاكتئابي).
- هيدروكلوروثيازيد، بروبرينالولول، ديلتايزلم (لعلاج مشاكل قلبية وتخفيف ضغط الدم).
- ميتوفورمين، بيوجليتازون، جليبيريد، جليلينكلاميد (العلاج السكري).
- أميتريبتلين، فينيلفاكسين (العلاج الاكتئابي).
- فلوريازيبين (لمنع الميوجرينا وعلاج القيرتوج).
- فلوبريدوكوم بيريفورأ توم (St. John's wort) دواء نباتي لعلاج الاكتئاب).
- وارفارين (تسليع الدم).

### استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول توبيتريم مع الطعام أو دون طعام.

يجب الحرص على الإكثار من شرب السوائل أثناء العلاج (من أجل تقليل خطورة تشكل حصى في الكلى).

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

يجب الامتناع عن شرب الكحول خلال فترة العلاج بالدواء.

### الحمل والإرضاع:

#### تحبب الشقيقة (الصداع النصفي)

يمكن أن يؤدي توبيتريم الحنين. يمنع استعمال توبيتريم تحبب الشقيقة إذا كنت امرأة في سن الإخصاب إلا إذا كنت تستخدمين وسائل ناجعة لمنع الحمل. استشري الطبيب بالنسبة لوسائل منع الحمل الأفضل من الناحية بالنسبة لك وهل توبيتريم ملائم لك. يجب إجراء فحص للحمّل قبل بدء العلاج بتوبيتريم.

#### معالجة الصرع

إذا كنت امرأة في سن الإخصاب، يجب أن تستشيري طبيبك حول علاجات أخرى بدل توبيتريم. إذا اتخذت قرار العلاج بتوبيتريم، يجب استعمال وسائل منع حمل ناجعة. استشري طبيبك حول وسائل منع الحمل الأفضل لك أثناء استخدام توبيتريم. أخبري الطبيب إن كنت تردين الحمل.

مقابلته للأدوية المضادة للصرع الأخرى، هناك خطر حدوث ضرر جنين إذا استخدم توبيتريم خلال الحمل.

- تأكدتي من أنك مررةً للمطاهر والفوائد من استعمال توبيتريم صرع خلال الحمل.
- إذا كنت تتناولين توبيتريم خلال الحمل، هناك خطر كبير أن تحدث عيوب خلقية لدى الجنين، خصوصاً الشفة المشقوقة (فجح الشفة العليا) والحك المشقوق (انشقاق في سقف الفم). يمكن أن يعاني الجنين من تشوه في العصب (hypospadia).
- قد تطوّر هذه العيوب الخلقية في مرحلة مبكرة من الحمل، وأحياناً قبل اكتشاف الحمل.
- لدى تناول توبيتريم أثناء الحمل، يمكن أن يكون حجم المولود أقل من المتوقع. استشري الطبيب إذا كانت لديك أسئلة حول هذا الخطر خلال الحمل.
- تكون هناك أدوية أخرى لمعالجة وضعك أقل خطورة بتسبب بعيوب خلقية للجنين.
- يجب إخبار الطبيب فوراً حين تكتشفين أنك حامل لدى تلقي العلاج بتوبيتريم. أنت وطبيبك تقرران إن كنت ستستمرين في تناول توبيتريم خلال الحمل.

### الإرضاع:

المادة الفعالة في توبيتريم (توبيترامات) تنتقل عبر حليب الأم. شوهدت آثار على الرضع المولدين بمرضون من الأمهات اللواتي يتناولن توبيترامات، تشمل الإسهال، الغثاس، العصبية، والإرتقاع والغثيف في الوزن.

استناداً إلى ذلك، يتحدث الطبيب معك هل عليك الامتناع عن الإرضاع أم وقف العلاج بتوبيتريم. سيقرر الطبيب بخصوص أهمية الدواء لإقلاع لأم مقابل الخطر على الرضيع.

على الأمهات اللواتي يرضعن خلال استعمال توبيتريم إبلاغ الطبيب حالاً بأي أعراض غير عادية يختبره الرضيع.

### السيفر واستخدام الماكينات:

استعمال الدواء قد يسبب الدوران، والإرهاق ومشاكل في الرؤية. لا تقم بالسيارة أو تستعمل الماكينات الخاصة قبل أن تحدث أو لا مع الطبيب.

### معلومات مهمة عن بعض منتجات الدواء:

تحتوي أقراص توبيتريم على لاكتوز. إذا كنت تعاني من قلة تحمل لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل استعمال الدواء.  
تحتوي أقراص توبيتريم على أقل من 1 ميليوم صوديوم (23 ملغم) للقرص، وبالتالي تعتبر "خالية من الصوديوم".

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يبدأ الطبيب غالباً بجرعة دوائية منخفضة من توبيتريم ويرفع الجرعة الدوائية تدريجياً حتى إيجاد الجرعة الدوائية المناسبة لك.

#### لا يجوز تناول الالعاقب الدوائية الموصى بها.

يجب بضع أقراص توبيتريم بشكلها الكامل.  
عند نطق وجود خطر لنشطر، ممنوع شطر القرص. ليست هناك معلومات متعلقة بسحق القرص/مضغه. قد يترك القرص الذي يتم سحقه أو مضغه طعماً مرّاً.

بالإمكان تناول توبيتريم قبل الطعام، مع أو بعده.  
يجب الحرص على الإكثار من شرب الماء خلال فترة العلاج لتجنب تشكل حصى في الكلى خلال العلاج.

#### إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة من الجائز أن تشعر بالمل إلى النوم، بالإرهاب أو قلة اليقظة، تقاسي قلة التارسق، صعوبة في النطق أو صعوبة في التركيز، ازدياد البروية أو تشوش الرؤية، شعور بالانكباب أو بالغثاس، أو بالصدية، دور، نتيجة انخفاض ضغط الدم، ألم في البطن، أو اختلاجات. فرط الجرعة الدوائية يمكن أن يحدث عندما تتناول أدوية أخرى مع توبيتريم.

إذا نسيت تناول هذا الدواء فيجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك ولكن إذا تذكرت قريباً لمعد تناول الجرعة الدوائية التالية، فزوت الجرعة الدوائية التي تسبقها واستمر كالمعتاد. لا يجوز تناول قرصين دوائيين معاً في أي حال من الأحوال!

إذا نسيت قرصين دوائيين أو أكثر، اتصل بالطبيب.  
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.  
لا يجوز التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية لأنك لا الأعراض قد تعود. إذا قرر الطبيب إيقاف العلاج، سيتم تخفيض الجرعة الدوائية بشكل تدريجي لمدة عدة أيام.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال توبيتريم قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تحدث من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

راجع الطبيب بشكل فوري إذا لاحظت بأحد الأعراض التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً - very common - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

اكتئاب (جديد أو متفاقم)

أعراض جانبية شائعة - common - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من كل 100:

- اختلاجات
- قلق، عصبية، تغيرات في المزاج، ارتباك، توران
- اضطرابات في التركيز، تباطؤ التفكير، فقدان الذاكرة، مشاكل في الذاكرة (جديدة)، تغيير مفاجئ أو تافه
- حمى في الكلى، تكرر البثور أو تبول مؤلم

أعراض جانبية غير شائعة - uncommon - أعراض تظهر لدى 1-10 من بين كل 1000 مستعمل:

- ارتفاع نسبة الحموضة في الدم (قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس تشمل ضيق في التنفس، فقدان الشهية للطعام، غثيان، قيءات، إرقاق مرط ونبضات قلب سريعة أو غير متزنة)
- انخفاض أو توقف التعرق (خاصة لدى الأطفال الصغار المعرضين لدرجات حرارة مرتفعة)
- أفكار ومحاولات خطيرة لإيذاء الذات
- فقدان جزء من مجال الرؤية

أعراض جانبية نادرة - rare - أعراض تظهر لدى 1-10 من بين كل 10,000 مستعمل:

- جلوكوما (احتباس سوائل في العين الذي يؤدي إلى ارتفاع في الضغط داخل العين، ألم أو تدم في الرؤية)
- صعوبة في التفكير، تذكر المعلومات، أو حل المشاكل، انخفاض اليقظة، شعور شديد بالنعاس ونقص الطاقة - يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشرا على وجود نسبة مرتفعة من الأمونيا في الدم (فرط أمونيا الدم)، ما يمكن أن يؤدي إلى تغير في أداء الدماغ (اعتلال دماغي ناتج عن فرط أمونيا الدم)
- ردود فعل جلدية خطيرة، مثل متلازمة ستيفنز جونسون وتقرح الأنسجة الممتدة الشبكية (Toxic Epidermal Necrolysis) - قد تظهر هذه كطفح مع أو دون بثورات، تهييج الجلد، جروح وتورم في منطقة الفم، الحرقحة، الأنف، العينين، وحول الأعضاء التناسلية. قد يتطور الطفح الجلدي ويسبب ضررا جلديا منتشرا (تقرح طبقة الجلد الخارجية والأنسجة المخاطية السطحية)، ويؤدي إلى تأثيرات تشكل خطرا على الحياة.

أعراض جانبية إضافية وتيرة انتشارها غير معروفة (لم تحدد بعد):

- التهاب العنقبة بالعين (uveitis)، مصحوب بأعراض مثل احمرار في العين، ألم، حساسية للضوء، تدمع العينين، رؤية تافهة صغيرة أو تشوش الرؤية.

أعراض جانبية إضافية في حال تفاعمت يجب تبليغ الطبيب:

أعراض جانبية شائعة جدا - very common - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- احتقان الأنف، زكام، ألم في الحنجرة • وخز، ألم و/أو خدر في أجزاء مختلفة من الجسم
- إرقاق أو الميل إلى النوم • دوام • إسهال • غثيان • نتائح الوزن

أعراض جانبية شائعة - common - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين كل 100:

- فم قد (تعداد منخفض للدم) • رد فعل تحسسي (مثل طفح في الجلد، احمرار، حكة، انتفاخ في الوجه، شرى) • انخفاض الشهية للطعام • فقدان الشهية للطعام • عدوانية، قلق، غضب، تصرف غير اعتيادي • صعوبة في الخلود إلى النوم • النوم • مشاكل في التنطق • اضطراب في التنطق، التلعثم في التنطق • تقل الحركة أو عدم التناسق، الشعور بعدم الثبات أثناء المشي • انخفاض في القدرة على إتمام نشاطات روتينية
- انخفاض/فقدان/انقص حساسة التذوق • رجحان لا إرادي • حركات سريعة، خارجة عن السيطرة للعينين • اضطرابات في الرؤية مثل ازدواج الرؤية، رؤية ضبابية، تدمي الرؤية، صعوبة تمييز الرؤية • الشعور بدوار (فيرتيجو)، طنين في الأذنين، ألم في الأذنين.
- ضيق في التنفس • سعال • رعاف • سخونة • ضعف • شعور عام غير جيد • قيءات • إمساك • الإم في البطن أو الزغاع في البطن • صعوبات هضمية • تلوث في المعدة أو الأمعاء • جفاف الفم • فقدان الشعر • حكة • الإدم أو انتفاخ في المفاصل • تقلص أو تشنج عضلي، الإدم أو ضعف في العضلات • ألم في الصدر • زيادة في الوزن

أعراض جانبية غير شائعة - uncommon - أعراض تظهر لدى 1-10 من بين كل 1000 مستعمل:

- تعداد دم غير سليم، يشمل انخفاض كمية خلايا الدم البيضاء (التي تساهم في الحماية من التلوثات) أو الصفائح الدموية (خلايا الدموية التي تساعد على وقف النزف) أو ارتفاع نسبة الخلايا الحمضية/الليوزينات (نوع من خلايا الدم البيضاء)
- مستويات منخفضة للبروتاسيوم في الدم
- ارتفاع نسبة إيزيمات الكبد

• انتفاخ الغدد في العنق، في الإبط أو في فم فرج الرجلين

- زيادة الشهية للطعام
- مزاج مرهف
- سماع، رؤية أو الشعور بأشياء موجودة، اضطرابات نفسية خطيرة (ذهان)
- الشعور بعدم المبالاة أو إظهارها، ارتباب غير اعتيادي، نوبات حلع
- مشاكل في القراءة، اضطرابات في التنطق، مشاكل في الكتابة
- قلة الراحة أو فرط النشاط

• يتباطؤ التفكير، تدمي الانتباه أو اليقظة- حركات بطيئة للجسم أو تدمي الحركة
- حركات شاذة ولا إرادية أو متكررة للعضلات
- إغماء

- حساسة لمس مختلفة أو غير سليمة
- حساسة شم متضررة أو مشوهة أو فقدان حساسة الشم
- شعور أو إحساس غير عادي يمكن أن يسبق الميجرنا أو أحد أنواع الاختلاج
- مشاكل في العينين تشمل جفاف العينين، حساسية العينين للضوء، تشنجات لا إرادية للفضين، تدمع

- انخفاض أو فقدان السمع، فقدان السمع في أذن واحدة
- نبض غير اعتيادي أو بطيء، ضربات قلب
- ضغط دم منخفض أو انخفاض ضغط الدم عند الانتقال لوضعية الوقوف (لذا فإن أشخاص معينين الذين يتناولون توبيتريم قد يشعروا بإغماء، دوام أو قد يغمى عليهم عندما يقفون أو يمشون بشكل مفاجئ)
- هبات من الحر، الشعور بالحر
- التهاب في البنكرياس
- غازات، حرقان، الشعور بانتفاخ أو امتلاء
- زرق من اللثة، زيادة في إنتاج اللعاب، سيلان اللعاب، رائحة كريهة من الفم
- العطش وشرب كميات كبيرة من السوائل
- تغير لون الجلد
- تصلب العضلات، ألم جانبي
- دم في البول، عدم السيطرة على التبول، الشعور بالإلحاح على التبول، ألم في منطقة الكلى

- اضطرابات في الوظيفة الجنسية، صعوبة في الوصول إلى انتصاب القضيب الذكري
- والحفاظ على ذلك
- مرض شبيه بالإنفلونزا
- الشعور ببرودة في أصابع اليدين والساقين
- الشعور بالمثل
- صعوبات في التعلم

أعراض جانبية نادرة - rare - أعراض تظهر لدى 1-10 من بين كل 10,000 مستعمل:

- مزاج مرهف بشكل غير عادي
- فقدان الوعي
- عى في عين واحدة، عسى مؤقت، عسى ليلي
- عدم كسوية
- انتفاخ العين ومحيط العين
- خدر، وخز، أو تغير اللون (أبيض، أزرق، أحمر) في أصابع اليدين والساقين عند التعرض للبرد

• التهاب الكبد، فشل كبدي

• رائحة كريهة للجلد

• انزعاج في الزراعين أو الرجلين

• مشاكل في الكلى

أعراض جانبية، شيوها غير معروف (لم يحدد بعد):

- Maculopathy - مرض منطقة "البقعة (اللثة)" في العين. تلك هي النقطة الصغيرة في الشبكية التي تكون فيها الرؤية أكثر حدّة. في حال كنت تلاحظ تغيير أو تدمي في الرؤية - يجب مراجعة الطبيب

أعراض جانبية لدى الأطفال

- الأعراض الجانبية لدى الأطفال تشبه بصورة عامة تلك الموجودة لدى الكبار. لكن الأعراض الجانبية التالية قد تكون شائعة أكثر لدى الأطفال ما هو عليه لدى الكبار: صعوبات التركيز • ارتفاع نسبة الحموضة في الدم • أفكار عن إلحاق الأذى الذاتي بشكل خطير • إرقاق • انخفاض أو زيادة الشهية للطعام • عدوانية، تصرف غير اعتيادي • صعوبة في الخلود للنوم • الشعور بعدم ثبات خلال المشي • شعور غير جيد • انخفاض نسب البوتاسيوم في الدم • عدم الإحساس بالعواطف أو عدم إظهارها

• تدمع العينين • نظم قلب بطيء أو غير اعتيادي

• أعراض جانبية أخرى قد تحدث لدى الأطفال:

أعراض جانبية شائعة - common - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من كل 100:

• الشعور بدوار (فيرتيجو) • تقيؤ • سخونة

أعراض جانبية غير شائعة - uncommon - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من كل 1000:

• ارتفاع نسبة الحمضات (نوع من كريات الدم البيضاء) في الدم • فرط نشاط • الشعور بسخونة • صعوبات في التعلم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاعمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من أعراض جانبية لم تذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن أعراض جانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التبليغ أيضا عبر البريد الإلكتروني: [safety@trima.co.il](mailto:safety@trima.co.il)

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيدا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال رؤيتهم وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة/البليستر. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب التخزين في مكان جاف، تحت 25°C.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي المستحضر أيضا على المواد غير الفعالة التالية:

- Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, sodium starch glycolate, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, polyethylene glycol.
- توبيتريم 25 ملغ • يحتوي على 17 ملغ من اللاكتوز و 0.1 ملغ من الصوديوم.
- توبيتريم 50 ملغ • يحتوي على 34 ملغ من اللاكتوز و 0.2 ملغ من الصوديوم.
- توبيتريم 100 ملغ • يحتوي على 68 ملغ من اللاكتوز و 0.4 ملغ من الصوديوم.
- توبيتريم 200 ملغ • يحتوي على 136 ملغ من اللاكتوز و 0.8 ملغ من الصوديوم.

كيف يبدو الدواء وما محتوي العلبة؟

• توبيتريم 25 ملغ، توبيتريم 50 ملغ، توبيتريم 100 ملغ: قرص مطلي، مستدير، لونه أبيض - أبيض مائل إلى الصفرة (off white).

• توبيتريم 200 ملغ: قرص مطلي، مطول، لونه أبيض - أبيض مائل إلى الصفرة (off white).

الأقراص معبأة في عبوات بليسترات. تحتوي كل عبوة على 60 قرصا.

• المنتج ومصاحب التسجيل: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معروفة م.ض. معرور 4023000، إسرائيل.

تم تحريرها في نيسان 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

• أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

• توبيتريم 25 ملغ 136.63.31514.00

• توبيتريم 50 ملغ 136.64.31515.00

• توبيتريم 100 ملغ 136.65.31516.00

• توبيتريم 200 ملغ 136.66.31517.00

• من أجل سهولة وتوحيين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.



معرور 4023000

منتجات طبية إسرائيلية

معرور م.ض.

0211

PIL-0621-08

P00001236