

**עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986**  
התרופה משוקקת על פי מרשם רפואי בלבד

**ג'נדבירה®  
טבליות מצופות 150 מ"ג/150 מ"ג/200 מ"ג/10 מ"ג**

150 מ"ג	אלביטגראביר (elvitegravir)
150 מ"ג	קוביסיסטאט (cobicistat)
200 מ"ג	אמטריציטאבין (emtricitabine)
10 מ"ג	טנופובייר אלאפנאמיד (tenofovir alafenamide)

חומרים פעילים: כל טבליה מכילה –

אלביטגראביר (elvitegravir)

(cobicistat)

אמטריציטאבין (emtricitabine)

(tenofovir alafenamide)

חומרם בלתי פעילים ואלרגנים: ראה סעיף 6 "מידע נסף".

קראו בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה זו מכיוון שMOVED בז' מידע חשוב עבורך.  
עלון זה מכיל מידע חינני על תרופה זו. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור עלון זה.  
יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב. תרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק  
להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה לשדר. אם תופיע אצלך תופעת לוואי כלשהי, היוויעץ ברופא או  
ברוקח. בין תופעות הלואוי נכללת כל תופעת לוואי אפשרית שאינה רשומה בעلون זה. ראה סעיף 4.

תרופה זו מיועדת למבוגרים, למתבגרים וילדים בני 6 שנים ומעלה, השוקלים 25 ק"ג לפחות.

**1. למה מיועדת ג'נדבירה?**

ג'נדבירה היא טבליה יחידה לטיפול ב齊hom החיסוני האנושי 1 (HIV) במבוגרים, במתבגרים  
ובילדים בני 6 שנים ומעלה השוקלים 25 ק"ג לפחות.

אם ג'נדבירה רשום עבורך, המידע הקיים בעיון זה מיועד לך (אנא החלף את המילה " לך" במילה  
"לך").

קבוצה תרפואית:  
ג'נדבירה מכילה ארבעה חומרים פעילים:

- אלביטגראביר (elvitegravir), תרופה נגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב אינטגראז
- קוביסיסטאט (cobicistat), מאיץ (מגבר את השפעתו) של אלביטגראביר
- אמטריציטאבין (emtricitabine), תרופה נגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב טנסקריפטاز הופכי של  
נוקלואזיד (NRTI)
- טנופובייר אלאפנאמיד (tenofovir alafenamide), תרופה נגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב  
טנסקריפטاز הופכי של נוקלואזיד (NtRTI)

ג'נדבירה מפחיתה את כמות HIV בגוף. היא תשפר את תפקוד מערכת החיסון שלך ותפחית את הסיכון  
שתפתח מחלות הקשורות ב齊hom ב-HIV.

**2. לפני שימוש בג'נדבירה**

<b>אין להשתמש בתרופה אם</b>
- אתה רגיש (אלרגי) לאלביטגראביר, קובייסטאט, אמטריציטאבין, טנופובייר אלאפנאמיד, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (רשומים בסעיף 6 של עיון זה).
<b>אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:</b>
- אלפוזוין (משמשת לטיפול בהגדלה של בלוטת הערמוונית) - דיביגטロン (משמשת למנעה וטיפול בקרישוי דם) - אמיודרואן, כינידין (משמשות להסדרת קצב לב בלתי סדיר)

- קרבנזפין, פנוברביטל, פנטואין (משמשות למניעת פרכוים)
  - ריפאמיצין (משמשת למניעת שחפת וziehominis אחרים ולטיפול בהם)
  - דיהידרארגוטמיין, ארגומטרין, ארגוטמין (משמשות לטיפול באבי ראש מגרכנותיים)
  - ציסאפריד (משמשת להקלת על בעיות קיבת מסויימות)
  - פרע מחרור (*Hypericum perforatum*) צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון וחרדה או מוצאים המכילים אותו
  - לומיטפייד, לובסטטין, סימבסטטין (משמשות להפחחת רמת הcolesterol בدم)
  - לורסידון, פימודיז (משמשת לטיפול במחשובות או תחששות לא תקינות)
  - סילדנפלייל (כאשר משתמשים בה לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי - מחלת ריאות הגורמת לקשי נשימה)
  - מידזולם, טרייזולם במתן פומי (עווזרות לשון /או לשך חרדה)
- ← אם אחד הדברים הללו חל עלייך, אסור לך ליטול ג'נדבירה ועליך לספר על כך לרופאך מיד.

## ■ **ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה זו**

בעת נטילת ג'נדבירה עליך להישאר תחת השגחת רופא.

גם בעת נטילת תרופה זו אתה עדין עלול להעביר את נגיף הכלול החיסוני האנושי (VH), למרות טיפול ייעיל בנגד נגיפי רטרו מפחית את הסיכון. היועץ ברופא לגביו אמצעי זהירות הדורים כדי למנוע הדבקה של אנשים אחרים. תרופה זו אינה מרפאת זיהום-ב-VH. בעת נטילת ג'נדבירה עדין יתכן שתפתח זיהומים או מחלות אחרות הקשורות בזיהום-ב-VH.

### **יש להיוועץ ברופא לפני נטילת ג'נדבירה:**

- אם יש לך בעיות בכבד או עבר של מחלת כבד, כולל דלקת כבד. מטופלים עם מחלת כבד כרונית כוללים דלקת כבד כרונית מסווג B או C, המטופלים בתרופות נוגדות נגיפי רטרו, נתונים בסיכון רב יותר לפתח סיבוכים חמוריים בכבד שיש להם פוטנציאל להיות קטלניים. אם יש לך זיהום בדלקת כבד מסווג B, הרופא ישקול בקפידה מה משטר הטיפול הטוב ביותר עבורך.
- אם יש לך זיהום בדלקת כבד מסווג B, בעיות בכבד עלולות להחמיר אחרי שתפסיק ליטול ג'נדבירה. חשוב לא להפסיק ליטול ג'נדבירה בלבד להיוועץ ברופא: ראה סעיף 3, "אל תפסיק ליטול ג'נדבירה".
- אם הייתה לך מחלת כליות בעבר או במידה ובבדיקות הדם העלו בעיות עם הכליות שלך. יתכן והרופא שלך יבקש לבצע בדיקות דם נוספת על מנת לבחון את פעילות הכליות שלך בתחילת ובמהלך הטיפול עם ג'נדבירה.

## **בעת נטילת ג'נדבירה**

אחרי שהתחלת ליטול ג'נדבירה, עליך לשים לב:

- לסיימי דלקת או זיהום
- לכאב מפרקים, נוקשות או בעיות בעצמות

← אם תבחן באחד מהתסמינים הללו ספר מיד לרופא. למידע נוסף ראה סעיף 4, "תופעות לוואי".

על אף כי לא נצפו בעיות בכליות בקרוב מטופלים שנטלו ג'נדבירה, קיימת אפשרות כי תחווה בעיות בכליות בגין נטילת ג'נדבירה במשך תקופה ארוכה (ראה "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה זו").

## **ילדים ומתבגרים**

אין לתת תרופה זו לילדים בני 5 שנים ומטה, או השוקלים פחות מ-25 ק"ג ללא תלות בגיל. השימוש בג'נדבירה בילדים בני 5 שנים ומטה עדין לא נחקר.

## תרופות אחרות וג'נדבירה

אם אתה לוקה, לך תרופה לאחרונה, או יתכן ותיקח תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. ג'נדבירה עשויה להגיב עם תרופות אחרות. הדבר עשוי להשפיע על הנסיבות של ג'נדבירה או תרופות אחרות בدم. התרופות שלר עלולות להפוך לךויל רפואי, או שתופעות לוואי כלשהן עלולות להחמיר. במקרים מסוימים הרופא יצטרך לשנות את מינון התרופה או לבדוק את רמת התרופה בדם.

### תרופות שאין ליטול עם ג'נדבירה:

- אלפודזין (משמשת לטיפול בהגדלה של בלוטת הערמונית)
- אמיודרין, כינידין (משמשות להסדרת קצב לב בלתי סדייר)
- קרבנזfine, פנוברביטל, פנטיאין (משמשות למניעת פרכוסים)
- דיביגטן (משמשת למניעה ולטיפול בקריש דם)
- ריפאמיצין (משמשת למניעת שחפת וזיתומים אחרים ולטיפול בהם)
- דיהידרארגוטמין, ארגומטرين, ארגומטמין (משמשות לטיפול במיגרנה)
- ציסאפריד (משמשת להקלת על בעיות קיבה מסוימות)
- פרע מחרור (*Hypericum perforatum*, צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון וחרדה) או מוצרים המכילים אותו
- לומיטפיד, לובסטטין, סימבסטטין (משמשות להפחחת רמת הcolesterol בדם)
- לורסידון, פימוזיד (משמשת לטיפול בחזק ביתר לחץ דם ריאתי עורקי - מחלת ריאות הגורמת לקשה בשינה)
- סילדנafil (כאשר משתמשים בה לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי)
- מידזולם, טרייאזולם במתן פומי (עווזרות לשון / או לשכך חרדה)

← אם אתה נוטל אחת מהתרופות האלה, אל תיטול ג'נדבירה וספר מיד לרופא.

### תרופות המשמשות לטיפול בזיהום בדלקת כבד מסוג B:

אסור ליטול ג'נדבירה עם תרופות המכילות:

- טנופובייר אלאלפאנאמיד
- טנופובייר דיסופורוקסיל
- למיבודין
- אדפובייר דיפיבוקסיל

← ספר לרופא אם אתה נוטל אחת מהתרופות האלה.

### סוגי תרופות אחרים:

ספר לרופא אם אתה נוטל:

- **תרופות נוגדות פטריות**, המשמשות לטיפול בזכיהומים פטריטיים, כמו:
  - קטוקונצול, איטרkonczol, וויריקונצול, פוסקונומול ולוקונצול
- **אנטיביוטיקה**, המשמשת לטיפול בזכיהומים חידקניים כולל שחפת, המכילה:
  - ריבובוטין, קלריטרומיצין וטליתרומיצין
- **נוגדי דיכאון**, משמשים לטיפול בדיכאון:
  - תרופות המכיללות טריזידון או אסציטולופרם
- **תרופות הרגעה ותרופות משרות שינה**, המשמשות לטיפול בחרדה:
  - בוספירון, קלורואזפאט, דיאזפאם, אסטוזולם, פלורזפאם, זולפידם ולורצפאם
- **תרופות מדכאות מערכת החיסון**, משמשות לשיליטה בתגובה מערכת החיסון אחריו השתלה, כמו:
  - ציקלאוספורין, סיורולימוס וטקרולימוס
- **קורטיקוסטרואידים הכלולים**
  - בטמטזון, בוזזוניד, פלוטיקזון, מומטזון, פרדנייזון, טריאמקינולון.

תרופות אלו משמשות לטיפול באלהריגיות, אסתמה, מחלות מעי דלקתיות, דלקות עור, עיניים, מפרקים, שרירים ודלקות אחרות. תרופות אלה ניתנות בדרך כלל במתן פומי, בשאייפה, בהזרקה או במריחה על העור או העין. אם לא ניתן ליטול חלופה, השימוש יהיה רק לאחר בחינה רפואיית ומעקב קפדי של רופא לתופעות לוואי של קורטיקוסטרואידים.

### תרופות המשמשות לטיפול בסוכרטה:

- מטפורמין
- גלולות למניעת הירין, המשמשות למניעת הירין

- **תרופות לטיפול בכשל זקפה**, המשמשות לטיפול באין-אונות, כמו:
    - סילדנפיל, טידלפיל וורדנאפיל
  - **תרופות לטיפול בלב**, כמו:
    - דיגוקסין, דיזופיראמיד, פלקאניד, לידזקאין (בهزקה), מקסיליטין, פרופפנן, מטופרולו, טימולול, אמלודיפין, דיליטازם, פלוידיפין, ניקרדיפין, ניפדייפין וורפמייל
  - **תרופות המשמשות לטיפול לחץ דם ריאתי עורקים**:
    - בסוטן וטידלפיל
  - **נוגדי קריישה**, המשמשים למניעה וטיפול בקרישי דם, כמו:
    - אפיקסבן, אזוקסבן, ריברוקסבן וואראפרין
  - **מרחיבי סימפונות**, משמשים לטיפול באסתמה ובעビות אחרות הקשורות לריאות:
    - סלמטרול
  - **תרופות להפחחת רמת הcolesterol**, כמו:
    - אטוריובסטטין ופייטבסטטין
  - **תרופות המשמשות לטיפול בשיגdon:**
    - קוולכיצין
  - **נוגדי צימות טסיות**, המשמשים להפחחת הסיכון לקרישי דם, כגון:
    - קלופידוגREL
  - **תרופות או תוספי מזון הכלולים מינרלים** (כגון מגנזיום, אלומיניום, סיידן, ברזל, אבץ) כגון:
    - תוספי מינרלים, ויטמינים (כולל מולטי-ויטמינים), סותרי חומצה ומשלשלים.
- ← אם אתה נוטל **תרופות, תוספי מזון, סותרי חומצה או משלשלים הכלולים מינרלים** (כגון מגנזיום, אלומיניום, סיידן, ברזל, אבץ), יש ליטול אותם לפחות 4 שעות לפני או 4 שעות אחרי נטילת ג'ンדרה.

← **ספר לרופא אם אתה נוטל אותן או תרופות אחרות כלשהן.** אל תפיסך את הטיפול בלי להיוועץ קודם ברופא.

#### שימוש בתרופה ומזון יש ליטול עם מזון.

#### הירין והנקה

אם הירין בהירין או מניקה, חשוב שיתכן שתת בהירין, או מתכנתת להרות, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

- **ספר לרופא שלך אם הירין בהירין, חשוב שיתכן שתת בהירין, או מתכנתת להרות.** אין ליטול ג'נדבירה במהלך תקופת ההירין. כמות התרופה בגוף עלולה לדוד במהלך ההירין מה שעולם למנוע ממנו לעבוד באופן תקין.
- **השתמשי באמצעי מניעהיעיל** בעת נטילת ג'נדבירה.
- **אין להניך במהלך טיפול בג'נדבירה.** הסיבה לכך היא שחלק מהחומרים הפעילים בתרופה זו עוברים לחלב האם. מומלץ שלא להניך כדי למנוע העברת של הנגיף לתינוק דרך החלב.

#### נהיגה ושימוש במכונות

ג'נדבירה עלולה לגרום סחרחות. אם אתה חש סחרחות בעת נטילת ג'נדבירה, אין לנוהג או לרכב על אופניים ואין להפעיל כלים חמליים או מכונות חמליות.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

**ג'נדבירה מכילה נתרן**  
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, כך שניתן לומר שהיא "נטולת נתרן".

#### ג'נדבירה מכילה לקטוז

אם נאמר לך שיש לך אי-סיבות לSOCרים כלשהם, צריך קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

← אם אחד הדברים הללו חל עליו, **ספר לרופא שלך לפני נטילת ג'נדבירה.**

### **3. כיצד תשתמש בג'נדבירה?**

יש להשתמש תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטווח בוגר למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

**המינון המקורי:**

**מבוגרים: טבליה אחת ביום עם האוכל מתבגרים וילדים בני 6 שנים ומעלה, השוקלים 25 ק"ג לפחות: טבליה אחת ביום עם האוכל אין לעבור על המנה המומלצת.**

עקב טעם המר, מומלץ שלא ללווע או לכתוש את הטבליה.

אם יש לך קושי בבליעת טבליה שלמה, ניתן לחצוץ אותה לשניים. טול את שני החצאים אחד אחרי השני על מנת לקבל את המינון המלא. אל תתחסן את הטבליה החצאה.

**תמיד תיטול את המנה כפי שהומלצת על ידי הרופא שלך.** זאת בכך לוודא שלתרופה יעילות מרבית וכדי למנוע את הסיכון לפתח עמידות לטיפול. אל תנסה את המינון ללא הוראות מהרופא.

**אל תיטול נוגדי חומצה או מולטי-זיטמינים באותו זמן עם ג'נדבירה.** אם אתה נוטל תרופה, תוספי מזון, סותרי חומצה או משלשלים הכוללים מינרלים (כגון מגנזיום, אלומיניום, סידן, ברזל, אבץ), טול אותם לפחות 4 שעות לפני או 4 שעות אחרי ג'נדבירה.

**אם הנך עבר טיפול דיאליזה,** קח את המנה היומית של ג'נדבירה לאחר השלמת הטיפול.

**אם נטلت בעutes מינון גבוה יותר**

אם נטلت בעutes יותר מהמנה המומלצת של ג'נדבירה יתכן ותהיה בסיכון מוגבר לחוות תופעת לוואי של התרופה (ראה סעיף 4, **תופעת לוואי**).

פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים הקרוב והבא אריזת התרופה אליו.

**אם שכחת ליטול ג'נדבירה**

חשוב לא להחמיר מנה של ג'נדבירה.

אם החמצת מנה:

- **אם הבדיקה בכך בתוך 18 שעות** מהשעה שבה אתה בדרך כלל נוטל ג'נדבירה, יש ליטול את הטבליה בהקדם האפשרי. יש לקחת תמיד את הטבליה עם מזון. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
- **אם הבדיקה בכך 18 שעות או יותר** לאחר השעה בה אתה בדרך כלל נוטל ג'נדבירה, אל תיטול את המנה שהחמצת. המtan וקח את המנה הבאה, עם מזון, בשעה הרגילה.

**אם הקאת פחות משעה אחת אחרי נטילת ג'נדבירה,** טול טבליה נוספת עם מזון.

## אל תפיסיק ליטול ג'נדבירה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפיסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. אם תפיסיק ליטול ג'נדבירה, תגובתך לטיפול בעתיד עלולה להיגע באופן ממשועוט. אם אתה מפיסיק את נטילת ג'נדבירה מסיבת כלשהי, היועץ ברופא לפני שתתחיל ליטול שוב טבליות ג'נדבירה.

כאשר **כמויות הג'נדבירה שלר מתחילה להיגמר**, גש לרופא כדי לקבל עוד. זה חשוב ביותר מכיוון שכמויות הווירוס יכולות גם אם מפסיקים ליטול את התרופה בזמן קצר. יתכן והמחלה תהיה קשה יותר לטיפול.

אם אתה **נשא הנ של HIV והן של דלקת כבד מסוג B**, חשוב במיוחד לא להפיסיק את הטיפול בגין דלקת כבד ולהיעזר קודם קודם ברופא. אחריו הפסקת הטיפול יתכן שהייה נדרש לבצע בדיקות דם במשך מספר חודשים. במקרים אחדים עם מחלת כבד מתקדמת או שחמת כבד לא מומלץ להפיסיק את הטיפול מכיוון שהדבר עלול לגרום להחמרה דלקת הכבד, העולוה להיות מסכנת חיים.

← **ספר מיד לרופא על תסמינים חדשים ולא רגילים שהופיעו אחרי השהפתה את הטיפול, במיוחד תסמינים שאתה מקשר לזיהום בדלקת כבד נגיפית מסוג B.**

**אין ליטול תרופות בחושך!  
בדוק התווית והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה.  
הרכיב משקפיים אם הנר זוקק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגין דלקת כבד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

**יש לפנות מיד לרופא במקרים הבאים:**

- **כל סימן לדלקת או לזיהום.** בחלק מהמטופלים עם זיהום מתקדם ב-HIV (אידס AIDS) ובערך של זיהומי תרופה (זיהומים המופיעים באנשים עם מערכת חיסון חלה), סימנים ותסמינים של דלקת מזיהומים קודמים עלולים להופיע מיד אחרי תחילת טיפול נגד-HIV. הסברה היא ששיסמינים אלה נגרמים בשל שיפור בתגובה החיסונית של הגוף, המאפשר לגוף להילחם בזיהומים שהו קיימים לפחות תסמינים ברורים.
- **מחלות אוטואימוניות,** מצב שבו מערכת החיסון תוקפת רקמות בריאות בגוף, העשויה להופיע גם לאחר התחלת נתילה של תרופות לטיפול בזיהום ב-HIV. מחלות אוטואימוניות עלולות להתרפתח חודשים רבים לאחר תחילת הטיפול. שים לב לכל תסמיני זיהום או לתסמינים אחרים כמו:
  - חולשת שרירים
  - חולשה המתחלת בכפות הידיים והרגליים ומתרפעת מעלה לכיוון מרכז הגוף
  - דפוקות לב, רעד או פעילות יתר (היפראקטיביות).

← **אם תבחן באחת מתופעות הלואו שתוארו לעיל, ספר מיד לרופא.**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד  
(יכולה להשפיע על יותר מאדם אחד מתוך 10)**

- **בחילה**

**תופעות לוואי שכיחות  
(יכולה להשפיע על עד אדם אחד מתוך 10)**

- חלומות חריגים
- כאבי ראש
- סחרחות
- שלשלולים

הקראות	•
כאב בטן	•
אזורים	•
פריחה	•
עיפות (תשישות)	•

- תופעות לוואי לא שכיחות**  
(יכולה להשפיע על עד אדם אחד מתוך 100)
- ספירה נמוכה של תאי דם אדומים (אנמיה)
  - מחשבות אובדן וניסיונות אובדן (במטופלים שחוו דיcanoן או בעיות בריאות נפשית קודם לכך),
  - דיcanoן
  - בעיות בעיכול הגורמות לאו נוחות אחרי ארוחות (DISPEPSIA)
  - נפיחות של הפנים, השפטים, הלשון או הגרון (אנגיאידמה)
  - גרד (גירוד)
  - סרפת (אורטיקרייה)

← אם תופעת לוואי כלשהי מחייבת, ספר מיד לרופא.

### תופעות אחרות שניתן לראות במהלך טיפול ב-HIV

התדריות של תופעות הלואן הבאות אינה ידועה (לא ניתן להעריך את התדריות מتوزע הנזונים הזמינים).

- בעיות עצומות. אצל חלק מהמטופלים הנוטלים תרופות נוגדות נגיפי רטרו משולבות, כמו ג'נדברה, עלולה להתפתח מחלת עצם הנקראט נמק עצם (איסטאונקרוזיס), מות של רקמת עצם הנגרם מאובדן אספקת דם לעצם). נטילת תרופות מסווג זה במשך זמן רב, נטילת קורטיוקוסטרואידים, שתית אלכוהול, מערכת חיסון חלה מזעזע וודף משקל עלולים להיות חלק מגורמי הסיכון הרבים להתפתחות מחלת זו. סימני נמק העצם כוללים:
  - נקודות מפרקיים
  - כאבים ומחושים במפרקים (במיוחד בירך, בברך ובכתף)
  - קשי תנועה

← אם תבחן באחד מהתסמנים הללו ספר לרופא.

בעת טיפול ב-HIV, יתכן שתהייה עלייה במשקל וברמות הליפידים והgelוקוז בדם. דבר זה קשור בחלקו לשיפור בריאות ולסגנון חיים, ובמקרה של ליפידים בדם, לעיתים לתרופות ה-HIV עצמו. הרופא שלך יבצע בדיקות לגילוי שינויים אלה.

← אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי"عقب טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

ניתן בנוסף לדוח על כל תופעת לוואי לבעל הרישום באמצעות דוא"ל: [DrugSafety.Israel@gilead.com](mailto:DrugSafety.Israel@gilead.com) תוכן לעזרה לספק מידע נוסף על בטיחות התרופה באמצעות דיווח על תופעות לוואי.

### 5. איך לאחסן ג'נדברה

מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לטוויה ראיתם ולהישג ידם של ילדים ו/או תינוקות על-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה זו אחרי תאריך הת滂גה (date. exp) המופיע על הקרטון והבקבוק. תאריך הת滂גה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר.  
אחסן את הטעבilities באזירה המקורית כדי להגן עליו מפני לחות. שומר את הבקבוק סגור היטב.  
אל תשליך תרופה לביב או לאשפה. יש להיוועץ ברוקח כיצד להשילר תרופה שאין משתמש בהן עוד.  
אמצעים אלה יעזרו לשמר על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

### מה ג'נדבירה מכילה

- בנוסף לרכיבים הפעילים, ג'נדבירה מכילה:

ליבת הטבילה.

Microcrystalline cellulose (E460), croscarmellose sodium, lactose (as monohydrate), sodium lauryl sulfate, magnesium stearate, hydroxypropyl cellulose (E463), silicon dioxide (E551).

ציפור.

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), polyethylene glycol (E1521), talc (E553b), indigo carmine aluminium lake (E132), iron oxide yellow (E172).

### כיצד נראה ג'נדבירה ומה תוכן האזירה

טבליות מצופות של ג'נדבירה הן טבליות יロקות בצורת כמוסה, שבצד אחד מוטבע עלייהן "GSI" ובצד השני של הטבליה מוטבע המספר "510". ג'נדבירה מגיעה בבקבוקים המכילים 30 טבליות (עם ג'ל סיליקון סופח לחות שחייב להישאר בתוך הבקבוק כדי להגן על הטבליות). ג'ל הסיליקון סופח הלחות נתון בשקיק או במקל נפרד ואסור לבלווע אותו.

התכשיר מגיע בקרטון חיצוני המכיל בקבוק אחד ובו 30 טבליות מצופות.

היצן

Gilead Sciences Ireland UC  
IDA Business & Technology Park  
Carraigtohill, County Cork  
Ireland

בעל הרישום

ג'יליאד סיננסז ישראל בע"מ  
רחוב החרש 4  
הוד השרון  
4524075  
ישראל

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 34742

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוקטובר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

עלון אסמכתא: EU SmPC from October 2021