

Clindamycin Injections - עדכון עלון לרופא

מעבדות רפא מבקשת להביא לידיעתכם כי עודכן העלון לרופא של התכשיר

מרכיב פעיל: Clindamycin (as phosphate) 150mg/ml (600 mg in 4 ml ampoule)

התוויה (הנוסח השתנה מעט):

For the treatment of infections caused by susceptible anaerobic bacteria.

השינויים המשמעותיים בעלון:

שכתוב הסעיף הדן בהנקה:

Lactation

Orally and parenterally administered clindamycin has been reported to appear in human breast milk in ranges from < 0.5 to 0.7 to $3.8 \mu\text{g/ml}$. ~~Because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants, clindamycin should not be taken by nursing mothers.~~ Clindamycin has the potential to cause adverse effects on the breastfed infant's gastrointestinal flora such as diarrhea or blood in the stool, or rash. If oral or intravenous clindamycin is required by a nursing mother, it is not a reason to discontinue breastfeeding, but an alternate drug may be preferred. The developmental and health benefits of breastfeeding should be considered along with the mother's clinical need for clindamycin and any potential adverse effects on the breastfed child from clindamycin or from the underlying maternal condition.

להלן קישור לעלון לרופא הסופי. למידע המלא יש לעיין בעלון בשלמותו.

העלון נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות (www.health.gov.il), וניתן גם לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת מעבדות רפא בע"מ בטל' 02-5893939 או בדוא"ל RA@rafa.co.il.

בכבוד רב,

מגר' מיכל וויקוביץ

רוקחת ממונה