



التبلیغ عن اعراض جانبية
بالمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة
الضغط على الرابط «تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج
بوابی» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة
[\(www.health.gov.il\)](http://www.health.gov.il) الذي يوجهك الى الموقع المباشر
للتبلغ عن اعراض جانبية. بالإضافة، بالممكان تبلغ شركة
«بوتيفارم.ض.».

(5) كيفية تخزين الدواء؟

شروط التخزين: يجب تخزين دون 25 درجة مئوية وفي
مكان محظى من الضوء.
تحتاج التسمم عبء حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في
مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجالس الأطفال وأو
الرضع وذلك لتفادي اصابتهم. لا تسبب التسمم بذرة مبكرة
لطفيليات صرصارية من الطفيل.
لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية
(exp. Date) الذي يظهر على طهرة الطبلة. يشير تاريخ
الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
لا يجوز رمي أيديه أو مياهه في الماء أو في القنوات
استثنى الصيدلي حول كثافة النخاع، حساسية العين
باحتاجها بعد أن إتخاذ هذه الخطوات يساهم في الحفاظ
على جودة البذنة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا على:
Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrate,
Povidone, Sodium Starch Glycolate, Magnesium
Stearate, Opadry White Y-1-7000.
يحتوي كل قرص من سيريناتاد 50 على 40 ملг لكتوز
وحوالي 0.13 ملг صوديوم. يحتوي كل قرص من سيريناتاد
100 على 80 ملг لكتوز و حوالي 0.26 ملг صوديوم.
كيف يبدو الدواء وما هو محتوىعلبة:
سيريناتاد معبأً ضمن بوكات (بليستر) داخل علبة من
الكترون. بكل علبة هناك 10.7، 14، 15، 18، 25، 30
قرصاً. من الجائز أن تستهلك كافية أحجام العلبة.
سيريناتاد 50 هي عبارة عن أعراض مطلية، بيضاء، مستديرة،
محببة الجانبين، ذات خط للشطر من جانب واحد.
سيريناتاد 100 هي عبارة عن أعراض مطلية، بيضاء،
مستديرة، محببة الجانبين، ذات خط للشطر من جانب واحد.
اسم صاحب الإمتياز وعنوانه: بوتفارم.ض.، ص.ب.
14249 ق.ل - أ.ب. - 6121301

اسم المنتج وعنوانه: بوتفارم.ض.، بارك الصناعة
«مافل كرمل». رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
سيرينا 50 - 50 - 31205 01
سيرينا 100 - 100 - 31204 01

من أجل سهولة وفهم القراءة، تمت صياغة هذه النشرة
بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص
لكل الجنسيين.

تم إعدادها في تموز 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

اعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 متلعاً):
• إنتهاك الرجح (diverticulitis)، إنفخان الغدد الليمفاوية،
إنفراش عدد المصفيّات الدموية، إنفراش عدد خلايا
الدم البياض.*

• رد فعل تحسسي حاد
• مشاكل في الغدد المُتم

• إنفاس الكوكسوول، اضطرابات في السيطرة على توازن

السكر في الدم (سكري)، إنفراش نسبة السكر في الدم،
إنفاس نسبة السكر في الدم.*

• اعراض محسنة جراء التوتر أو الإنفعال، ألام مفرغة
في الدم

• اعراض جانبية شائعة جداً (من شأنها أن تظهر لدى أكثر
من 1 من بين 10 متلعاً):

• سمات، حرکات شاذة، صعوبة الحركة، فرف الأحاسيس،
صداع حاد مفاجئ (قد يكون علامة لحالة خلية شرك

تضيق عروق ناوية دموية في الدم)*، اضطرابات

حساسية

• اضطرابات في ضبط حرارة الجسم، ارتفاع درجة حرارة

الجسم

• تغيرات في القلب، التهاب النيكترراس، دم في البطن، تقيؤات، غازات

• اضطرابات هضمية، إمساك، ألم في البطن، تقيؤات، غازات

• تغيرات في اللسان، انتفاخ في المعدة، توابل، دم في المعدة

• تغيرات في القلب، ارتفاع درجة حرارة

• تغيرات في القلب، ارتفاع درجة حرارة