

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (כחשירים) השמיני – 1986**
התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

## סטטור 5 סטטור 10 סטטור 20 סטטור 40 טבליות מצופות

**הרכב:**
כל טבליית **סטטור 5** מכילה:
רוסובסטטין (כמלה סידן) 5 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 5 mg
כל טבליית **סטטור 10** מכילה:
רוסובסטטין (כמלה סידן) 10 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 10 mg
כל טבליית **סטטור 20** מכילה:
רוסובסטטין (כמלה סידן) 20 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 20 mg
כל טבליית **סטטור 40** מכילה:
רוסובסטטין (כמלה סידן) 40 מ"ג
Rosuvastatin (as calcium salt) 40 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים האלהרגניים בתכשיר, אנא ראה פרק 2: "לפי השימוש בתרופה" ופרק 6: "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו ברטם שתשמט בתרופה.**

שמור את העלון, אולי תצטרך אותו בשנית.
עלון זה מכיל מידע המצטייר על התרופה. אם יש לך שאלות בנוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נועמה לטיפול במחלתך. אך תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה להן כי מדוברם חסד.
**התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.**

**אם אתה מתופעת הלוואי מחמירה, או אם הינך חש בתופעת לוואי שאינה מוזכרת כאן, אנא פנה לרופא שלך מיד.**

**1. למה מיועדת התרופה?**

**סטטור** מותווה להורדת רמות גבוהות של כולסטרול וטריגליצרידים בדם כאשר שנייהם גדיאטה והתעמלות נכשלו לעשות זאת.
בעת הטיפול **בסטטור** יש להמשיך בדיאטה להפחתת כמות הכולסטרול במזון ועלפילות הגופנית.

רמות גבוהות של כולסטרול בדם עלולות להגביר את הסיכון להתקף או לשבץ.

**קצובה הריפויית**

מעבכ אנזים HMG-CoA reductase.

**סטטור** שייך לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים ופועל להורדת רמת השומנים בדם, הופנץ ביותר נקרא כולסטרול. ישנם מספר סוגי כולסטרול בדם: "כולסטרול רע" ו"כולסטרול טוב". **סטטור** פועל ומסיע לנזקף לחסום את ייצור ה"כולסטרול הרע" בפניויו מהגוף.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- הינך בהריון או מניקה. אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש **בסטטור**, הפסיקי לטויל **סטטור** מיידית ויידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על-ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים.
- הינך גרש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6: "מידע נוסף").

02



- יש לך מחלת כבד.
- הינך סובל מבעיות בלתי מורותר.
- הינך סובל ממיחושים או מכאבי שרירים חוזרים או בלתי מוסברים.
- הינך נוטל שילוב תרופתי של לפחות אחת מהתרופות הבאות עם **סטטור**: סופוסובויר, ולפטסביר או ווקסילפרביר (המשמשות לטיפול ביהזום ירואלי של הכבד הנקרא הפטיטיס C).
- הינך נוטל ציקלופורפרין (למשל לאחר השתלת איברים).
- הינך מתחת לגיל 18.
- אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק), אנא פנה לרופא שלך.**
- אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר אם:**
  - הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במידה יש ספק, אנא פנה לרופא)
  - הינך סובל מבעיות בפעילות בלוטת התריס (תירואיד).
  - הינך סובל ממיחושים או מכאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים, אם הינך בעל עבר משפחתי או אישי של בעיות בשרירים, או אם סבלת בעבר מבעיות בשרירים בעת נטילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.
  - הינך צורך כמות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.
  - מאצף אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, וייטנאמי, יפני או מלזי).
  - הינך נוטל תרופות להורדת כולסטרול הידועות כפיראטים.
- אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק), אנא פנה לרופא שלך.**

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בסטטור לפני הטיפול בסטטור ספר לרופא אם:**
  - הינך צורך כמויות גדולות של אלכוהול.
  - הינך סובל מלקיז בתפקוד הכבד, הכליה או בלוטת התריס.
  - הינך נוטל תרופות להורדת כולסטרול הידועות כפיראטים.
  - אנא קרא עלון זה בעיון גם אם נטלת תרופות להורדת כולסטרול בעבר.
- הינך נוטל תרופות לטיפול בוירוס הכשל החיסוני האנושי (HIV) כגון: ריטונאביר עם לופינאביר ו/או אטאזאנאביר. אנא פנה לטעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות".
- הינך נוטל אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית ב-7 הימים האחרונים (לטיפול ביהזום חיידקי בבלבוע או בהורקה). השילוב של חומצה פוסידית ו**סטטור** עלול לגרום לבעיות שריר שמורת (רדומיוליוס). אנא פנה לטעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות".
- הינך סובל ממשל נשימתי חמור.
- הינך סובל מכאב בלתי מוסבר בשריר או מכאב מתמשך בשריר, או אם אתה או בן משפחתך סבלתם בעבר מבעיות בשרירים, מכאב בשריים או מולשת שרירים, או שיש לך היסטוריה של בעיות בשרירים בעת נטילת הכשירים להורדת כולסטרול. יש ליעד את הרופא המטפל אם מופיעים כאבי שרירים או חולשה בשרירים, מיוחד אם אלו מלווים בהרגשה כללית או טובה או חום. יש ליעד את הרופא גם במידה והינך סובל מולשת שרירים מתמשכת.
- מאצף אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, וייטנאמי, יפני או מלזי). הרופא יבחור מינון התחלתי של **סטטור** המתאים לך.
- הינך מעל לגיל 70 (הרופא יבחור מינון התחלתי של **סטטור** המתאים לך).

אם אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחס אליך (או אם אינך בטוח):

אין חטיול **סטטור 40** מ"ג (המינון הגבוה ביותר). בדוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש של **סטטור** בכל מינון.

במספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, דבר המזוהה בבדיקת דם פשוטה הבודקת עלייה ברמות אנזימי הכבד. לכן, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול **בסטטור**.
בזמן שהינך מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אחריו אם יש לך סוכרת או אם הינך בסיכון לפתח סוכרת. ייתכן שהינך בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, או אם יש לך משקל עודף ולחץ דם גבוה.

**ילדים ומתבגרים**

**סטטור** אינו מיועד לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.
**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**
**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**
במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לדילול דם (כגון וארפרין או קלופידוגרל).
- ציקלופופריין (בשימש לאחר השתלת איברים).
- פיראטים (כגון גמפיברויל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להורדת כולסטרול (כגון אטזימבי).
- סותריו חומצה.
- איריתומיצין (אנטיביוטיקה).
- חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה מטה וכן בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימש **בסטטור**").

גלולות למניעת הריון.
גרופופיב דרוולוטטור שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת.
טיפול הורמונלי תחליפי.
תרופות לטיפול בהיזמים ירואלים, כולל וירוס הכשל החיסוני האנושי (HIV) או דלקת כבד (הפטיטיס C), לבד או בשילוב עם ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימש **בסטטור**".
ריטונאביר, לופינאביר, אטאזאנאביר, סופוסובויר, ווקסילפרביר, אומגטיאסביר, פרינפיבר, דסאבוויר, ולטסטביר, רופומביר, אלבסביר, גלקקופביר, פירומטסביר.

**חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה)** – אם עליך לטויל חומצה פוסידית במתן פומי לטיפול חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול **בסטטור**. הרופא יאמר לך מתי ניתן לחזור לטויל את התרופה. נטילת **סטטור** עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעיתים נדירות חולשה, לרגישות או לכאב שרירים (רדומיוליוס). ראה מידע נוסף לגבי רדומיוליוס בפרק 4: "תופעות לוואי".

התרופות הרשמות לעיל, בשילוב עם **סטטור**, עלולות להשפיע באופן שונה על המטפול או לגרום לשנייה בהשפעת **הסטטור** על המטפול.

**שימוש בתרופה מזון**

ניתן לטויל **סטטור** ללא קשר למזון.

**הריון והנקה**

אין לטויל **סטטור** אם הינך בהריון או מניקה. אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש **בסטטור** הפסיקי לטויל **סטטור** מיידית ויידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על-ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים בתקופת הטיפול בתרופה זו.

**נהיגה ושימוש במכוונת**

מרבית המטופלים יכולים (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא מוסברים, או כאבי השימוש **בסטטור** – התרופה לא תפוגם בכשירותם לבצע פעולות אלו.
אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת לפנות לרופא ברטם הפעלת מכוונת או נהיגה ברכב.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
התרופות מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שהינך סובל מאי סבלנות לסוכרים מסוימים (לקטוז או סוכרי חלב), היועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. אנא ראה פרק 6: "מידע נוסף".

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר ממדי בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטפול בתכשיר.

**המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.**

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

הטיפול עם **סטטור** יתחיל עם טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלת לפני כן סטטינים אחרים.

המינון המקסימלי היזמי הינו 40 מ"ג וניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול ואשר מקבלים את הטיפול על פי היועץ של מומחה.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.**

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

**צורת הנטילה**

יש לבלוע את הטבליות עם מים.

ניתן לטויל התרופה בכל שעות היום עם או בלי מזון.

**סטטור 5:** אין לחצות את הטבליה. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

**סטטור 10, 20, 40:** במידת הצורך ניתן לחצות את הטבליה לשימוש מיידי. אין מדע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה. אם נוטלים סותריו חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש לטויל את **סטטור** לפחות שעתיים לפני נטילת סותריו החומצה.

יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת.

**כיצד תוכל לטעיר להצלחת הטיפול?**

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ולא התייעצבע עם הרופא.

**אם נכחת לטויל תרופה זו** בזמן המיועד, יש לדלג על המנה ששנכחה וליטול את המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. בשום אופן אין לטויל שתי מנות ביחד על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש להקפיד על דיאטה דלת כולסטרול.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

**אין לטויל תרופות בחושרן! בדוק הנווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

**4. תופעות לוואי**
כמו בכל תרופה, השימוש **בסטטור** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם היבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסכול מאף אחת מהן.

**תופעות המחייבות התיישנות מיוחדת, הפסק את הטיפול בסטטור ופנה לרופא מיד אם:**

- יש לך אחת מהתגובות האלהרגניות הבאות:
  - נפיחות חזחה בגברים (gynecomastia).
  - קושי נשימתי עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.

קושי נשימתי עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.

גדר הריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא מוסברים, או כאבי שרירים ממושכים. כמו עם סטטינים אחרים, מספר צומצם של מטופלים חוו הפשעה בלתי נעימה בשרירים, ולעיתים, נדירות תופעה זו הופכת למסכנת חיים. פוגעת בשרירים וידועה כפי רדומיוליוסי.

- יש לך קרע בשריר.
- יש לך תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

**תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 מסופלים מתוך 100):**

- עצירות.
- כאבי ראש.
- הרגשת חולי.
- סחרחורת.
- כאבי בטן.
- חולשה.
- כאב שרירים.

עלייה בכמות החלבון בשתן – בדרך כלל הכמות חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק לטויל את התכשיר (רק עבור **סטטור 40** מ"ג).

סוכרת – הסיכון לפתח סוכרת גדול יותר אם הינך בעל רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, של עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 מסופלים מתוך 1,000):**

פריחה בעור, גרד, חרלת ותגובות ערויות אחרות.
עלייה בכמות החלבון בשתן – בדרך כלל הכמות חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק לטויל את התכשיר (רק עבור **סטטור 5** מ"ג, 10 מ"ג ו- 20 מ"ג).

**תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 מסופלים מתוך 10,000):**

גנובה אלארית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, הלשון ו/או הגרון, קושי בבליע ונשימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מורמות). אם הינך חושש שיש לך גנובה אלארית, הפסק לטויל **סטטור** ופנה מיד לעזרה רפואית.

פגיעה בשריר במבוגרים – ליתר ביטחון, הפסק לטויל **סטטור** דבר עם הרופא שלך מיד אם הינך חש במיחושים או כאבי שרירים לא רגילים הנמשכים יותר זמן מהרגיל.
כאב בטן חמור (דלקת הבלבד).

עלייה באנזימי כבד בדם.

דימום או נטייה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות חום.

יש לך תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

**תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות המופיעות בפחות מחוטפול אחד מתוך 10,000 מסופלים):**

- גחבת (הצטבת העור והעיינים).
- הפטיטיס (דלקת כבד).
- עקבות דם בשתן.
- כאבי פרקים.
- זנק לעצבים בורועות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול).
- אובדן זיכרון.
- הגדלת חזחה בגברים (gynecomastia).

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעו):**

- תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (הופעת שלפוחיות בעור, בפה, בעיניים ובאיברי המין).
- בצקת (נפיחות עקב הצטברות נוזלים).
- הפרעה בשניה, כולל נדודי שינה וסיוטים.
- בעיות בתפקוד המיני.
- דימואן.
- קוצר נשימה.
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קוצר נשימה או חום.
- חולשת שרירים קבועה.
- שיעול.

פגיעה בגיד.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דייווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)). המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוינפארם בע"מ".

**5. אין לאחסן את התרופה?**

יש לאחסן מתחת ל- 25° C במקום מוגן מאור.

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ארייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי ילד, כך תמנע הרעלה. **אל תגרמו לקהלה ללא הוראה מפורשת מארופא.**

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ([exp.date](http://exp.date)). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אנ לעיים לב לתאריך התפוגה של התכשיר!
בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**6. מידע נוסף**

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, Lactose anhydrous, Magnesium oxide, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Opadry white, Opadry brown, Opadry yellow.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

**סטטור** ארזה בתוך גמשיית (בליטרים) אשר מוכנסות לתוך אריות קרטון, בכל אריזה יש 7, 14, 21, 28 או 30 טבליות. ייתכן ולא כל נודלי האריזה משקל 10, 20 או 40 מ"ג.

**סטטור 5** הינו טבליות מצופות עגולות, בצבע בז', קמורות משני צדיהן.

**סטטור 10** הינו טבליות מצופות עגולות, בצבע בז', קמורות משני צדיהן, עם קו חצייה מצידן האחד.

**סטטור 20** הינו טבליות מצופות עגולות, בצבע בז', קמורות משני צדיהן, עם קו חצייה מצידן האחד.

**סטטור 40** הינו טבליות מצופות אובאליות, בצבע בז', קמורות משני צדיהן, עם קו חצייה מצידן האחד.

**התכשיר מכיל לקטוז**

כל טבליית **סטטור 5** מכילה 14.5 מ"ג של לקטוז.

כל טבליית **סטטור 10** מכילה 29 מ"ג של לקטוז.

כל טבליית **סטטור 20** מכילה 58 מ"ג של לקטוז.

כל טבליית **סטטור 40** מכילה 116 מ"ג של לקטוז.

שם ת.א. **1301301**
**השם הרשום וכתובתו:**
אוינפארם בע"מ, ת.ד. 21429, תל אביב 6121301.

מספרי הריישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:
**סטטור 5:** 143 12 33069 02
**סטטור 10:** 143 13 31932 02
**סטטור 20:** 143 14 31933 02
**סטטור 40:** 143 15 31934 02

לשם הפטנט ולקבלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
על זאת, אף התרופה מיועדת לבני שני המינים.
נערך ביולי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

