

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ליקסומיה 20 mcg תמיסה להזרקה תת עורית

חומר פעיל

כל עט מזרק מוכן לשימוש מכיל 14 מנות.
כל מנה של 0.2ml מכילה ליקסיסנטיד Lixisenatide 20 mcg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

שמור על עלון זה ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

- ליקסומיה היא תרופה להזרקה אשר פעולתה עוזרת לגופך לווסת את רמת הסוכר בדמך כאשר היא גבוהה מדי.
התרופה מיועדת למבוגרים עם סוכרת מסוג 2.
- ליקסומיה יכולה להינתן בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בסוכרת כאשר הן, בנוסף לדיאטה ופעילות גופנית, אינן מספיקות בכדי לווסת את רמת הסוכר בדמך. תרופות אלו יכולות לכלול:
- תרופות נגד סוכרת הנלקחות דרך הפה (כמו מטפורמין, פיוגליטזון, תרופות ממשפחת הסולפוניל-אוריאה) ו/או,
- אינסולין בזאלי, סוג של אינסולין שפעולתו נמשכת לאורך כל היום.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל ליקסיסנטיד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").
--

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- יש לך סוכרת מסוג 1 או קטואצידוזיס של סוכרת (diabetic ketoacidosis) (סיבוך של סוכרת המתרחש כאשר הגוף אינו מסוגל לפרק גלוקוז מפני שאין מספיק אינסולין), היות ותרופה זו לא תתאים לך.
- יש לך או הייתה לך בעבר דלקת של הבלב (pancreatitis) : כאב בטן (אזור הקיבה) חמור ומתמשך, שעשוי להתפשט לגב וכן בחילות והקאות שעלולים להיות סימנים לדלקת הבלב.
- יש לך בעיה חמורה במעי או בקיבה כגון מחלה של שרירי הקיבה הנקראת "גסטרופרזיס" (שיתוק קיבה) המביאה להאטה בריקון הקיבה.
- יש לך מחלת כליות חמורה או שהנך עובר דיאליזה, שכן במצב זה השימוש בתרופה זו אינו מומלץ.
- הנך נוטל גם סולפוניל-אוריאה או אינסולין בזאלי. זאת מכיוון שתייתן רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה).
הרופא שלך עשוי להורות לך לבצע מעקב אחר רמת הסוכר בדמך ואז להחליט אם לשנות את מינון האינסולין הבזאלי או הסולפוניל-אוריאה שהנך נוטל. אין להשתמש בליקסומיה עם שילוב של אינסולין באזלי וסולפוניל-אוריאה יחד.
- הנך נוטל תרופות אחרות, זאת מאחר וישנן תרופות אחרות כגון אנטיביוטיקות, או טבליטות/כמוסות עמידות בפני פירוק בקיבה אשר אסור שישארו לפרק זמן ארוך מדי בקיבתך (ראה תת-סעיף "תרופות אחרות וליקסומיה").
- הנך חווה איבוד נוזלים/התייבשות, כמו למשל במקרה של הקאות, בחילה ושלשול. חשוב למנוע התייבשות על-ידי שתייה מרובה של נוזלים, במיוחד כאשר מתחילים טיפול עם ליקסומיה.
- הנך סובל מבעיות לב היכולות לגרום לקוצר נשימה או התנפחות של הקרסוליים, מאחר ויש ניסיון מועט בשימוש בליקסומיה בקרב אוכלוסייה זו.

ילדים ומתבגרים

אין ניסיון עם ליקסומיה בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, ולכן השימוש בליקסומיה אינו מומלץ בקרב קבוצת גיל זו.

אינטראקציות / תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות מסוימות, כגון אנטיביוטיקות, או טבליות/כמוסות העמידות לפירוק בקיבה אשר אסור שיישאו לזמן ארוך מדי בקיבתך - ייתכן שיהיה צורך ליטול אותן לפחות שעה אחת לפני או 4 שעות לאחר זריקת הליקסומיה שלך.

שימוש בתרופה ומזון

יש להזריק ליקסומיה במהלך השעה שלפני הארוחה.

עדיף להזריק ליקסומיה לפני אותה הארוחה בכל יום וזאת לאחר שבחרת את הארוחה הנוחה ביותר לצורך ההזרקה.

היריון, הנקה ופוריות

אין להשתמש בליקסומיה במהלך היריון. לא ידוע אם ליקסומיה עלולה להזיק לעובר שלך.

אין להשתמש בליקסומיה אם הנך מיניקה. לא ידוע אם ליקסומיה עוברת לחלב שלך.

אם הנך בהיריון או מיניקה, חושבת שיתכן כי את בהיריון או מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוונות

אם הנך משתמש בליקסומיה יחד עם סולפוניל-אוריאה או אינסולין בזאלי, אתה עלול לחוות רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה). מצב זה עלול לגרום לקושי בריכוז ואתה עלול להרגיש סחרחורת או ישנוניות. אם זה קורה, הימנע מנהיגה ומשימוש בכלים או מכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) של נתרן למנה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

תרופה זו מכילה מטאקרוסול (Metacresol) העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

כמה להזריק

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- 20 מיקרוגרם פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

ליקסומיה 20 מק"ג מיועדת לטיפול המשכי בלבד (לאחר השבועיים הראשונים לטיפול), במידה והינך מתחיל טיפול נא פנה לרופא.

מתי להזריק

יש להזריק ליקסומיה במהלך השעה שלפני הארוחה.

עדיף להזריק ליקסומיה לפני אותה הארוחה בכל יום וזאת לאחר שבחרת את הארוחה הנוחה ביותר לצורך ההזרקה.

היכן להזריק

יש להזריק ליקסומיה תת-עורית, באזור הבטן, החלק העליון של הרגל (ירך) או החלק העליון של הזרוע.

כיצד להשתמש בעטי הזרקה מוכנים לשימוש

לפני שאתה משתמש בעט בפעם הראשונה, הרופא או האחות ידגימו כיצד להזריק ליקסומיה.

- תמיד יש לקרוא את "הוראות השימוש" המצורפות לאריזה.
- תמיד יש להשתמש בעט כפי שמתואר ב- "הוראות השימוש".

מידע חשוב נוסף בנוגע לשימוש בעטי הזרקה מוכנים לשימוש

קיים מידע נוסף על אופן השימוש בעטים ב- "הוראות השימוש". הנקודות החשובות ביותר הן:

- תמיד יש להשתמש במחט חדשה עבור כל הזרקה. יש להשליך את המחטים לאחר כל שימוש.
- יש להשתמש רק במחטים המתאימות לשימוש עם עט ליקסומיה (ראה "הוראות השימוש").
- עליך לאתחל את עט הליקסומיה שלך לפני שאתה משתמש בו בפעם הראשונה.
- זאת על מנת לוודא כי הוא עובד בצורה נכונה וכי המנה להזרקה הראשונה שלך מדויקת.
- אם אתה חושב שיתכן כי עט הליקסומיה שלך פגום, אל תשתמש בו. קח אחד חדש. אל תנסה לתקן את העט.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

אם הזרקת יותר ליקסומיה מהנדרש, פנה מיד לרופא שלך. מנה גדולה מדי של ליקסומיה עלולה לגרום לך לבחילה או להקאה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות ילד השתמש בתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם החמצת מנת ליקסומיה, אתה יכול להזריק אותה במהלך השעה שלפני הארוחה הבאה שלך.
אין להזריק שתי מנות באותו הזמן על מנת לפצות על הזרקה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אל תפסיק להזריק ליקסומיה מבלי לשוחח עם הרופא שלך. אם אתה מפסיק להזריק ליקסומיה, רמת הסוכר בדמך יכולה לעלות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בליקסומיה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

מספר תגובות אלרגיות חמורות (כגון שוק אנפילקטי) דווחו לעיתים לא שכיחות בקרב חולים המקבלים ליקסומיה.
עליך לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אם הנך חווה תסמינים כגון התנפחות הפנים, הלשון או הגרון הגורמת לקשיים בנשימה.

הפסק להזריק ליקסומיה ופנה לרופא מיד אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

כאב בטן (אזור הקיבה) חמור ומתמשך, שעשוי להתפשט לגב וכן בחילות והקאות, אלו יכולים להיות סימן לדלקת חמורה של הבלב.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר אשר דווחו עבור ליקסומיה ועלולות להופיע אצל יותר מ-1 מתוך 10 משתמשים (תדירות שכיחה מאוד) היו בחילה והקאות. תופעות לוואי אלו היו לרוב קלות ובדרך כלל חלפו במשך הזמן.
תופעות לוואי שכיחות מאוד נוספות שדווחו עבור ליקסומיה:

- שלשול
- כאב ראש
- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה, "היפו") במיוחד כאשר נוטלים ליקסומיה יחד עם אינסולין או סולפוניל-אוריאה.
- סימני האזהרה של רמת סוכר נמוכה בדם עשויים לכלול זיעה קרה, עור חיוור וקר, כאב ראש, תחושת נמנום, חולשה, סחרחורת, בלבול או רגזנות, תחושת רעב, פעימות לב מהירות והרגשת מתיחות. הרופא שלך ינחה אותך מה לעשות במקרה שתחושה רמת סוכר נמוכה בדם.
- הסבירות שמצב כזה יתרחש גבוהה יותר כאשר הנך נוטל גם סולפוניל-אוריאה או אינסולין בזאלי. הרופא שלך עשוי להפחית את המנה של תרופות אלו לפני שאתה מתחיל ליטול ליקסומיה.

תופעות לוואי שכיחות: (עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- שפעת (אינפלואנזה)
- הצטננות (זיהום בדרכי הנשימה העליונות)
- תחושת סחרחורת
- קשיי עיכול (דיספפסיה, צרבת)
- כאב גב
- דלקת בשלפוחית השתן
- זיהום ויראלי
- רמת סוכר נמוכה בדם (כאשר ליקסומיה נלקחת יחד עם מטפורמין)
- ישנוניות
- תגובות באתר ההזרקה (למשל גירוד).

תופעות לוואי לא שכיחות: עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 100 משתמשים

- חרלת (אורטיקריה)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. כיצד לאחסן את התרופה

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אל תשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי תווית העט/הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.

לפני השימוש הראשון

אחסן במקרר (בין 2 ל- 8 מעלות צלסיוס). אין להקפיא. שמור הרחק מתא ההקפאה.

לאחר השימוש הראשון

ניתן להשתמש בעט במשך 14 יום כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורה מתחת ל- 30°C. אין להקפיא. אין לאחסן את העט כשמחט מחוברת אליו. כאשר אינך משתמש בעט, יש להרכיב את המכסה על העט על מנת להגן מפני אור.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

glycerol 85%, sodium acetate trihydrate, methionine, metacrsol, hydrochloric acid concentrated, sodium hydroxide and water for injections.

ראה גם סעיף: " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

ליקסומיה היא תמיסה להזרקה (זריקה) צלולה וחסרת צבע. התמיסה נמצאת במחסנית זכוכית המוכנסת לעט מוכן לשימוש.

כל עט ליקסומיה מכיל 3 מ"ל של תמיסה, ומספק 14 מנות של 20 מיקרוגרם. קיימות אריזות בגדלים של 1, 2 או 6 עטים מוכנים לשימוש. לא כל גדלי האריזה משווקים בארץ.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

בעל הרישום והיבואן וכתובת: סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, רחוב בני גאון 10, נתניה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1520733893

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בנובמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

ליקסומיה 20 mcg

תמיסה להזרקה

הוראות שימוש

כל עט מוכן לשימוש מכיל 14 מנות, כל מנה מכילה 20 מיקרוגרם ב- 0.2 מ"ל.

חלק 1 – מידע חשוב

קרא הוראות אלו בעיון לפני השימוש בעט הליקסומיה שלך.


שמור עלון זה לשימוש בעתיד.

מידע על עט הליקסומיה

ליקסומיה מגיעה כעט מוכן לשימוש המיועד להזרקה.

- יש להזריק רק מנה אחת ליום.
- כל עט ליקסומיה מכיל 14 מנות מדודות מראש. אין צורך למדוד כל מנה.
- היועץ ברופא, ברוקח או באחות לגבי אופן ההזרקה הנכון, לפני שימוש בעט.
- אם אינך יכול למלא אחר כל ההוראות במלואן בעצמך, או שאינך מסוגל לתפעל את העט (למשל, אם יש לך בעיות ראייה), השתמש בו רק אם יש מי שיעזור לך.

עט הליקסומיה (ליקסומיה 20 mcg: יופיע איור של העט המתאים, הסגול)




(ליקסומיה 20 mcg: יופיע איור של העט המתאים, הסגול)



בוכנה שחורה
הבוכנה תזוז לאורך מד המנה לאחר כל
הזרקה. בדוגמא למעלה, מספר המנה מראה כי
נותרו 13 זריקות.

- עט זה מיועד לאדם אחד בלבד. אל תחלוק אותו עם אף אדם אחר.
- בדוק תמיד את התווית כדי לוודא שיש לך את עט הליקסומיה הנכון. בנוסף, בדוק שתאריך התפוגה לא חלף.
- שימוש בתרופה לא נכונה יכול להזיק לבריאותך.
- אל תנסה להוציא נוזל מתוך המחסנית באמצעות מזרק.



מכסה המחט החיצוני מכסה המחט הפנימי המחט כיסוי מגן

- השתמש אך ורק במחטים שאושרו לשימוש עם ליקסומיה. השתמש במחטי עט חד-פעמיות של 29G עד 32G עם עט הליקסומיה שלך. שאל את הרופא, הרוקח או האחיות איזה עובי ואורך של מחט מתאים ביותר עבורך.
- כאשר הזריקה ניתנת על-ידי אדם אחר, עליו להיזהר שלא לפצוע בטעות מישהו עם המחט. הדבר עלול להעביר זיהומים.
- השתמש תמיד במחט חדשה עבור כל הזרקה. הדבר עוזר למנוע זיהום של הליקסומיה או אפשרות של סתימה במחט.

חלק 2 – מתחילים

- **אתחל את העט באותו יום בו תהיה ההזרקה הראשונה שלך ראשית, אתחל את העט החדש שלך**
 - **לפני הזרקת מנה – לפני ההזרקה הנך חייב קודם להוציא נוזל עודף מהעט החדש שלך.** הדבר נעשה פעם אחת ונקרא תהליך ה "אתחול". שלבים 1 עד 5 המופיעים מטה מראים לך כיצד לעשות זאת.
 - האתחול נעשה על מנת לוודא כי העט עובד בצורה נכונה וכי המנה להזרקה הראשונה שלך מדויקת.
 - **אל תחזור** על תהליך האתחול, אחרת לא תקבל 14 מנות מעט הליקסומיה שלך.
- התמונות שלהלן מראות כיצד משתנה חלון האתחול הנמצא בלחצן ההזרקה שבעט שלך לאחר האתחול.

(ליקסומיה 20 mcg: יופיע איור של העט המתאים, הסגול)

עט חדש
(חלון כתום)



עט מוכן להזרקות
(חלון לבן)



העט אותחל ומוכן להזרקות. החלון נשאר לבן לאחר האתחול.

כיצד לאתחל את עט הליקסומיה החדש שלך

שלב 1 - הסר את מכסה העט ובדוק את העט.



בחן את הנוזל. עליו להיות צלול וחסר צבע, ללא חלקיקים. אם אינו כך, אל תשתמש בעט זה. צור קשר עם הרופא או הרוקח.

שלב 2 - חבר מחט והסר את מכסי המחט



השתמש תמיד במחט חדשה לאתחול. הסר את כיסוי המגן ממכסה המחט החיצוני. יישר את המחט אל מול העט. המשך להחזיקה ישר בזמן ההברגה על העט.



היזהר שלא לפצוע את עצמך כשהמחט חשופה. הסר את מכסה המחט החיצוני והפנימי. שמור את מכסה המחט החיצוני – תזדקק לו בהמשך כדי להסיר את המחט.

שלב 3 - משוך כלפי חוץ את לחצן ההזרקה. (ליקסומיה 20 mcg: יופיע איור של העט המתאים, הסגול)



משוך בחוזקה את לחצן ההזרקה כלפי חוץ עד שהוא נעצר.



כעת יצביע החץ לכיוון המחט.

שלב 4 - לחץ והחזק את לחצן ההזרקה להוצאת נוזל עודף



כונ את המחט אל מיכל מתאים (כמו כוס נייר או טישיו) לאיסוף הנוזל כך שניתן יהיה להשליך אותו.
לחץ על לחצן ההזרקה פנימה עד הסוף. אתה עשוי לחוש או לשמוע "קליק".
המשך ללחוץ על לחצן ההזרקה וספור באיטיות עד חמש על מנת להוציא את הטיפות האחרונות.



אם אין כלל יציאה של נוזל ראה חלק "שאלות ותשובות".
בדוק כי חלון האתחול כעת לבן.

שלב 5 - העט מאותחל כעת

אין לאתחל עט זה שוב.
לצורך ההזרקה הראשונה שלך עבור ישר לחלק 3 - שלב ג.
אין צורך להחליף את המחט בין האתחול לבין ההזרקה הראשונה שלך.

חלק 3 – שימוש יומי בעט

עקוב אחר חלק זה רק כאשר חלון האתחול לבן.
הזרק מנה אחת בלבד בכל יום.



שלב א. הסר את מכסה העט ובדוק את העט (ליקסומיה 20 mcg: יופיע איור של העט המתאים, הסגול)



בחן את הנוזל. עליו להיות צלול וחסר צבע, ללא חלקיקים. אם אינו כך, אל תשתמש בעט זה.
במקרה שישנן בועות אוויר, ראה חלק "שאלות ותשובות".
בדוק את מספר המנות בעט. המספר מוצג באמצעות המיקום של הבוכנה השחורה במד המנה.
בדוק שחלון האתחול לבן. אם הוא כתום, עבור לחלק 2.
בדוק את התווית על העט שלך בכדי לוודא כי יש בידך את התרופה הנכונה.

שלב ב. חבר מחט חדשה והסר את מכסי המחט



השתמש תמיד **במחט חדשה** עבור כל הזרקה.
הסר את כיסוי המגן ממכסה המחט החיצוני.
יישר את המחט אל מול העט. המשך להחזיקה ישר בזמן ההברגה על העט.



היזהר שלא לפצוע את עצמך כשהמחט חשופה.
הסר את מכסה המחט החיצוני והפנימי. שמור את מכסה המחט החיצוני – תזדקק לו בהמשך כדי להסיר את המחט.

שלב ג. משוך כלפי חוץ את לחצן ההזרקה



משוך בחוזקה את לחצן ההזרקה כלפי חוץ עד שהוא נעצר.



כעת יצביע החץ לכיוון המחט.

שלב ד. לחץ והחזק את לחצן ההזרקה כדי להזריק את המנה



אחוז בקפל עור והחדר את המחט (ראה בחלק "אתרים להזרקה" היכן להזריק).
לחץ על לחצן ההזרקה פנימה עד הסוף. אתה עשוי לחוש או לשמוע "קליק".
המשך ללחוץ על לחצן ההזרקה וספור באיטיות עד חמש על מנת לקבל את המנה במלואה.
כעת ניתנה לך המנה שלך. משוך את המחט החוצה מהעור.

שלב ה. הסר והשלך את המחט לאחר כל הזרקה.



הנח את מכסה המחט החיצוני על משטח ישר.
כוון את המחט אל תוך מכסה המחט החיצוני.
הרכב חזרה את מכסה המחט החיצוני על המחט.

צבט את מכסה המחט החיצוני כדי לתפוס את המחט ובעזרתו הברג החוצה את המחט מהעט.



שאל את הרוקח כיצד להשליך מחטים שאינך משתמש בהן יותר.
הרכב בחזרה את מכסה העט.

שלב ו. חזור על כל השלבים של חלק 3 עבור כל הזרקה.
השלך את העט 14 ימים לאחר האתחול. עשה זאת גם אם נשארה מעט תרופה בתוך העט.

טבלת אתחול והשלכה

רשום בטבלה את התאריך בו אתחלת את העט שלך ואת התאריך בו יש להשליכו, 14 ימים לאחר מכן.

עט	תאריך אתחול	תאריך השלכה
1		
2		

אחסנה

מידע כללי

- שמור את עטי הליקסומיה שלך במקום סגור הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.
- הגן על עטי הליקסומיה שלך מפני אבק ולכלוך.
- הרכב את מכסה העט לאחר כל שימוש על מנת להגן מאור.
- אין להשתמש בליקסומיה אחרי תאריך התפוגה הרשום על גבי התווית ועל גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

לפני אתחול העט:

- שמור במקרר את עטי הליקסומיה שלך שטרם היו בשימוש, בטמפרטורה של 2°C עד 8°C.
- אין להקפיא עטי ליקסומיה ואין להשתמש בליקסומיה אם הוקפאה.
- הנח לעט שלך להתחמם בטמפרטורת החדר לפני השימוש.

לאחר אתחול העט:

- לאחר האתחול יש לאחסן את עט הליקסומיה מתחת ל- 30°C . אין להקפיא ליקסומיה לאחר שעברה אתחול.
- אין לאחסן עט ליקסומיה כשהמחט מחוברת אליו. אם המחט מחוברת, היא עלולה להוביל לזיהום ולאפשרות של כניסת אוויר, מצב שעלול להשפיע על דיוק המנה.
- מהרגע שעט הליקסומיה שלך עבר אתחול ניתן להשתמש בו למשך עד 14 יום. השלך עט ליקסומיה משומש לאחר 14 יום. עשה זאת גם אם נשארה מעט תרופה בתוך העט.

השלכה

- הרכב בחזרה את מכסה העט לפני שתשליך את עט הליקסומיה שלך.
- השלך את עט הליקסומיה שלך. שאל את הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאינך משתמש בהן יותר.


תחזוקה

- נהג בעט הליקסומיה שלך בזהירות.
- ניתן לנקות את עט הליקסומיה שלך מבחוץ על-ידי ניגובו במטלית לחה.
- אין לטבול, לרחוץ או למרוח בנוזל (לשמן) את עט הליקסומיה שלך, זה עלול להזיק לו.
- אם אתה חושב שיייתכן כי עט הליקסומיה שלך פגום, אל תשתמש בו. אל תנסה לתקן את העט.

אתרים להזרקה

חזית

גב



יש להזריק ליקסומיה תת עורית, וניתן להזריקה בכל אחד מהאזורים המוצגים למעלה בכחול. אזורים אלו הם הירך, הבטן והזרוע העליונה. שאל את הרופא, הרוקח או האחיות, כיצד להזריק בצורה נכונה.

שאלות ותשובות

מה אם שכחתי לאתחל את עט הליקסומיה או שהזרקתי לעצמי לפני האתחול?

אם הזרקת לעצמך לפני אתחול העט, אל תתקן זאת על-ידי מתן זריקה נוספת. היוועץ ברופא או ברוקח לגבי בדיקת רמת הסוכר בדמך.

מה אם יש בועות אוויר במיכל?

הימצאות בועות אוויר קטנות במיכל היא מצב תקין – הן לא יפגעו בך. המנה שלך תהיה נכונה ואתה יכול להמשיך ולעקוב אחר ההוראות. צור קשר עם הרופא או הרוקח אם אתה זקוק לעזרה.

מה אם אין יציאה של נוזל במהלך האתחול?

ייתכן שהמחט חסומה או שלא הוברגה כראוי על העט. הסר את המחט מהעט, חבר מחט חדשה וחזור על שלבים 4 ו-5 בלבד. אם עדיין לא יוצא נוזל, ייתכן כי עט הליקסומיה שלך פגום. אל תשתמש באריזת ליקסומיה זו. צור קשר עם הרופא או הרוקח לקבלת עזרה.

מה אם קשה ללחוץ על לחצן ההזרקה פנימה עד הסוף?

ייתכן שהמחט חסומה או שלא הוברגה כראוי על העט. הוצא את המחט מהעור שלך והסר את המחט מהעט. חבר מחט חדשה וחזור על שלבים 4 ו-5 בלבד. אם עדיין קשה ללחוץ על כפתור ההזרקה, ייתכן כי עט הליקסומיה שלך פגום. אל תשתמש באריזת ליקסומיה זו. צור קשר עם הרופא או הרוקח לקבלת עזרה.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי ליקסומיה או לגבי סוכרת, שאל את הרופא או הרוקח.

לשאלות הקשורות לתפעול העט ניתן להתקשר לקו החם של סאנופי-אוונטיס בטלפון 1-800-300-900.